

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3193/A

3193/A.
A. x 8


cessaria
meum


turba. quia ec
me. nec habent³
²


tendū


180


3193

































pro. af. Merz

Gronova R

Lud: cut the bear



42599
APHORISMI

HIPPOCRATIS, NICO-
LAO LEONICENO
VICENTINO IN-
TERPRETE.
LIB. VII.

EIVSDEM PRAESAGIA,
Gulielmo Copo Basiliensi inter-
prete. LIB. III.

EIVSDEM DE RATIONE
victus in morbis acutis. Lib. IIII.

EIVSDEM DE NATURA
humana, Andrea Brentio Pataui-
no interprete.


GALENI ARS MEDICINA
lis interprete Nicol. Leoniceno.

B.



R.

Venet 1530



APHOR. HIPPOCR. LIB. 1. 2

APHORISMO
RVM HIPPOCRATIS
liber primus, Nicolao Leonice
no Vicentino interprete.

Aphor. 1.



Ita brevis, ars vero
longa, occasio autē
præceptis: experimen-
tū periculosum, iudi-
ciū difficile. Nec so-
lum seipsum præsta-
re oportet oportu-
na facientem, sed & ægrum, & affli-
dentes, & exteriora. Aphor. 2.

In perturbationibus ventris, & vo-
mitibus spontinis, si talia purgen-
tur qualia purgari oportet, cōfert, &
leuiter ferunt. sin minus, contrā. Sic &
vasorum innanitiō, si talis fiat qua-
lis fieri debet, cōfert, & bene tolerāt:
sin minus, contrā. Inspecere itaq; opor-
tet & regionē, & tempus, & ætatē, &
morbos in quibus cōueniat aut non.

Aphor. 3.

Habitus exercitatorum qui ad
summum bonitatis attingunt,

a ii

APHOR. HIPPOCRATIS.

periculosi si in extremo constiterint. neque enim possunt in eodem permanere, neque quiescere. Cum vero non quiescant, neque possunt proficere in melius: reliquum est igitur ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutrirī incipiat. neque compressiones ad extremum ducendæ: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes quæ ad extremum deducunt, periculosæ. & rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ.

Aphor. 4.

Vlētus tenuis, atque exquisitus, in morbis quidem longis semper, in acutis vero, in quibus non conuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis ē. Nā & repletiones, quæ ad extremum deueniunt, graues sunt. Aphor. 5.

IN tenui victu agri delinquant. quo fit ut magis ledantur. Quicūque enim error committitur magnus, maior in hoc fit, quàm in paulo pleniori victu

propterea etiā sanis periculosus existit valde exquisitus victus, & constitutus, quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus, atque admodum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

Aphor. 6.

EXtremis morbis, extrema exquisite remedia optima sunt.

Aphor. 7.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu vtendum est. Vbi vero non, sed pleniorē victum contingit adhibere: tantum cibi, indulgendum est, quanto morbus extremis est mollior.

Aphor. 8.

Quando morbus in suo vigore constiterit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

Aphor. 9.

Coniectari autē oportet, an aeger cū victu sufficiat pdurare donec morbus cōsistat, & nūquid prius ille deficiat, nec possit cū victu pdurare, vel morbus antea deficiat, atque hebetescat.

Aphor. 10.

a iii

APHOR. HIPPOCRATIS.

Quibus igitur statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est. quibus vero posterius debet consistere, his & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibis subtrahendus. prius vero vberius agendum, ut æger sufficiat.

Aphor. 11.

In accessionibus abstinere oportet. Inam cibum dare, nocuum est, & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

Aphor. 12.

Accessiones vero & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Sed ex his quæ mox apparerent, indicia sumuntur: quæadmodum in morbo laterali, si circa initio statim sputum appareat, morbum breuiat, si vero postea appareat, producit. Et urinae, & alui excrementa, & sudores, quæcumque apparuerint, vel bonam morborum iudicationem, vel malam, vel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

Aphor. 13.

Senes facillime ieiunium ferunt: secundo loco qui ætatem consistentem habent: minus adolescentes: omnium minime pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore.

Aphor. 14.

Qui crescent, plurimum habent calidi innati. plurimo igitur egent alimento, alioquin corpus absumitur. Senibus vero parum calidi innati inest: paucis propterea fomiti bus egent, quia à multis extinguuntur. Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt, frigidum enim eorum corpus. Aphor. 15.

Ventres hyeme, & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis. iudicio sunt ætates, & athletæ.

Aphor. 16.

Victus humidus febricitantibus omnibus cōfert, maxime vero pueris, & aliis qui tali victu uti cōsueuerunt.

a iiii

APHOR. HIP P.

Aphor. 17.

ET quibus semel, aut his, & quibus plurane, an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum. Cōdonandum autem aliquid tempori, ætati, & consuetudini. Aphor. 18.

Aestate, & autūno cibos difficillime ferūt, hyeme, facillime: secundum locū ver habet. Aphor. 19.

His qui per circuitus, accessionem habent, nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationes.

Aphor. 20.

Quæ iudicatur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere.

Aphor. 21.

Quæ ducere oportet, quo maxime natura vergit per loca conferentia eò ducere.

Aphor. 22.

Concocta medicari, atque mouere non cruda, modo non turgent, plurima vero non turgent.

Aphor. 23.

Diectiones, non multitudine sunt
æstimanda, sed si talia deiciantur
qualia conueniunt, & ægri facile
tolerant. Atq; vbi vsq; ad animi de-
fectionem expedit ducere, faciendū,
si æger possit tolerare. Aphor. 24.

In acutis passiōibus raro, & in prin-
cipiis medicinis purgantibus vti, &
hoc cum præmeditatione faciendū.

Aphor. 25.

Si qualia oportet purgari, purgen-
tur, confert, & facile ferunt si con-
trā, difficulter.

APHORISMO

RVM HIPPOCRATIS

liber secundus, Nicolao Leonice-
no Vicentino interpret.



Aphor. 1.

In quo morbo sōnus
laborem facit, morta-
le, si vero iuuat, non
mortale.

Aphor. 2.

Vbi somnus delirium sedat, bo-
num.

Aphor. 3.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Somnus, atque vigilia, utraque si modum exceſſerint, malum.

Aphor. 4.

Non ſatietas, non fame, neque aliud quicquam quod modum naturæ exceſſerit.

Aphor. 5.

Spontaneæ laſſitudines, morbos prænuntiant.

Aphor. 6.

Quicunque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorē non ſentiunt: his mens ægrotat.

Aphor. 7.

Quæ longo tempore extenuantur corpora, læte reficere oportet. quæ vero breui: breuiter.

Aphor. 8.

Si à morbo cibum aſſumens quis non corroboratur, pluri alimēto corpus uti ſignificatur. quod ſi non aſſumente cibū hoc accidat, ſcire oportet quod indiget euacuatione.

Aphor. 9.

Corpora cum quiſpiam purgare voluerit, oportet fluida facere.

Aphor. 10.

Non pura corpora quanta plus nutritur, tanto magis lædes.

Aphor. 11.

Facilius est impleri potui, quam ci-
bis.

Aphor. 12.

Quæ reliquuntur in morbis,
recidivas facere consueverunt.

Aphor. 13.

Quibuscunq; crisis, id est iudi-
catio fit, his non grauis ante
accessionem. Quæ vero subse-
quitur magna ex parte leuior existit.

Aphor. 14.

In profluuiis alui, mutationes ex-
crementorum iuuant, nisi ad mala
mutatio fiat.

Aphor. 15.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercu-
la nascuntur in corpore, excretio-
nes inspicere oportet. Nam si biliolæ
fuerint, corpus vna ægrotat. si vero
similes sanis, tutum est corpus nutrire.

Aphor. 16.

Vbi fames, laborandum non est.

Aphor. 17.

Vbi cibis præter naturam plus in-
gestus est, hic morbum facit. ostē-
dit autem sanatio.

Aphor. 18.

Eorum q̄ vniuersim & velociter nu-
triūt, veloces quoq; sūt excretōes.

APHOR. HIP P.

Aphor. 19.

Acutorum morborum non om-
nino sunt certæ prænūciationes,
aut salutis, aut mortis. Aphor. 20.

Quibus iuuenibus adhuc alius
humecta est, his senescētibz
exiccatur. Quibus vero iue-
nibus adhuc alius sicca est, his sene-
scentibus humectatur. Aphor. 21.

Famem, thorexis, id est vini potio
soluit.

Aphor. 22.

Quicunque morbi ex repletio-
ne fiūt, curat euacuatio. Et qui-
cunque ex euacuatione, reple-
tio. & aliorum contrarietas.

Aphor. 23.

Acuti morbi in quatuordecim die-
bus iudicantur.

Aphor. 24.

Septenorum, quartus est index. Al-
terius septimanæ octauus princi-
pium. Est autem & vndecimus con-
templabilis. Ipse enim quartus, est al-
terius septimanæ. Rursus vero & de-
cimus septimus contemplabilis. ipse
liquidem quartus, ē à quartodecimo:

LIB. II.

septimus vero, ab undecimo.

Aphor. 25

A Estiua quartana magna ex parte breues: autumnales, longae, & maxime quae hyemem attingunt.

Aphor. 26

F Ebrei conuulsioni superuenire melius est, quam feбри conuulsionem.

Aphor. 27

His qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere, neque multum formidare mala quae praeter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare, & permanere consueuere.

Aphor. 28.

F Ebricitantium non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minui, vel etiam plus quam ratio postulat contabescere, malum. hoc enim morbi longitudinem, hoc vero imbecillitatem significat.

Apho. 29

Cum morbi inchoant, si quid mouendum videtur, moue. cum vero consistunt, ac viget, melius est quietem habere.

Aphor. 30

APHOR. HIP P.

Circa initia, & fines, omnia imbecilliora. cum vero consistunt fortiora. Aphor. 31

Elus qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus malū. Aphor. 32

Omnes feré qui male se habent circa initia bene cibati, nec quicquā proficientes: circa finem rursum cibū non appetunt. qui vero circa initia cibum valde non appetunt, postea bene appetentes, ii melius euadunt. Aphor. 33

In quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum. contra vero se habere, malum. Aphor. 34

In morbis minus piclitantur quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quā quibus secūdum nihil istorum congruit. Aphor. 35

In quouis morbo partes ad umbilicū, & imū vētrē attinētes crassitudinē habere, melius est. multum vero extenuari, ac contabescere, prauum. Sed & hoc quoque ad inferiores par-

gationes, piculosum. Aphor. 36

Qui salubritatem corporis habent, per medicamenta euacuatim cito exoluuntur. & qui prauo utuntur cibo. Aphor. 37

Qui bene se habet corpore, difficulter ferunt medicationes. Aphor. 38

Parum deterior potus, aut cibus, suauior aut, melioribus quidem, sed minus suauibus, est praferendus. Aphor. 39

Seniores iuuenibus plurimum egrotant minus. Qui vero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte committuntur ad mortem. Aphor. 40

Rauedines, & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt. Aphor. 41

Qui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta exoluuntur, de repente moriuntur. Aphor. 42

Soluere morbum, quem apoplexiam vocant, forte, impossibile. debile vero non facile. Aphor. 43

Strangulati, atque dissoluti, nondum mortui, non referuntur qui

APHOR. HIP P.

bus spuma circa os fuerit.

Aphor. 44

Qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quā qui graciles.

Aphor. 45

Quicunque iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporū, & locorum, & victuum quoque liberantur.

Aphor. 46

Dubius doloribus simul eundē locū cum infestantibus, vehemētior alterum obscurat.

Aphor. 47

Dum pus cōficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quā iam confecto.

Aphor. 48

In omni corporis motu ubi laborare cœperit, quies statim lassitudinē aufert.

Aphor. 49

Qui cōsueti solitos labores ferre, & si fuerit imbecilles, & senes, non consuetis, fortibus, atque iuuenibus facilius ferunt.

Aphor. 50

Quæ ex lōgo tēpore consueta sūt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare solent.

Oportet

Oportet igitur ad insueta pmutari.

Aphor. 51

Purimum, atque repente euacua
re, vel replere, vel calefacere, vel
refrigerare, siue quouis alio modo
corpus mouere: periculosum. quo-
niam omne nimis est naturæ inimi-
cum. sed quod paulatim fit, tutum est
tum aliás, tum cum ab altero ad alte-
rum transitus fit.

Aphor. 52

Omnia secūdum rōnem facienti,
si non succedat secundū rōnem,
non est transeundum ad aliud, stante
eo quod à principio visum est.

Aphor. 53

Quicunque alios humidus ha-
bēt, siquidem iuuenes fuerint,
melius commutant his qui
siccus habent. Ad senectam vero de-
terius commutant. nam senescētibus
magna ex parte exiccant.

Aphor. 54

Magnitudo corporis iuuentē qui-
dem, neque indecens, neque illi
beralis, senectæ vero inutilis, & dete-
rior paruitate.

b

APHOR. HIPPOCRATIS.
APHORISMO,
RVM HIPPOCRATIS
liber tertius, Nicôlao Leoni,
ceno Vicëtino interprete.

Aphor. 1



Utationes tēporū potif
simū pariunt morbos:
& in quibusdam tēpo
ribus magnę mutatio
nes, aut frigoris, aut ca
loris, & alia pro ratiōe, eodē modo.

Aphor. 2

Naturarū, hæ quidē ad æstatē, hæ
vero ad hyemē bene, malēve se
habent.

Aphor. 3

MOrbi quoq; alii ad alia bene, vel
male se habent, & quædam æta
tes ad tēpora, & loca, & victus gene
ra.

Aphor. 4

In temporibus, quando eadem die
modo calor, modo frigus fit, autū
nales morbos expectare oportet.

Aphor. 5

Austri auditū hebetātes, caligino
si, caput grauātes, pigri, dissoluē
tes. qñ huiusmodi tempestas pualue

rit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerit, tusses, fauces, alui duræ, difficultates urinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris. quoniam hac tempestat praualuerit, talia in morbis expectare oportet. Aphor. 6

Quando estas fit verisimilis, sudores in febribus multos expectare oportet. Aphor. 7

In siccitatibus febres acutæ fiunt: & si annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitutione, tales plurimum morbos oportet expectare. Aphor. 8

In constantibus temporibus, cum tempestive tempesta redduntur, morbi constantes & boni iudicii fiunt. In inconstantibus autem, inconstantes, & mali iudicii. Aphor. 9

Autumno morbi acutissimi, atque exitiales, maxima ex parte. Verum vero saluberrimum, & minime exitiale. Aphor. 10

Autumnus tabidis malus. Aphor. 11

De temporibus: si quidem hyems sicca, & aquilonia fuerit, ver

APHOR. HIPPOCR.

vero pluuioſum, & australe neceſſe eſt, aſtate febres acutas, & lippitudi-
nes (Græci ophthalmias vocant) & in-
teſtinorum difficultates, præcipue ve-
ro mulieribus, & viris qui natura ſunt
humidiores.

Aphor. 12

SI vero hyems australis, & pluui-
ſa, & ſerena fuerit, ver autem ſic-
cum & aquiloniũ, mulieres quibus par-
tus ad ver ineſt, ex quacunq; occaſio-
ne abortiunt: quæ vero pariēt, imbecilles,
& morbidos infantes pariūt, quare vel
ſtatim intereūt, vel tenues, & valetu-
dinarii viuūt. Ceteris vero mortalibus
difficultates inteſtinoꝝ, lippitudines ſic
cæ fiunt. Senioribus aut deſtillationes
quæ cito interiment.

Aphor. 13

SI vero æſtas ſicca fuerit, & aquilo-
nia, autũnus vero pluuiioſus, & au-
ſtralis, dolores capitis ad hyemē fiūt,
& tuſſes, raucedines, atq; grauedines,
quibusdam autem & tabes.

Aphor. 14

SI vero aquilonius, & ſiccus: his qui
naturam habent humidiores, &

mulieribus conferet, reliquis autem erunt lippitudines siccae, & febres acutae, & grauedines. nonnullis vero & atræ biles.

Aphor. 15

EX anni autē constitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates ībris sunt salubriores, & minus mortiferae.

Aphor. 16

Morbi in pluuiarum multitudine magna ex parte fiunt febres longae, alui profluvia, putredines, morbi comitiales, & attoniti, quos apoplexias Græci vocant, & anginae. In siccitatibus autem, tabitudines, lippitudines, articulorū dolores, stillicidia vrinæ, & difficultates intestinorum.

Aphor. 17.

Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem corpora densant, contendunt, & bene mobilia, colorationa, & melius audientia faciunt, & alios exiccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obsederit dolorē augēt. Austrinæ dissoluūt corpora, & humectāt, auditum obtundunt, capita aggrauāt, &

b iii

APHOR. HIP P.

vertigines faciūt, oculis atq; corpori-
bus difficilem motum præstant, & al-
uos humectant. Aphor. 18

PEr tempora anni, vere quidem, &
prima æstate pueri, & qui hos se-
quuntur ætate, optime degunt, & sa-
ni sunt maxime. Aestate vero & au-
tūno, vsque ad aliquid senes. Reliquū
& hyeme, qui mediā ætatem habent.

Aphor. 19

MOrbi, omnes quidē in omnibus
tēporibus fiunt, quidā vero ma-
gis in quibusdam ipsorum & fiūt &
excitantur.

Aphor. 20

VEre etenim furores, & atræ biles
& morbi comitiales, & pfluvia
sanguinis, & angina, & grauedines,
& raucedines, & lepre, & tusses, & im-
petigines, & vitilignes, & pustule vl-
cerosæ plurimæ, & tubercula, & arti-
lorum dolores.

Aphor. 21

AEstate aut, nōnulli horū, & febres
cōtinuæ, & ardētes, & tertianæ
febres, & quartanæ, & vomitus, & a-
lui profluvia, & lippitudines oculorū,
& aurium dolores, & oris ulceratio

nes, genitaliū putredines, & sudamina.
Aphor. 22

A Vtūno vero, & plurimi vel æstiuī morbi fiūt, & febres quartanę, & erraticę, & lienes, aquę iter cutē, & tabes, & stillicidia vrinę, & difficultates ītestinoꝝ, & leuitates ītestinoꝝ, & coxēdicū dolores, & anginę, & anhelationes, (quas Græci asthmata vocāt) ilei, morbi comitiales furores, atræbiles.
Aphor. 23

H Yeme v̄o, morbi laterales & pulmōis īflāmātiōes, grauedines, atq; raucedines tusses, dolores pectoris & laterū, atq; lūboꝝ, capitis dolores, vertigines, & apoplexię. Aphor. 24

I N etatibus aut talia cōtingūt, puis & nuper natis puerulis, oris vlcera (q̄ aphthę vocātur) vomitus, tusses, vigilię, pauores, vmbilici īflāmationes, auriū humiditates. Aphor. 25

I N p̄gressu vero cū iam dentire incipiūt, gingiuarū pruriges, febres, cōuulsiones, alui p̄fluvia & maxime cū caninos edūt dētes, & his præsertim pueris, qui crassissimi sunt, & aluos duras habent. Aphor. 26

B iiii

APHOR. HIP P.

Cum vero iam magis adoleuerint
 Gonfilla & vertebræ quæ in occi-
 pitio ad interiora luxationes, crebri
 anhelitus (quos Græci asthmata vo-
 cant) calculi, lumbrici rotundi, ascari-
 des, verrucæ (quas Græci acrochordo-
 nas vocant) satyriæ, strumæ, & alia tu-
 bercula, sed præcipue ante dicta.

Aphor. 27

Gradioribus at, & iã accedentibus
 ad pubertatē plurima ex his, &
 febres diurnæ magis, & ex naribus
 pfluua sanguinis.

Aphor. 28

Plurimæ autem passiones pueri-
 lis iudicantur. nonnullæ quidem
 in quadraginta diebus, nonnullæ in
 septem mensibus, nonnullæ vero in an-
 nis septem, quædam vero iam ad pu-
 bem accedentibus. quæ vero permãse-
 rint, nec in pubertate finierint, pue-
 rulis, aut fœminis cum menstrua erū-
 punt, consenescere consueverunt.

Aphor. 29

Adolescentibus autem sanguinis
 Asputiões, tabes, febres acute, mor-
 bus comitialis, & alii, sed præcipue an-
 te dicti.

Aphor. 30

Vltra hanc ætatem asthma: id est creber anhelitus, morbi laterales pulmonis inflammationes, letarghi, phrenetides ardores, diuturna pflu-
uia, cholera, difficultates intestinorū,
leuitates intestinorū hemorrhoides.

Aphor. 31

Senibus spirandi difficultates, distil-
lationes cū tussē, vrinę stillicidia,
vrinæ difficultates, articulorum dolo-
res, renū passiōes, vertigines, apople-
xię mali habitus, pruritus totius cor-
poris, vigilię, alui, oculorum, & nari-
um humiditates, visus obtusus, glau-
cedines, auditus graues.

APHORISMO

RV M HIPPOCRATIS

liber quartus, interpte Nico-
lao Leonicensi Vicentino.



Aphor. 1

Tero gerētes sunt me-
dicādę, si materia tur-
get quarto mense, &
vsq; ad septimum, sed
has minus. Iuniora
autem & seniora ve-

APHOR. HIP P.

teri oportet.

Aphor. 2.

IN medicationibus talia educere ē corpore, qualia & sponte prodeū, tia vtilia, quæ vero contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

Aphor. 3.

SI qualia oportet purgari, purgen- tur, confert, & leuiter ferunt. Con- traria vero grauitur.

Aphor. 4.

Medicari æstate superiores ma- gis, hyeme vero inferiores.

Aphor. 5.

Sub cane, & ante canem difficiles sunt medicationes.

Aphor. 6.

Graciles & facile vomentes pur- gare superius, cauentes hyemē.

Aphor. 7.

Vomentes vero difficulter, & me- diocriter bene carnosos, per infe- riora cauentes æstatem.

Aphor. 8.

Tabidos vero cauentes, ad supe- riores purgationes.

Aphor. 9.

Melancholicos plenius inferiores,
eadem ratione contraria appo-
nentes. Aphor. 10.

Medicari in valde acutis: si mate-
ria turget, eadē die. Tardare enī
in talibus malū est. Aphor. 11.

Quibus tormina, & circa vni-
versū bilicū labores, & lumboꝝ do-
lor, qui neq; à medicamento,
neq; aliter soluitur, in aquā intercutē
siccā firmatur. Aphor. 12.

Quorum alui intestinorum le-
uitate laborant, hyberno tpe
supra purgari, malum. Aphor. 13.

Ad helleboros qui nō facile supra
purgantur, eorū corpora ante po-
tionem pluri cibo, atq; quiete hume-
ctanda sunt. Aphor. 14.

Cum biberit quis helleborum, ad
emotiones quidē corporū ducere
magis, ad somnos vero, atq; quietem
minus. Indicat autē nauigatio turbari
motione corpus. Aphor. 15.

Cum volueris magis ducere helle-
borū, moue corpus: cū vero siste

APHOR. HIPPOCRATIS.

Ne, somnū facito, & non moueto.

Aphor. 16.

Carnes sanas habentibus helleborus periculosus. Facit enim cōuulsionem.

Aphor. 17.

Si quis febrē non habēs, absteineat à cibo, & cordis morsum, seu vertiginem patitur, & oris amaritudinē sentit, purgatione indigere per superiora significat.

Aphor. 18.

Supra præcordia dolores, purgatione indigere per superiora significant. Quicumq; vero inferiora molestant, per inferiora.

Aphor. 19.

Qui in medicamentis purgati, non sitiunt, non quiescunt priusquam sistant.

Aphor. 20.

Non febricitantibus si tormina acciderint, & genuū grauitas, & lūborū dolor, purgari inferius oportere significatur.

Aphor. 21.

Diectiones nigræ, qualis est sanguis niger, sponte venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimæ: & quanto colores magis prauī fuerint

plures, peius: cum medicamento vero melius, & quanto colores plures non prauit. Aphor. 22.

M Orbis quibuscumque incipientibus si atra bilis, vel supra, vel infra exierit, letale.

Aphor. 23.

Q Vibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, siue quo vis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur.

Aphor. 24.

Difficultas intestinorum, si ab atra bile incœperit, letalis est.

Aphor. 25.

Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit malus: infra aut, bonus est.

Aphor. 26.

A Difficultate intestinorum habitato, si veluti carunculae exeant, letale est.

Aphor. 27.

Q Vibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte cum reficiuntur, alui his humectantur.

Aphor. 28.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Q Vibis biliosæ deiectiones, superueniente surditate cessant: & quibus surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus cessat.

Aphor. 29.

Q Vibis in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur.

Aphor. 30.

Q Vibuscunq; accessiones fiunt, quacunq; hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

Aphor. 31.

L Assitudinem habentibus in febribus, in articulos & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Aphor. 32.

Q Vibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, hic fiunt abscessus.

Aphor. 33.

S Ed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hic morbus firmatur.

Aphor. 34.

S I à febre habito tumore nō exiēte in faucibus, strangulatio repente superuenerit, letale.

Aphor. 35.

Si à febre habito loculum, peruer-
titur, & vix potest deuorare sine
vilo tumore, letale est.

Aphor. 36.

Svdores febricitanti si incœperint,
boni, & tertio die, & quinto, & se-
ptimo, & nono, & vndecimo, & quar-
todecimo, & septimodecimo, & vi-
gesimo, & vigesimo septimo, & trige-
simo quarto. hi enim sudores indicât
morbos. Qui vero nō ita fiunt, labo-
rem significant, & morbi longitudi-
nem, & recidiuā.

Aphor. 37.

Frigidi sudores, cum acuta quidē
febre mortem: cum mitiori autē,
longitudinem morbi significant.

Aphor. 38.

Qua parte corporis sudor est,
ibi significat morbum.

Aphor. 39.

Et qua parte corporis calor, aut fri-
gus, ibi morbus.

Aphor. 40.

Et vbi in toto corpore mutatiōes,
& si corpus refrigeretur, vel rursus
calefiat, vel color alter ex altero fiat,
longitudinem morbi significat.

Aphor. 41.

APHOR. HIPPOCRATIS.

SVdor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti pluri cibo significat. Si vero cibum non accipiet, hoc accidat, scire oportet quod evacuatione indiget. Aphor. 42.

SVdor multus calidus, vel frigidus superfluens, frigidus magis, calidus minus, significat morbum.

Aphor. 43.

Febres quaecumque non intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa. Quocumque autem modo interimiserint, periculum abesse significatur.

Aphor. 44.

QVibus febres longae, his tubercula, vel labores in articulis fiunt.

Aphor. 45.

QVibus tubercula, vel in articulis labores fiunt: hi pluribus utuntur cibis.

Aphor. 46.

Si rigor incidat febre non deficiente, aegro iam debili: letale est.

Aphor. 47.

Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidae, cruentae, foetidae, omnes malae, & biliosae, & si bene exeunt, siue per alui excretionem, siue per urinas:

per vrinas: bonæ. si vero non aliquid
eorū quę iuuant, per hæc loca excerni-
tur: malū.

Aphor. 48.

IN febribus non intermittētibz, si
partes exteriores frigide, interiores
vruntur, & sitim habeat, letale est.

Aphor. 49.

IN febre nō intermittente, si labrū,
vel oculus, vel nasus, vel superciliū
peruertatur, vel non videat, vel nō au-
diat, iam debili existente corpore,
quicquid horum euenerit, mors pxi-
ma est.

Aphor. 50.

VBi in febre non intermittēte dif-
ficultas spirandi, & deliriū acci-
derit, letale.

Aphor. 51.

IN febribus, abscessus q ad primas
iudicationes non soluunt, longitu-
dinem morbi significant.

Aphor. 52.

Q Vicūq; in febribus, vel in aliis
morbis sponte illachrimant,
nihil absurdum. qui vero non
spōte, absurdus.

Aphor. 53.

Q Vibz circa dētes in febribus
quidā lentores nascuntur, his
fortes fiunt febres.

c

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 54.

Q Vibus plurimum siccae tussis
leuiter irritantes in febribus
ardētibus fiunt, nō multū siti
infectantur.

Aphor. 55.

EX inguine tumoribus febres oēs
malae, praeter diarias.

Aphor. 56.

Febrecitanti sudor superueniens fe-
bre non deficiente, malū. Proro-
gatur enī morbus, & multā significat
humiditatē.

Aphor. 57.

Qui à conuulsione, aut disten-
sione neruorū tenetur, febre
superueniente liberatur.

Aphor. 58.

A febre ardente habito, rigore su-
perueniente, solutio.

Aphor. 59.

Tertiana exquisita septenis circui-
tibus, quod longissimū est, iudi-
catur.

Aphor. 60.

Qui in febribus aures ob-
surduerūt, sanguis ex naribus
fluens, aut alius turbata, sol-

Fuit morbus.

Aphor. 61.

Febrecitantē nisi diebus imparibus

febris reliquerit, solet recidiuare.

Aphor. 62.

Q Vibus in febribus morbus re-
gius ante diē septimū accidit,
malū.

Aphor. 63.

Q Vibus in febribus quotidie ri-
gores fiunt, quotidie febre sol-
uuntur.

Aphor. 64.

Q Vibus in febribus morbus re-
gius, septimo, vel nono, vel
vndecimo, vel quartodecimo
superuenerit, bonū: nisi dextrū ilium
obduruerit. si vero non, non bonū.

Aphor. 65.

IN febribus circa ventriculū & for-
tis æstus, & cordis morsus, vel do-
lor, malū.

Aphor. 66.

IN acutis febribus conuulsiones, &
circa viscera dolores fortes, malū.

Aphor. 67.

IN febribus ex somnis timores, vel
cōuulsiones, malū.

Aphor. 68.

IN febribus spiritus offendens, ma-
lum. cōuulsionē enim significat.

Aphor. 69.

Q Vibus urinæ crassæ, grumose,
pauce, nō sine febre, multitu-

c ii

APHOR. HIPPOCRATIS.

do veniens ex his tenuis iuuat. ꝑcipue
vero tales veniunt qbus ab initio, vel
breui sedimē inest. Aphor. 70.

Q Vibus vrinæ perturbatæ qua-
les sunt iumentorū, his dolor
capitis vel adest, vel aderit.
Aphor. 71.

Q Vibus septima iudicatur, his
nubeculam habet quarta die
vrina rubeā, & alia ex rōne.
Aphor. 72.

Q Vibus vrinæ albæ, & perspi-
cua, malæ: præsertim si in de-
lirantibus appareant.
Aphor. 73.

Q Vibus ilia suspensa murmurā-
tia lumborū dolore superue-
niente, his alui humectantur,
nisi flatus erūpant, aut vrinæ multitu-
do proueniat. hæc vero in febribus.
Aphor. 74.

Q Vibus speratur abscessum fu-
turum ad articulos, liberat ab
abscessu vrina multa, crassa &
alba facta, qualis in laboriosis febli-
bus quarto die quibusdā incipit fieri.
Si vero etiam ex naribus fluxerit san-

guis, breui admodum solutio fit.

Aphor. 75.

Si sanguinē, aut pus mingat: aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

Aphor. 76.

Quibus in vrina crassa existente carūculę parue, aut veluti capilli vnā exeunt, his à renibus excernitur.

Aphor. 77.

Quibus in vrina crassa furfurea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat.

Aphor. 78.

Qui cunque sponte sanguinem mingunt, his à renibus venulam ruptam significatur.

Aphor. 79.

Quibus in vrinis arenosa subsistunt, his vesica laborat calculo.

Aphor. 80.

Si sanguinem mingant, aut grumos, vel stillicidiū vrinę habeant, & dolor in anum incidat ventrem, & pectinem, & semen: circa vesicam labor est.

Aphor. 81.

Si sanguinē aut pus minxerit, aut squāmulas, & grauis odor adsit,

c iii

APHOR. HIPP.

vesicæ exulcerationem significat.

Aphor. 82.

Q Vibus in vrinaria fistula tubercula nascuntur: his suppuratione facta, & eruptione, solutio.

Aphor. 83.

Mictio noctu plurima facta, parvam significat deiectionem.

CAPHORISMO,
RVM HIPPOCRATIS LI.
ber quintus, interprete Nicolao Leonicensi Vicentino.

Aphor. 1.



Conuulsio ex helleboro, letalis est. Aphor. 1.

Conuulsio ex vulnere, letalis est.

Aphor. 3.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum.

Aphor. 4.

Ex superflua purgatione, conuulsio, aut singultus superueniens, malum.

Aphor. 6.

Si ebrius quispiam repente obmutuerit, conuulsus moritur, nisi febre cor

ripiatur, aut vbi ad horam peruenerit qua soluuntur crapulæ, vocem recuperet.

Aphor. 6.

Q Vicūq; à distentione corripitūtur, ī quatuor diebus pereūt: si vero has effugerint, sani fiūt.

Aphor. 7.

Q Vibuscūq; morbi comitiāles fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt. quibuscūq; autē vigesimo quinto, cōmoriuntur.

Aphor. 8.

Q Vicūq; morbo laterali laborātes in quatuordecim diebus nō repurgātur, hi ad suppurationē vertūtur.

Aphor. 9.

T Abes fiūt maxime etatibus à decimo octauo vsq; ad trigessimū quintum.

Aphor. 10.

Q Vicūq; ab āgina liberātur, his ad pulmonē vertitur, & ī septē diebus pereūt: si vero has effugerint, suppurātur.

Aphor. 11.

Q Vi tabe molestātur, si sputum qđ extussiant graue olet, iniectum carbonibus, & capilli in capite defluūt, letale.

Aphor. 12.

c iiii

APHOR. HIP P.

Q Vibuscunq; tabe laboratibus
capilli à capite defluunt, his
alui profluuium superueniente
moriuntur. Aphor. 13.

Q Vicunq; spumofum sanguinē
expuunt, his è pulmone edu-
ctio fit. Aphor. 14.

A Tabe habito profluuium alui su-
perueniens, letale.

Aphor. 15.

Q Vicūq; ex morbo laterali sup-
puratur, si in quadraginta die-
bus purgantur, à die à qua fit
ruptio, liberatur. Si vero nō, ad tabē
transeunt. Aphor. 16.

C Alidū vbi quis sapius eo vtatur,
hæc mala affert, carniū effoemi-
nationem, neruorum incontinentiā,
mentis torporē, profluuiā sanguinis,
animi defectionē, hæc ad quē mors.

Aphor. 17.

F Rigidum autem, conuulsiones di-
stentiones, liuores, rigores febri-
les. Aphor. 18.

F Rigidum inimicum ossibus, den-
tibus, neruis, cerebro, spinali me-
dullæ. calidum vero, vtile.

Aphor. 19.

Quæcūq; refrigerata sunt excalescere oportet, exceptis his quibus sanguis fluit, aut fluxurus est.

Aphor. 20.

Vlceribus, frigidum quidem mordax cutē obdurat, dolorem insuppurabilem facit, liuorē obducit, rigores febriles, cōuulsiones, distentiones.

Aphor. 21.

Est autem vbi in distentione sine vlceratione, iuvene bene carnosio, ætate media, frigide aque multa perfusio calorem reuocat. Calor autem, hæc soluit.

Aphor. 22.

Calidū suppuratoriū nō in oī vlcere, magnū ad securitatē iudiciū, cutē molit, extenuat, dolorē sedat, rigores, cōuulsiones, & distentiones mitigat: & ex his q̄ ad caput attinent, eius soluit grauitatē, plurimū aut̄ confert ocium fracturis, sed nudis p̄cipue, eorūq; maxime qui in capite vlcera habent, & quæcūq; à frigore moriūtur, vel vlcerātur, & repentibus comesis, sedi, pudendis, vtero, vesicæ. his calidū amicū, & iudicans, frigidū inimicum

APHOR. HIP P.

& perimens.

Aphor. 23.

IN his frigido vtendum vnde fluit
sanguis, aut fluxurus est, nō ad ipsa,
sed circa ipsa vnde influit: & quæcūq;
inflāmationes, vel inflammina ad ru
brum, & subcruentū sanguine recenti
tendūt, nā veteribus nigredinē affert.
Erysipelas etiā non vlceratū iuuat: nā
exulceratū lēdit.

Aphor. 24.

FRigida qualis nix, & glacies pe
ctori inimica, tusses mouēt, & san
guinem, & destillationes.

Aphor. 25.

TVMores articularū, atq; dolores
absq; vlcere, & podagricos quo
que, atq; cōuulsa, horū plurima frigi
da aqua large effusa leuat, & extenu
at, soluitq; dolorē. nā modicus torpor
dolorem soluit.

Aphor. 26.

AQUA quæ cito calet, & cito refri
geratur, leuissima est.

Aphor. 27.

QVI noctu bibere appetunt. his
admodum sitientibus si super
dormierint, bonum.

Aphor. 28.

Suffitus aromatum muliebria du-
cit. sæpius vero ad alia utilis esset
nisi capitis faceret grauitatem.

Aphor. 29.

Grauidas purgare turgente mate-
ria à quarto mense vsq; ad septi-
mum, minus vero has. Recentiores
autem, & seniores vereri oportet.

Aphor. 30.

Mulierem vtero gerentem capi ab
aliquo morbo acuto, letale est.

Aphor. 31.

Mulier vtero gerens sanguine mis-
so ex vena, abortit: & magis si
fœtus sit maior.

Aphor. 32.

Mulieri sanguinẽ euomenti, men-
struis erupentibus, solutio.

Aphor. 33.

Menstruis deficiẽtibus sanguis ex
naribus fluens, bonum.

Aphor. 34.

Mulieri in vtero gerenti si alius
plurimũ profuat, periculum est
ne abortiat.

Aphor. 35.

Mulieri quæ vterinis molestatur,
aut difficulter parit superueniẽs
sternutatio, bonum.

APHOR. HIP P.

Aphor. 36.

Mulieri mēses decolores, nec per
idē semper tempus venientes,
purgationem indicāt esse necessariā.

Aphor. 37.

Mulieri vtero gerenti si mammae
graciles repente fiant, abortit.

Aphor. 38.

Mulieri vtero gerēti, si altera mā.
ma gracilis fiat geminos habē
ti, alterū abortit. & si quidem māma
dextera gracilis fiat, marem: si vero
sinistra, foeminam.

Aphor. 39.

Si mulier quę neq; grauida est, neq;
peperit, lac habet: huic menstrua
defecerunt.

Aphor. 40.

Quiuscunque mulieribus ad
māmas sanguis colligitur, fu
rorem significat.

Aphor. 41.

Si velis noscere an conceperit mu.
lier, cum dormitura est ei aquam
mulsam potandā da: & si alui tormi.
na patietur, concepit: si minus, non
concepit.

Aphor. 42.

Mulier si marē concepit, bene co.
lorata est: si vero foeminam, ma

le colorata.

Aphor. 43.

Si mulieris grauidæ, i vtero sit erysi-
pelas, letale.

Aphor. 44.

Quæcūq; p̄ter naturā tenues exi-
stentes vtero gerūt, abortiūt
priusq; crassescāt.

Apho. 45.

Quæcūq; mediocriter corpora
habentes, abortiunt, secundo
aut tertio mense sine occasio-
ne manifesta: his acetabula vteri ple-
na mucoris sunt, & nō possunt ex pō-
dere fœtum continere, sed disrumpū-
tur.

Aphor. 46.

Quæcūq; p̄ter naturā crassæ,
nō cōcipiunt vtero. his omen-
tū os vteri cōprimit: & prius
q; extenuentur, non concipiunt.

Aphor. 47.

Si vterus in coxam vergens suppu-
ratur, necesse est linamētū fieri.

Aphor. 48.

Fœtus, mares quidē in dextris: fœ-
minæ vero in sinistris magis.

Aphor. 49.

Vt secunda p̄locidat, sternutato-
rio appposito, & nares apprehen-
dito, & os.

Aphor. 50.

APHOR. HIP P.

M Vlieri si velis mēstrua cohibere,
cucurbitulā quāmaximā ad
māmas appone. Aphor. 51.

Q Væ vero gerunt, his vteri os
comprimitur. Aphor. 52.

M Vlieri vtero gerēti, si lac multū ē
māmis effluat, foetū ibecillum si
gnificat, si vero māmē solidē fuerit,
foetum significant saniozem.

Q Væ corrupturæ sunt foetus, his
māmē extenuātur. Si vero rur
sus duræ fiant, dolor aut mā
mas, aut coxas, aut oculos, aut genua
infestabit, & non corrūpēt. Apho. 54.

Q Vibus os vteri durū est, his vte
ri os cōprimi est necessarium.
Aphor. 55.

Q Væcunque vtero gerente à se
bribus corripuntur, & fortis
ter calefiūt sine occasione ma
nifesta, difficulter pariunt, & cū picu
lo, aut abortū facientes periclitātur.
Aphor. 56.

IN fluxu muliebri si cōuulsio, & ani
mi defectus aduenerit, malum.

Aphor. 57.

Si mēstrua plura fiāt, accidūt morbi: & si non fiant, ex vtero morbi contingunt.

Aphor. 58.

Recto intestino, aut vtero inflāmatiōē patiēte, vrinx stillicidiū accidit, & renibus purulentis vrinx aduenit stillicidium.

Aphor. 59.

Si mulier nō concipit, scire autē velis si cōceptura sit, pānis circumtēctā de subter suffias, & si odor videatur p corpus ire ad nares, & os, scito quod ipsa non ex seipsa sterilis est.

Aphor. 60.

Si mulieri vtero gerenti purgationes eant, ipossibile est foetum esse sanum.

Aphor. 61.

Si mulieri cessent purgationes, neque febris, neque rigor superueniat, & fastidia incidunt, iudica ipsam in vtero habere.

Aphor. 62.

Quacūq; frigidus, & spissos vteros habent, non cōcipiūt. Et quēcūq; p̄humidos vteros habēt nō cōcipiūt. extinguitur enī in eis genitura. Et quacūq; siccos, magis

APHOR.HIP P.

& adurentes. nam ex defectu alimēti
corrumpitur semen. Quæcunq; vero
ex vtriusq; mediocrem habent tempe
raturam, hæc fecundæ sunt.

Aphor. 63.

Similiter aut & in maribus. aut enī
ppter corporis raritatem spiritus
extra fertur, vt semen nō trāmittatur
ad os: vel propter spissitudinem hu
mor nō exit foras: vel ppter frigidi
tatē nō cōcalescit, ita vt ad hūc colli
gatur locum: vel ppter caliditatē hoc
idem accidit.

Aphor. 64.

LAc dare caput dolentibus, malū:
malū vero & febricitantibus, &
quibus ilia suspēsa murmurāt, & siti
culosis: malū autē & quibus in febri
bus acutis bilioſe sunt deiectiones, &
qbus sanguinis multi deiectio facta
est. Cōuenit autē, & tabidis dare qui
nō valde multū febricitāt, & in febri
bus longis, & paruis, si nullū ex supra
dictis signis affuerit, & præter ratio
nem cōsumptis.

Aphor. 65.

Quibus tumores in vlceribus
apparent non conuelluntur
maxime, neque infaniunt.

Verum

Verum his euanescētibus de repente
huiusdā à tergo cōuulsiones & distē
tiones fiūt: quibusdā autē infania, vel
dolor lateris acutus, vel suppuratio,
vel difficultas ītestinorum, si tumores
sunt rubicundi.

Aphor. 66

Sl in vulneribus fortib⁹, & prauis
tumor nō appareat, ingēs malū.

Aphor. 67

Molles, boni: crudi vero, mali.

Aphor. 68

Dolenti partē capitis posteriōrē,
in frōte recta vena incisa pdest.

Aphor. 69

Rigores incipiūt mulieribus quidē
ex lumbis magis, & per dorsum
ad caput: sed & viris parte corporis
posteriore magis, q̄ anteriore, veluti
femorū, cubiti. Sed & cutis rara indi
cio aut est pilus.

Aphor. 70

Auartanis capti nō admodū cō
uulsiōibus capiūtur. Si vero prius
capiantur, & quartana supuenerit, li
berantur.

Aphor. 71

Quibus cutes circuntenduntur
aridæ & siccæ, sine sudore mo
riūtur, quibus vero laxæ & rare,

d

APHOR. HIPP.
cum sudore moriuntur.

Aphor. 72.
Qui regio morbo laborant, nō
multum ventosi sunt.

APHORISMO,
RVM HIPPOCRATIS
liber sextus, interprete Nico
lao Leonicensi Vicentino.



Aphor. 1.
In longis leuitatibus
intestinarū si ructus
acidus fiat qui prius
nō erat, signum bo
num.

Aphor. 2.
Quibus nares natura humidiores,
& genitura humidior, mi
nus integra sanitate fruuntur.
Quibus vero contraria, salubrius de
gunt.

Aphor. 3.
In longis difficultatibus intestino
rum, inedia ex fastidio malum, &
cum febre peius.

Aphor. 4.
Vulnera circum glabra, praua sunt.

Aphor. 5.
Dolores qui sunt in lateribus & pe

ctoribus, atq; aliis partibus, si multū differāt p̄discēdum. Aphor. 6.

Renum, & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur.

Aphor. 7.

Dolores vētris sublimes, leuiiores. Qui vero nō sublimes, fortiores.

Aphor. 8.

Aqua inter cutem laborātibus, vlcera in corpore facta difficulter sanantur.

Aphor. 9.

Latæ pustulæ non admodum pruriunt.

Aphor. 10.

Caput dolēti, & circūdolenti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens p̄ nares, aut os, aut aures, morbū soluit.

Aphor. 11.

Atrabile vexatis, & renū passionibus, hēmorrhoides superuenientes, bonum.

Aphor. 12.

Adiuturnis sanato hēmorrhoidib⁹, si vna nō seruetur, piculū est aquā iter cutē, vel tabē aduenire.

Aphor. 13.

A singultu habitū sternutatio superueniens liberat.

Aphor. 14.

Ab aqua iter cutem habito, si aqua a venis in ventrem defluerit,

d ii

APHOR. HIPPOCRATIS.

solvitur morbus.

Aphor. 15

A Longo alui profluvio habito, spontaneus vomitus superueniens morbum soluit.

Aphor. 16

A Morbo laterali, vel pulmōia habito, alui profluvium adueniens, malum.

Aphor. 17

Lippientem alui profluvio corripere, bonum.

Aphor. 18

Vesica dississa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut vetriculo, aut iecore, letale est.

Aphor. 19

Cum dississum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genæ particula tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit.

Aphor. 20

Si ventrem sanguis præter effunditur, necesse est suppurari.

Aphor. 21

In infanientibus si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, infantiæ solutio.

Aphor. 22

Quæcumque rupta ex dorso ad

cubitus descendunt, venæ sectio soluit. Aphor. 23.

Si timor, atq; maestitia longo tempore habētes pseuerent, ex eo atrabilis significatur. Aphor. 24.

Si quod intestinorum graciliū discindatur, non coalescit. Aphor. 25.

ERysipelas ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum: ab interioribus autē ad exteriora, bonū. Aphor. 26.

Qui in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur. Aphor. 27.

Quicūq; suppurati, aut aquam inter cutē patiētes vrūtur, aut secantur, si pus, aut aqua vniuersim effluxerit, omnes moriuntur. Aphor. 28.

EVnuchi, neq; podagra laborant, neq; caluifiūt. Aphor. 29.

Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. Aphor. 30.

Per podagra non laborat ante vsum venereorum.

APHOR. HIP P.

Aphor. 31.

Dolores oculorū meri potio, aut
balneum, aut venæ sectio, aut me-
dicamentum epotum soluit.

Aphor. 32.

BAlbi ab alui profluvio maxime
capiuntur.

Aphor. 33.

Qui acidum eructant: non val-
de morbo laterali corripun-
tur.

Aphor. 34.

Qui cum calui sunt, his magnę
varices non fiunt. Quibus ve-
ro caluis varices magnę super-
ueniunt, hi rursus capillati fiunt.

Aphor. 35.

Aqua inter cutem laborantibus
tussis superueniens, malum.

Aphor. 36.

Difficultatem urinx vena detecta iu-
uat: secare vero interiores.

Aphor. 37.

Angina habito, si tumor fiat
in collo, bonum.

Aphor. 38.

Cancros occultos omnes melius
est non curare. Curati enim cito
pereunt: nō curati vero, longius tem-
pus perdurant.

Aphor. 39.

Conuulsio fit, vel ex repletiōe. vel
inanitione; ita vero & singultus.

Aphor. 40.

Quibus dolor circa iliū fit abs-
que inflammatione, his febris
superueniens morbum soluit.

Aphor. 41.

Quibuscunq; suppuratio in cor-
pore existens non innotescit,
his ob crassitudinē puris, aut
loci, non innotescit. Aphor. 42.

Morbo regio laborantibus, si fiat
hepar durum, malum.

Aphor. 43.

Quicunque lienosia à difficulta-
te intestinorum capiūtur, his
superueniente longa difficul-
tate intestinorum, aqua inter cutem,
leuitas intestinorum aduenit, & mor-
iuntur. Aphor. 44.

Quibus ex stillicidio vrinę ileos
superuenerit, ī septem diebus
pereunt, nisi febre superueniē-
te, satis vrina fluxerit. Aphor. 45.

Vlcera quęcunque annua sunt, aut
etiam diuturniora, os abscedere
est necessariū, & cicatrices cauas fieri.

d iiii

APHOR. HIPPOCR.

Aphor. 46.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur.

Aphor. 47.

Quibuscumque venæ sectio, vel purgatio, cum medicamento cōuenit, hos verè purgare, vel venam incidere oportet.

Aphor. 48.

Lenosis difficultas intestinorū superueniens, bonū.

Aphor. 49.

Quicūq; morbi podagrici sūt, hi sadata in quadraginta diebus inflammatione finiunt.

Aphor. 50.

Quibuscumque præciditur cerebrum, his necesse febre, & bilis vomitum superuenire.

Aphor. 51.

Quicunque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim multi fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

Aphor. 52.

Oportet vero & considerare oculorum in dormiētibus suspensiones. Nam si quid album cōmissis pal-

pebris subinspicitur, neque ex alui
profluvio, aut medicamento potione
istud contingat, malum est signum,
& letale valde. Aphor. 53.

DEsipientiæ quæ cum risu fiunt, se-
curiores. quæ vero cum studio, pe-
riculosiores. Aphor. 54.

IN acutis passionibus quæ cū febre
sunt, luctuosa suspiria, malum.

Aphor. 55.

DOlores podagrici, vere, & autū-
no magna ex parte mouentur.

Aphor. 56.

IN morbis melancholicis ad hæc
periculosi decubitus, stuporem cor-
poris, vel conuulsionem, vel furorē,
vel cæcitatem significant.

Aphor. 57.

APoplexiæ autem fiunt, maxime
à quadragesimo anno vsque ad
sexagesimum. Aphor. 58.

SI omētum excidat, necessario pu-
trefcit. Aphor. 59.

QVibuscunque à coxendicū do-
lore molestatis excidit coxa,
& rursus incidit, his mucores
superueniunt. Aphor. 60.

APHOR. HIPPOCR.

Quibuscumque à coxendicum dolore molestatis diuturno excidit coxa, his crus tabescit, & claudicant, si non vrantur.

APHORISMORVM HIPPOCRATIS LIBER SEPTIMUS, Nicolao Leonicensi Vicentino interprete.

IN morbis acutis, frigus partium extremarum, malum. Aphor. 1.

IN osse ægrotante caro liuida, malum est. Aphor. 2.

AVomitu singultus, & oculorum rubor, malum. Aphor. 3.

ASudore horror, non bonum. Aphor. 4.

AFurore difficultas intestinorum, vel aliqua inter cutem, vel mentis alienatio, bonum. Aphor. 5.

IN morbo diuturno fastidium cibi & deiectiones syncerae, malum. Aphor. 6.

Aphor. 7.

EX multa potatione rigor & desipientia, malum

Aphor. 8.

ATuberculi intus ruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectio fit.

Aphor. 9.

AProfluvio sanguinis, desipientia, ac convulsio, malum.

Aphor. 10.

AB ileo, vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio, malum.

Aphor. 11.

AMorbo laterali inflammatio pulmonis, malum.

Aphor. 12.

APulmonis inflammatione phrenitis, malum.

Aphor. 13.

AB æstibus fortibus convulsio, aut distentio, malum.

Aphor. 14.

IN capitis ictu obstupescētia, & desipientia, malum.

Aphor. 15.

ASanguinis sputo, puris sputum.

Aphor. 16.

APuris sputo phtisis, & fluxus. cum vero sputū retinetur, moriūtur.

APHOR. HIPPOCR.

- I**N hepatis inflammatione singul-
tus, malum. Aphor. 17.
IN vigilia, conuulsio, vel desipien-
tia. Aphor. 18.
IN ossis exutione erysipelas.
Aphor. 19.
AB erysipelate, putredo, aut suppu-
ratio. Aphor. 20.
AForti in vlceribus pulsu, proflu-
uium sanguinis. Aphor. 21.
AVentris dolore diuturno, suppu-
ratio. Aphor. 22.
ADiectione sincera difficultas in-
testinorum. Aphor. 23.
IN ossis præcisione desipientia, si in
vacuum apprehenderit. Aphor. 24.
EX medicamenti potione conuul-
sio letalis est. Aphor. 25.
IN forti dolore vëtris, partium ex-
tremarum frigiditas, malum. Aphor. 26.
MVlieri vtero gerenti, si tensio su-
peruenerit, facit abortum. Aphor. 27.
Aphor. 28.

Q Vando os, aut cartilago, aut
neruus abscinditur in corpo-
re, non augetur.

Aphor. 29.

Q Vi alba pituita detinetur, si
fortis ventris fluxus superue-
nerit, a morbo liberatur.

Aphor. 30.

Q Vibus in alui profluuiis excre-
menta spumosa sunt, his ex
capite pituita defluit.

Aphor. 31.

Q Vibuscūque febricitantibus,
in vrinis fiunt sedimina, ve-
luti farina crassior, longam
ægritudinem fore significat.

Aphor. 32.

Q Vibus autem biliosa sedimi-
na supra tenuia, acutum mor-
bum significant.

Aphor. 33.

Q Vibuscunq̃ue vrinæ distantes
sunt, his turbatio fortis in cor-
pore fit.

Aphor. 34.

Q Vibus in vrinis bullæ subsi-
stunt, morbum renalem, &
longum significant.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 35.

Q Vibus insidens pingue, ac simul totum his, renum vitium acutum significatur.

Aphor. 36.

Q Vibus autem morbo renali laborantibus, prædicta accidunt signa doloresque circa spinæ musculos fiunt, si quidem circa loca exteriora fiant, abscessus quoque exterius futuros expecta: si vero dolores magis circa loca interiora fiant, etiã abscessus expecta futuros interius.

Aphor. 37.

Q Vicunque euomunt sanguinẽ, si sine febre quidem, salutare: si vero cum febre, malum. Curare vero acerbis, & refrigerantibus.

Aphor. 38.

D Eistillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies.

Aphor. 39.

S I quis sanguinẽ minxerit, & grumos, & stillicidio vrinæ laboret, & dolor inciderit in femur & imum ventrem, pectinemque qui circa vesicam male se habere significatur.

Aphor. 40.

Si lingua repente incontinens fiat,
aut aliqua pars corporis stupore
elanguit, tale est melancholicum.

Aphor. 41.

Si timor atque mœstitia longo tē-
pore hominem habentes perse-
uerauerint, tale est melancholicum.

Aphor. 42.

Si senioribus supra modum purga-
tis, singultus superuenerit, non bo-
num.

Aphor. 43.

Si febris non ex bile habeat, mul-
ta aqua calida capiti superinfusa,
solutio fit febris.

Aphor. 44.

Mulier ambi dextera non fit.

Aphor. 45.

Qvicunque suppurati vruntur,
vel secantur, si pus purum flu-
xerit, & album, euadunt. si ve-
ro subcurentum, & fœculentum, ac
fœtidum, pereunt.

Aphor. 46.

Qvorū hepar suppuratū aduri-
tur, si pus purū fluxerit, & al-
bum, euadūt: in tunica enim
his pus cōtinetur. si vero qualis amur-
ca fluat, pereunt.

Aphor. 47.

APHOR. HIPP.

Dolores oculorum post meri portionem, & aquæ calidæ balneū, venæ sectione curato. Aphor. 48.

Aqua inter cutem laborans, si à tussi habeatur, desperatus est. Aphor. 49.

Vrinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, vini potio & venæ sectio soluit, incidere autem interiores. Aphor. 50.

Angina habito, tumor, & rubor in pectore superueniens, bonum. extra enim vertitur morbus. Aphor. 51.

Quibus cerebrum sphacelatū, id est corruptum est, in tribus diebus pereūt. si vero hos euaserint, sani fiunt. Aphor. 52.

Sternutamentum fit ex capite, calesfacto cerebro, aut humectato eo quod in capite inani. Aer enim intus contentus extra erumpit. sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus. Aphor. 53.

Quicunque hepar circūdolent, his febris superueniens soluit dolorem. Aphor. 54.
Quibus

Q Vibus à venis sanguinē mitte
re confert, his verē venā oportet
secare. Aphor. 55.

Q Vibus iter vētriculū, & septū
pituita reposita est, & dolorē
affert nō habens exitum, neq;
ad alterū ventrē: his per venas ad vesī
cam pituita versa soluitur morbus.

Aphor. 56.

Q Vibus hepar aqua plenum in
omentum eruperit, his venter
aqua repletur & moriuntur.

Aphor. 57.

H Alyce, anxietudo, oscitatio, hor
ror, vinū equali potū soluit egri
tudinem.

Aphor. 58.

Q Vibus in vrina ī meatu tuber
cula fiunt, his suppurationē fa
cta, & eruptiōe, soluitur dolor.

Aphor. 59.

Q Vibus cerebrū aliqua ex cau
sa cōcussū fuerit, necesse est
statim mutos fieri.

Apho. 60.

Corporibus carnes habētibus hu
midas, famem adhibere conue
nit. fames enim corpora siccāt.

APHOR. HIPPOCRATIS.

Aphor. 61.

Vbi in toto corpore mutationes
& corpus refrigeratur, & rursus
calefit, aut color est alium ex alio cō-
mutat: lōgitudō morbi significatur.

Aphor. 62.

Svdor multus, calidus, vel frigidus,
semper fluēs humorē abduci, ro-
busto quidē supra, debili vero infra si-
gnificat.

Aphor. 63.

Si quis cibum febricitāti dederit, vt
sano robur, sic laboranti morbus.

Aphor. 64.

Quæ per vesicam excernuntur,
inspicere oportet, si talia qua-
lia sanis excernuntur. Quæ igitur
minime similia sunt his, hæc mor-
bosiora. Quæ vero sunt sanis similia
hæc minime morbosa.

Aphor. 65.

Et quibus deiectiones, si stare per-
miseris, & nō moueris, veluti strig-
menta subsistunt: & si pauca, paucus
est morbus, & si multa, multus. his cō-
fert alui purgatio. quōd si aluo non
purgata dederis sorbitiones, quanto
plures dederis, tanto magis nocebis.

Aphor. 66.

EXcreationes in febribus nō inter-
mittentibus liuidę, sanguinę bilio-
sę, & fœtidę, omnes malę. Cum ve-
ro bene excernuntur, bonum est, &
per ventrem, & per vesicam, & vbi
aliquid secedens steterit non purga-
tum, malum.

Aphor. 67.

Corpora oportet vbi quis purga-
re voluerit fluida facere. & si su-
pra, sistere aluū. si vero infra, hume-
ctare.

Aphor. 68.

Somnus, vigilię, vtraque modum
excedentia, morbus.

Aphor. 69.

In febribus non intermittentibus,
si exteriora frigent, interiora vrun-
tur, & febris habeat, letale.

Aphor. 70.

In febre non intermittente si labrū,
aut nasus, aut oculus, aut superciliū
puertitur, si non videat, si nō audiat,
& iā debilis sit quicquid horum fue-
rit, mors ppe est.

Aphor. 71.

Apituita alba, aqua inter cutem su-
peruenit.

Aphor. 72.

e ii

APHOR.HIPP.

AB alui profluvio difficultas ī testi-
norum. Aphor.73.

ADifficultate ī testinoꝝ, leuitas ī te-
stinoꝝ supuenit. Aphor.74.

ACorruptione, abscessus ossis.
Aphor.75.

ASāguinis vomitu, tabes, & puris
purgatio supra. Aphor.76.

QValia fuerint vesicæ, aut alui
excremēta, & ex carnibus, &
sicubi à natura corpus exierit
si paꝝ, paucus est morbus: si multum,
multus: si valde multum, letale est.

APHORIMORVM HIPPO
CRATIS FINIS.

CHIPPOCRATIS

COI PRAESA GIORVM

liber primus, Gulielmo Co
po Basi liēsi īterprete.



1.
Nil perinde medico cō
ducibile censeo, quā vt
prudentem se præstare
laboret. 2. 3.

SI enim apud agros præterita, præ
sentia, & futura, atq; ea q̄ ipsi inter

narrādū omiserūt nouerit, prædixēritq; nihil, quod egris vfu fuerit, ignorare putabitur . quo fit vt audentius homines medico sese comittant.

4.

ETenim perquam salutarem adhibebit curationem, si futuras affectiones præuiderit. Nā fieri nō potest vt omnes egros sanitati restituat, quāquam hoc multo præstantius erat, quam futura prænoscerē.

5. 6.

IGitur quum homines intereāt, alii quidē ob morbi vehemētiā, ātea q̄ vocetur medicus, nonnulli vero, vocato licet medico, repēte moriuntur, ac alii vnico dum taxat die, alii paulo longiori spacio vitam extendūt, prius q̄ medicus arte sua singulis morbis occurrendo resistāt. Proinde harum affectionum naturas noscere oportet, quantum videlicet corporis viribus sint superiores.

7.

Quin ē si diuinū qdpiā morbis inest, huius quoq; puidētiā p̄disce. sic enim optimo iure, & admirabilē, & bonū se præstabit medicū: quos enim sup̄stitēs fore cognos-

c iii

PRÆSAG.

uerit, eos rectius quoq; seruabit, ut po-
te ex multo tēpore singula cōsulte p-
pendēs. Itaq; morituros, victurosq; p-
sentiēs, atq; denunciās, oēm prorsus
calūniam vitabit.

NOTAE EX FACIE.

8. 9. 10.

IN acutis morbis sic cōsideraŕ oportet, in primis qdē egri faciē, an fa-
norum faciebus, maxime vero suę
ipsius, similis sit. ea enim optima cen-
senda est: quę vero maximo discrimi-
ne ab hac similitudine recedit, grauif-
simū periculū portēdit, cuius hę sunt
notæ. Nares acutæ. oculi cōcaui, colla-
psa tēpora, frigida cōtractęq; aures,
& imis partibus leniter versæ, cutis
circa frōtē dura intēta & arida, totius
faciei color aut niger, aut pallidus aut
liuens, aut plumbeus. 11.

QUod si iter morbi initia hmōi
facies appareat, neq; ex aliis ī-
diciis cōiectura sumi possit, in-
quirēdū est, an vigilia, aut vētris vehe-
mēs resolutio, aut inedia præcesserit:
quorū si qdpiā dephēderis, nihil picu-
li timendū est. atq; si ob hmōi cās, hęc

faciei spēs orta est, vna die, nocteq; finitur. si vero eas p̄cessisse eger negauerit, diutiusq; iam dicto tēpore, hec forma durauerit, scire licet eum morti proximum esse.

12.

Quod si in vetere morbo iā tri-
duo, quadriduo ve talis est, inq-
renda sunt ea signa, q̄ supra p̄-
posui. ad hæc, reliqua quoq; indicia,
nō solum ex facie, verumetiam ex re-
liquis corporis partibus perpenden-
da sunt, præcipue ex oculis.

NOTAE AB OCVLIS.

13.

Nam si lumē refugiūt, & illa-
chrymāt, idq; p̄ter volūtātē,
aut puertūtur, alterq; ex iis
minor ē, & q̄ i ipsiis alba esse
debēt, rubescūt, aut genę pallēt, atq; i
isdē venulę nigricāt, aut lippitudo i-
natās tādē āgulis iheret, aut frequēs ē
oculorū motus, iiq; aut vehemēter sub-
federūt, aut facti tumidiores sūt, fue-
ritq; aspectus horridus obscurusq;, at-
que vniuersę faciei color mutatus: hæc
omnia signa, mala, perniciosaque pu-
tanda sunt.

14.

c iiii

PRÆSAG.

Quinetiā oculorū per somnum
suspectiones obseruandę sunt.
Vbi enim palpebrę non com-
mittuntur, sed inter has ex albo ocu-
lorum aliquid apparet, neq; id fluens,
alius, aut medicamēti potio præcessit
præsertim si quis nō sic dormire cōsue-
uerit: prauum hoc signum. letalēq; ad
modum est. 15.

Si palpebra, aut labrū, aut nasus re-
torquetur, aut pallet, aut liuore in-
ficitur, accedente quopiā reliquorum
signorū egrum morti proximum esse
haud dubitādū est. Mortem etiā por-
tendunt labra resoluta, suspensa, frigi-
da candicantia.

A DECUBITV NOTAE.

Deprehendendus est æger in
dextrum sinistrū velatus cu-
bās, brachiis, ceruice, & cru-
ribus paulū reductis ac vni-
uerso corpore molliter affecto, qui fe-
rē sani quoq; iacētis habitus est. quip-
pe quū optimus sit ille decubitus, qui
à sanorum consuetudine non variat. 16.

17.

Sed non laudatur decubitus, quo
brachia, ceruix, & crura extendū
tur. 18.

Id vero grauius est, si seipsum eger
continere non valēs, ad pedes sub,
inde delabitur. 19.

Vbi pepes nudat, neq; iis calor sub
est, vbi brachia, ceruicē, & crura
īequabiliter dispergit ac nudat, malī
morbi, angorisq; signū est. 20. 21.

Perniciosum est, vbi hiās q̄s assidue
dormit, aut vbi supinus iacet, cru
ribus vehemēter cōtortis, cōplicitisq;.

Si p̄nus iaceat is, q̄ p̄ bonā valetudi
nē sic dormire nō cōsuevit, aut deliriū
aut vētris dolorē portēdit. 22. 23.

Vbi residere vult æger in ipso mor
bi vigore, malū qdē īdiciū est in
oībus acutis affectibus, sed lōge pessi
mū pulmōibus laborātibus. 24.

Stridor dētiū p̄ febres, p̄ter cōsue
tudinē à teneris contractam, insa
niā significat & mortē. atqui ab vtrif
que futurū periculum denunciandum
est. Si vero iā deliranti, stridor quoq;
accedit, vix aliā eque perniciosam in

PRÆSAG.

uenies notam.

25.

Vlcus, siue ante, siue in ipso morbo natū est, obseruari debet. nā si moriturus est homo, aridum aut liuēs, aut pallidū, añ mortē appet. 26.

Ex mannū lotionē huiuscemodi notas perpēde, in acutis febribus, in peripneumonia, phrenetide, capitis dolore, si quis eas faciei admouerit, vt inde quidpiā superuacue venetur, aut festucas carpat, aut à veste flocos, aut à pariete paleas auellat, omnes hæ malæ letalēsq; sunr 27.

Spiritus frequens, aut coloris, aut inflammationis in partibus: septo transuerso superioribus, indicium est. Magnus, & ex longis interuallis, delirium declarat. Frigidus ex naribus & ore p̄diēs, letalis admodū est. 28.

Facilis spiratio, in acutis morbis, quibus febris copulatur quiq; itra quadraginta dies finiri solēt, magnū habet ad salutem momentum.

DE SVDORE. 29.

Svdores, saluberrimi censentur, in omnibus acutis morbis, si in diebus decretoriis oriantur, se.

brimq; finiant, aut vbi toto corpore æqualiter insudante, æger morbum facilius sustinere videtur. Contrà inutiles, q id efficere nō valēt. Pessimi omnium sunt frigidi, & vbi caput dūtaxat aut facies, aut ceruix insudat: quippe qui in acuta quidem febre, mortem, in mitiore vero, morbum diuturnū fore significant.

A PRÆCORDIIS NOTÆ.

30.

A Tq; inter optima indicia sunt præcordia, vbi sine vilo sensu doloris in vtraq; pte æqualiter mollia sunt. Inflāmata vero, dolentia, & intēta, & vbi aliter in dextra aliter in sinistra parte afficiuntur, suspecta haberi debēt. 31. 32.

P Ræcordioꝝ venę, si pulsēt, aut turbationē, aut deliriū portēdūt: sed eoꝝ qui sic affecti sunt, oculos aspicerē oportet: quippe frequens illoꝝ motus, insaniam cōminatur. 33.

P Ræcordia tumida, dura, dolētia, si in vniuersum sic affecta sūt, maximū malū portēdūt, si vō altera pte dūtaxat, ex sinistra minus piculū est.

PRÆSAG.

34. 35. 36. 37.

Cæterū huiusmodi tumores, in pri-
cipio qdē proximā mortē denun-
ciant. vbi vero viginti dies excesserit,
neq; q̄lescēte febre, neq; tumore remis-
so ad suppurationē cōuertūtur. Atq;
inter primos circuitus, sanguis ē nari-
bus fluēs, nō mediocri ipsis præsidio
est. sed tū sanguinis eruptio expecta-
ri debet, quū interrogati, aut caput do-
lere, aut oculos caligare fatētur. id ve-
ro iunioribus, videlicet circa quātum
& trigésimum annum, plarunq; eue-
nire solet.

38. 39.

Mollis tumor dolorē nō inferens,
& digitis cedens, lōgiori tēporē
finitur, sed nō ita graue ab eo piculū
pendet. Quōd si intra sexaginta dies,
neq; febris desinit, neq; tumor resedit
suppurationē expectare oportet. Idē
haud secus in reliqs quoq; vētris parti-
bus perpenditur.

40.

Itaque durus, magnusq; tumor, do-
lore crucians, mortis periculū, non
multo post fore denunciat. Mollis ve-
ro & sine dolore, quiq; prementi digi-
to cedit, longus esse solet.

41. 42. 43.

VEntris tumores, non tā crebro, vt hi qui in p̄cordiis oriūtur, abscessum effitiūt. quod si sub vmbilico cōstituātur, nequaquā ad suppurationem cōuertentur, sed ex superioribus maxime sedibus, sanguinis fluorē expectare oportet. In qbus omnis humor dururnus, ad suppurationem ferē spectat.

44.

ITaq; suppurationum obseruatio sic accipienda est. earum enim q̄ in exteriorē partē erūpunt, optimæ sunt parue, admodū eminētes, atq; in acutū fastigiatae, pessimæ vero sunt, quæ maximæ, quaq; planissimæ sunt.

45.

Sed illarum quæ intus excitantur, optimæ censentur, quæ exteriorē cutem non decolorant, & contrahuntur, nulloque dolore cruciant, atque vbi exterioris cutis color manet vniformis.

46.

PVs illud optimum est, quod albū & leue est, & haudquaquā foetet. qđ vero ab hoc variat, pessimum est.

PRÆSAG.

CHIPPOCRATIS
COI PRÆSAGIORVM LI
ber secundus, interpretæ Gulielmo Copo
DE AQUA INTERCVTEM.

1.



Qua inter cutem si ex
acuto morbo cœpit, pi
culosa est. neq; enim fe
brim soluit, sed dolori
bus torquet atq; interfi
cit, oritur vero magna
ex parte vel ab ilibus & lumbis, vel à
iecinore.

2.

Sed ubi ab ilibus lumbisq; ortum
contraxit, pedes tumidos reddit,
fluorē diuturnū inducit, qui neq; lum
borum. illiūue dolorē soluit, neque vē
trem efficit molliorem.

3.

At quibus à iecinore aqua inter cu
tem proficiscitur, ii tussi vexātur,
sed qua penē nihil excreatur, pedes tu
ment, deiectio dura, coctāque est, cir
ca ventrē tumores, modo in dextra,
modo in sinistra parte attollūtur, de
inde desinunt.

4. 5. 6.

MAli etiam morbi signum est, caput & pedes, manusque frigidas habere, ventre & lateribus calentibus. Securitatem pollicetur corpus, quod æqualiter molle, & calidum est, quod que facile conuertitur & surgit.

7. 8. 9.

GRauitas vero, quæ vel manus & pedes, vel reliquum quoque corpus premit, periculum significat. Quod si cum grauitate, vngues quoque ac digiti liuore afficiantur, cōtinuò perniciem expectare oportet. At omnino nigri, tum digiti, tum pedes, minus quæ liuentes, periculum portendunt. sed tunc ad reliqua signa refugerè oportet. etenim si æger facile malum sustinet, adsintque alia quædam indicia, quæ securitatem polliceri solent, superpurationem sperabis, atque superstes manebit æger sed denigratæ corporis partes decident.

10.

Testiculi pudendâque retracta, vehementes dolores, atque letale periculum significant.

PRÆSAG.
DE SOMNO. II. 12.

Quod vero ad somni rationē pertinet, quēadmodū sani etiā solent, interdū vigilare, noctū vero dormire oportet: à qua cōsuetudine si quis aberrauerit, peior erit somnus quā inter quartā horā & noctē, quā quā matutino tēpore ad quartā. pessimū tamen est, si somnus neque noctū, neque interdiu accedit. id enī ob dolorē laborēque accidit, vel deliriū futurū signat.

DE ALVI EXCREMENTIS.

13.
Alvi excrementa inter bona indicia sunt, si mollia, si figurata sunt, si eodē ferē tēpore quo in secunda valetudine deiici solebāt, excernūtur: si his quā ingerūtur proportionē respondent, utpote quæ inferiorem ventrem recte valere declarāt.

14.
Si vero liqda fuerint, prestat ut sine stridore, neque frequēter, neque ex breuib; interuallis deiiciātur, etenim fatigatur æger, si crebro surgit, vigiliisque consumitur, quum vero affatim

tim saepeq; deiicit, ne animus eum deficiat, periculum est.

15.

COnuenire debent excrementa, his quæ assumuntur, & bis ter ve interdium, noctu vero semel deiici, idque maxime matutinis temporibus pro cuiusq; cōsuetudine.

16. 17.

AD finē iam tendente morbo, bonum est si crassiora reddantur, ac rufa, & odoris foeditate, sani hominis aliu non vehementer excedant.

18.

LVmbricos etiā cū excrementis sub fine morbi descēdisse nihil nocet.

19.

VEnter in quouis morbo vacuus, corpulentusq; esse debet.

20.

Periculosum stercus est, quod perliquidum, albicans, pallidum, vehementer rufum, aut spumans est.

21.

Item malum est, quod exiguum, glutinosum, idēq; subpallidum est.

22.

OMnium maxime letiferū est, nigrū, pingue, liuēs, aut qd' peioris odoris q̄ pro consuetudine.

f

PRÆSAG.

23.
Varia excrementa, quæ diutius mortem differunt, non tamen minus sunt letalia. huiusmodi & rametosa sunt, biliosa & nigra, atque porri colore imitantur. 24.

Inter optima signa est flatus, qui neque strependo, neque pedendo emittitur. quæ enim satius est ipsum cum strepitu exire quàm includi: tamen hoc pacto procediens aut dolore, aut delirare ægrum significat, nisi sua sponte flatum ipsum emisserit. 25.

Precordiorum recentes quidem dolores, gibbosque, nisi inflammatio quoque accesserit, murmur in ipsis exortum soluit, ac una cum stercore, & urinis, atque flatu agreditur. quod ubi non contingit, si tamen ex sede sua transfertur, bonum signum est, idque magis si ad inferiora descendit.

DE VRINIS.

26.
Vrina illa optima est, in qua per totum morbi decursum residet album, leue, æquale: hæc nimirum securitatem, breuemque

morbū significat. Quod si aliqd horū
deest, vt modo liqda sit, modo albū,
leueq; in ipsa resideat, hęc vt longiorē
morbū denūciāt, ita securitatē mino-
rem pollicetur. 27.

Subruba vrina, in qua subrubrū,
leueq; residet, q̄q; supiore morbū
diuturniorē, eundē tñ salubriorē fore
declarat. 28.

Mala est vrina, quū id qd̄ residet,
parti farinae crassiori simile est.
peior vero, si lamis. ac vitupatur quo-
que alba tenuisq; quāq; longa maius
periculū illa portendit in qua quædā
tanq; surfura resident. 29.

Nebulę in vrina suspensę, albę qdē
bonę, nigre vero malę sunt. 30. 31. 32.

Cæterū quoad vrina rufa, tenuisq;
apparuerit, crudū morbū signat.
q̄ si diutius talis pmāserit, ne priusq;
morbus quiescat, eger viribus destitu-
tus succubat, periculū est. Perniciosissi-
ma est vrina, q̄ mali odoris, & diluta,
& tenuis, & nigra, & crassa est. 33

In viris quidē & mulieribus nigra,
in pueris vero tenuis & diluta, de-

PRÆSAG.

terrима est.

34.

SI vrina tenuis & cruda, sic diu feratur, vt reliqua signa salutaria sint, plerūq; infra septū trāuersum abscessus oriri solet.

35.

Neq; leuiter terrere nos debet vrina, cui pinguedo telis araneorū similis innatat, qppe quę hoīem tabe cōsumi significat.

36.

Nubecularū positum, supremū ne locum, an infimū teneant, obseruare oportet. Nā quę in ima pte cōstituantur cū coloribus quos supra ppositi, bonę sunt, atq; laudātur: quę vero sursum attolluntur, malę, vituperandęq; sunt.

37.

Sed caue ne vesica quoquo mō affecta (si huiusmodi reddiderit vrinas) te decipiat. tales enim nō ad vniuersum corpus, sed ad ipsam dūtaxat vesicam referri debent.

DE VOMITV.

38.

Perquā utilis est vomitus, q; bilem pituitę mixtam habet, si neq; crassitie, neq; multitudine admodū excedat. nā syncerę

pituita, bilisue vomitus piculosus est.

39.

SI vero viridis, aut liuidus, aut niger est, quilibet horum colorum acciderit, viciosus est.

40.

SI vero oēs affatim in eodē appareant, mortis periculū valde timendum est.

41.

42.

AD vltima ventum esse testatur liuidus vomitus, præcipue si malus in hoc odor est. si quidem foetores in quouis vomitu mali sunt.

DE SPVTO.

43.

44.

45.

IN pulmonis, costarumq; doloribus, oportet vt sputū celeriter, facileq; screetur, & cruor sputo vehementer misceatur. Etenim si multo post doloris initium, aut cruentum, aut rufum, aut nō sine multa tussis, nec adeo cōmixtum expuitur, viciosum censetur.

46.

QUippe cruentum si syncerum quoque fuerit, periculum subesse testatur. album vero, viscidum, & rotundum, inutile est.

47.

f iii

PRÆSAG.

MAli etiā morbi testimonium est
qd̄ admodū viride, quodq; spu
mosum est. 48.

ID vero omni alio deterius est, qd̄
sic est syncerū vt nigrū quoq; videa
tur. Neq; tutum est sputū, quod nō ex
purgatur, nec proicit ipsum pulmo,
sed ob nimiam plenitudinē feruet in
gutturē. 49

IN omnibus morbi pulmonis destil
latio, sternutamentūq; siue præue
rint, siue supuenerint, periculū osten
dunt: quāq; in cæteris morbis, vel peri
culosissimis, vtilitate carent. 50.

Sputum cruentū cui paulū sangui
nis admixtū est, in morbi princi
pio, inflāmato pulmone p̄iectū, secu
ritatē atq; auxiliū pollicetur. qd̄ vero
ad septimū vsq; diē, longiori ve spa
cio tale apparet, nō adeo tutū est. 51.

Orne sputum, quod dolorem nō
mitigat, malū est. Nigrum (vt su
pra demonstrauius) pessimum est:
sed longe saluberrimum est, id quod
dolorem placat.

DE SUPPURATIONE.

§ 2.

DOlores in dictis sedibus, quos neque sputi purgatio, neque soluta alius, neque sanguinis missio, neque medicamentum, neque victus ratio, sedare potuit, scire licet eos ad suppurationem tendere.

§ 3. § 4. § 5.

Suppuratio erumpens, sputo adhuc bilioso apparete, siue bilis seorsum, siue vnà cū pure expuatur, admodū perniciosa est, p̄sertim si à die morbi septimo incœperit pus ab huiuscemodi sputo p̄cedere. Itaq; timendū est ei qui sic expuit, ne decimaquarta die moriatur, nisi salutiferū aliqđ iudiciū interea supueniat.

§ 6.

Porro bonæ spei signa sunt, si eger bñ sustinet morbū, si facile spirat, si dolor leuatus est, si sine difficultate s̄creat, si corpus equaliter molle & calidū est, neque sitis infestet: p̄terea vrina, alui sedimīa, somni, sudores, vt de singulis supra demonstrauimus, probe rñ dent. quorū si nullū deest, haudquāq; æger morietur. Cōtrā, si intolerabilis

f iiii

P R Æ S A G.

est morbus, si halitus magnus & frequēs est, neq; mitigatus est dolor, vix sputū redditur, sitis vehementer cruciat, febris inæqualr corpus afficit, si deniq; vēter & latera vehemēter calēt, fronte, manibus, & pedibus frigore affectis. atq; vrina & alui excremēta, & somni, & sudores, ex supra ppositis notis periculū minantur. quicquid horum iam picto sputo supuenerit, aut nono, aut vndecimo die ægrum moriturum significat, ita vt decimū quartum non queat attingere. Huiusmodi coniectura letale sputum cōsequi oportet, qđ videlicet ad decimū quartū diem ægrū viuere nō permittit. Ex pdictis itaq; signa, tum bona, tū mala ppēdere, ac subinde futura prædicere oportet. § 7.

Reliquæ autem vomitæ magna ex parte rumpūtur. sed aliæ in die vigesimo, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, nonnullæ ad sexagesimū vsq; perueniunt. § 8.

Proinde suppurationis initiū obseruare oportet, qđ ab eo die putandum est quo primū quis aut febr-

citauit, aut inhorruit, aut pro dolore grauitatē illius partis sensit, quā antea dolor infestabat. Nā talia in suppurationū principio accidere solent. ab hoc igitur tēpore, vsq; ad iam definita spatia, vomicarū eruptiones expectandæ sunt.

59.

AN vero alteram dūtaxat partem vomica occupet, ex his ferē notis perpendere licet, si alterū latus dolore cruciatur, & altero calidus est, atq; vbi in partē sanam aliquis decubuit, interrogatus, onerari eam, veluti ex pondere aliquo, respondeat. quibus cognitis, in eo latere suppurationem esse coniicies, cui grauitas incūbit.

60. 61.

SVppuratos omnes hoc pacto deprehendes. Si febris non dimittit, eaq; interdiu leuior est, noctu incrementum, multus sudor oritur, tussiendo cupiditas est, sed nihil penē excreatur, oculi cauantur, malæ rubent, vngues in manibus curuantur, digiti, maximeq; summi calent pedes tumēt, cibī fastidiū est, pustulæ toto corpore nascuntur. Atq; diuturnarū vomicarum

PRÆSAG.

hæ sunt notæ, quibus haud dubia fides adhibenda est. Sed quæ breuiori spatio duraturæ sunt, ex iisdem notis deprehenduntur, atque ex his quoque quæ in principio apparere solent, simul si spiritus maiori cum difficultate trahitur.

62.

Celeriorē, tardiorē ve eruptionem ita cōiicies. Si protinus ab initio tussis fuit, & spiritus difficultas, atque sputi excretio, vomica intra vigesimū diē erūpet. Si vero nō adeo vehemens fuerit dolor, cæteraque illi ex proportionē rēdeant, serius ruptura sequetur. quo tempore & dolorē & spirandi difficultatem minui, atque sputi scretū incrementum, ante videlicet puris eruptionē, necesse est.

63.

Cæterum à periculo tuti sunt, quibus eodem die quo eruptio facta est, febris cōquieuit, desierūtque vrgere cibi fastidiū & sitis, alius exigua quædam & figurata reddit, pus album, leue, simplici colore, & sine pituita est, atque sine dolore leui tussicula eiicitur. Hæ sunt notæ per quā salubres, quæ ce-

leriter liberant hominē. ab his securitatem quoq; pol icētur, quę ad ipsas proximē accedunt. At certū periculū est, si febris non quieuit, aut post quietem repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est liuidum aut pallidū, si nihil nisi spumantem pituitā eger screat. Itaque seruari non possunt, quibus oīa hęc accidūt. quibus vero non oīa, alii quidem moriuntur, alii vero post longa temporū intervalla sani euadunt. Ex omnibus autē iam ppositis cōiecturis, reliquarum quoq; affectionum signa considerare oportet.

DE ABSCESSIBVS.

64.

Quibus ob laborantē pulmonē, abscessus secundū aures oriuntur, & in partibus infernis suppurantur, ac fistulam efficiunt, iis secunda valetudo contingere solet.

65.

In quibus huiuscemodi notas obseruabis. Si febris non cōquiescit, neq;

PRÆSAG.

dolor mitigatur, si sputum non pro
ratione eiicitur, si alius, neque bilio-
sa, neque liquida, neque sincera excer-
nit, si in vrina admodū exigua, mul-
ta resident, ac reliqua quoque signa
omnia securitatem polliceatur, eius-
modi abscessus expectandi sunt.

66.

Q Vi aliis quidem eueniunt in
partibus infernis, si quodam
modo inflāmata fuerint præ-
cordia: aliis vero in superioribus, si
præcordia neque tumore, neque do-
lore infestantur, sed accedit pro tem-
pore spiritus difficultas, quæ deinde
sine vlla euidenti occasione quiescit.

67.

IN vehementi periculosaque peri-
pneumonia non inutiliter in cru-
ribus nascuntur abscessus: nec potest
aliud quicquam melius accidere, præ-
sertim si mutato sputo sic appareat.
Siue enim tumor, siue dolor sentitur,
sputo cruento in pus iā conuerso ex-
cretōque, tutissimum id indicium est.
Nam & æger à periculo liberatur, &
abscessus doloris expers, celerrime cō

quiescit. At si neq; sputum probe ex-
cernitur, nihilq; residet in vrina quod
bonam spem fulcire videatur, ne ex
eo arriculo claudicet æger, vel pluri-
ma certe sustineat negocia, pericu-
lum est.

68.

Si vero subsederunt abscessus, sed
rursus repetunt, non prodeunte
spuito, ac perseverante febre, grauis
timor est, ne delirium subeat æger,
aut moriatur.

69.

Sanè ex suppuratiõibus, quas pul-
monum morbi concitarunt, serè
senes moriuntur: ex cæteris, iuniores.

70.

Lumborum, inferiorumque par-
tium dolores, quibus febris quo-
que accedit, si ad septum trāsuerfum
transeunt, relictis inferioribus: admo-
dum perniciosi sunt. animaduerten-
da tamen reliqua quoq; indicia sunt.
si enim periculosum aliquod signum
accesserit, hominem à spe deponit.
Quum vruntur suppurati, si pus flu-
xerit purum, candidum, & sine fœto-
re, seruatur. si vero subcruentū, cæno-

PRÆSAG.

sumque, percunt. Si ad septum transuersum, malum ascenderit, nullo reliquorum signorum periculum ostendente, futuræ suppurationis indubitata spes est.

EX VESICA NOTÆ.

71.

Vesica dura, dolens, graue periculum, letalēque comminatur. idque si continua quoque febris accesserit. nā vesicæ dolores, validā necādi vim obtinēt. quo tēpore aluus etiā nihil reddit, nisi dura quædā, ac ne ea quidē, nisi cogatur.

72.

At vero vrina purulenta procedēs in qua residet albū & leue, metū detrahit.

73.

Quod si ab huiusmodi vrina dolor leuatus nō ē, neq; vesica mollior effecta est, neq; febris conqueuit, laborātē p primos morbi circuitus moriturū, denūciādū est.

74.

Id vero pueris à septimo anno, ad decimumquintum præcipue accidere solet.

CHIPPOCRATIS COI PRÆSAGIORVM LI.

ber tertius, interpte Gulielmo Copo.
DE FEBRIBVS



I.
Ebres, siue sanus ab
ipsis qui euadat, siue
pereat, æquali die-
rū numero finiūtur.

2. 3.

V Tenim saluberrimæ febres, quæ
videlicet tutissimis fulciuntur no-
tis, die quarto vel antea quiescere so-
lent, ita pessimæ quæque, & quibus
periculolissima adsunt signa, die quar-
to, vel citius interficiunt.

4. 5.

Primus itaq; earū insultus ita fini-
tur, alter in septimū diē pducitur
tertius ī vndecimū, quartus ī decimū
quartū, quintus ī decimūseptimū, sextus
in vigesimū. Igitur accessiōes ipsæ ex
acutissimis morbis p quatuor ī viginti
auctæ finiūtur. verū huiuscemodi sap-
putatio per dies integros nimirū fieri
nō potest, quippe quū nec anus, nec
mēses ipsi, ītegrīs numerētur diebus.

PRÆSAG.

6.

DEinde eadem ratione, atque ad-
ditione, primus circuitus ad qua-
tuor & triginta, alter ad quadragin-
ta, tertius ad sexaginta dies pueniet.

7. 8.

Sed huiusmodi morbos, qui lon-
giori spacio finiri debent, ab ini-
tio perquam difficile est discernere,
quod simillima sint eorū principia.
ad aduertere tamen à prima die opor-
tet, atque singulos dierum quaternio-
nes obseruare: sic enim haud obscure
scies, quod se conuersurus sit morbus.
Ac quartanæ quoque conditio hunc
seruat ordinem

9. 10.

MOrbi autem tempore breuissi-
mo finem attingentes, facilius
dignoscuntur, utpote qui maximis
protinus ab initio distinguuntur dif-
ferentiis. siquidem ad sanitatē tendē-
tes, facile spirāt, nō dolēt, dormiunt
noctu, ac reliqua quoq; signa, maxi-
mā eis securitatē pollicentur. Perituri
vero difficulter spirāt, delirāt, vigilāt,
cæteraque id genus pessima signa eis
accedunt.

11. 12.

Ut igitur

VTigitur (his sic se habētibus) morbos ad iudiciū tendentes cōiectura cōsequi oportet, & ex tēpore, & ex singulis additionibus, ita eadē quoque ratione in mulieribus, morborū iudicia, à partu numeranda sunt.

13.

Capitis in febre vehemētes, perpetuique dolores accedente letaliū notarum aliqua, valde sunt perniciosi. si vero nullo tali signo apparēte, diem vigesimū dolor excesserit, neque febris cōquiescat, ex naribus sanguinis fluxum, aut in partibus inferioribus abscessum expectabimus. Similiter dolori etiā recenti, sanguinis p̄fusio ex naribus, aut suppuratio superuenire solet, præcipue si dolor, & tēpora, & frontē infestauerit.

14.

Maxime vero sanguinis fluxio expectanda est in iuuenibus, qui quinquagesimum & trigessimū annū nōdum superauerunt. nā maioribus natu, suppuratio serē oritur.

15. 16.

Auris dolor acutus cū febre nō intermittēte, vehemētiq; graue periculū minatur. nā & mentē turbat, &

g

PRÆSAG.

hominem rapit. Quum igitur anceps sit huius rei exitus, à primo protinus die omnibus signis accurate animum adhibere oportet. Nam ex eo casu iuniores quidem intra septimū diem, seniores vero multo tardius moriuntur. quippe qui non æque magnas febres experiuntur, neq; adeò insaniūt. proinde sustinere possunt donec suppuretur affectus. Quodd si morbus in hac ætate reuertatur, magna ex parte interficere solet. Sed iuniores, antea quā auris suppuretur, pereunt; nisi pus candidū ab ea defluens, securitatem polliceatur. præsertim vbi salutarium quoq; signorū aliquod apparet.

17.

NEque leuiter terreri debemus vbi febricitanti fauces exulcerantur: cui si aliud quoq; ex magnis quæ supra declarauimus accesserit, in periculo hominem versari, denunciandū est.

DE ANGINA.

18.

ANgina, periculosissima est, celeriterq; enecat, si neq; in faucibus, neq; in cervice quæ

apparet, si dolor vehemens est, si vix spiritus trahitur; etenim eodē die iugulat, licet interdū vsq; ad secūdum, aut tertium, aut etiam quartum protrahatur.

19.

Quæ vero in reliquis quidē non minore dolore afficit, in faucibus vero tumore ruboreq; excitat, superiori non minus periculosa est, sed longius spacium habebit, præcipue si vehemens fuerit rubor.

20.

Sed tum præcipue malū prolongatur, quū non solum fauces, sed ceruicem quoq; rubor occupat. maxime vero potest ab ea secūda valetudo cōtingere, si rubor simul & ceruicem & pectus cōprehendat, neq; ad interna reuertatur erysipelas.

21.

Quam vero deletur erysipelas, sed non in decretoriis diebus, neque in exteriores partes cōuertitur tumor, neq; pus sreat æger, sed levis & à dolore immunis videtur, id aut mortem significat, aut dolore reuersum.

22.

g ii

PRÆSAG.

Tvtius est & tumorē & ruborē in
externas maximē ptes conuerti.
si vero ad pulmonē conuersio fiat, de-
mentiā excitabit, quāquā nonnulli sic
affecti, magna ex parte suppurātur.

23.

CVirguliosi cum rubore tumescit,
sine periculo præcidi non potest,
etenim inflāmatio, sanguinisq; profu-
sio ei accedit. Proinde satius est aliis
quibusdā auxiliis vti, quibus extenua-
ri possit. Quū vero pallidior efficitur,
vua nominari solet: quod si tum ima-
eius pars crassa & rotūda, summa ve-
ro tenuis videatur, intrepide præcidi
debet. Satius tamen fuerit, antea quā
manus adhibeatur, aluum vacuare, si
tempus id ita pmittat, vt interim suf-
focatio hominē non præoccupet.

24.

QVibus febres, neq; salutaribus
notis apparentibus, neque in
diebus decretoriis cōquiescūt,
ii reuersionem timere debent.

25. 26.

IN longa febre, ex qua tamē xger li-
berari pōt, si neq; ob inflāmatōnē,

neq; ob aliam vllam manifestā cām,
dolor infestat, aut tumidū, aut dolo-
rosum in articulis abscessum expecta-
re oportet, præcipue in imis partibus:
maxime vero in his ætatibus quæ tri-
ginta annos non exceſſerūt, eiꝰmo-
di abscessus nasci cōsueuerunt, idq; in
tempore breuiori.

27. 28.

Non tamē expectandus est absces-
sus, donec vigesimā diem febris
præterierit. is natu maioribus raro ac-
cidit, quibus longo spacio duret febris.

29.

Solet etiam continuis febribus ab-
scessus supuenire. Interpellata vero
febris, eadēq; errabunda, in quartanā
mutabitur, præcipue si autūnus proxi-
mus est.

30.

Atq; vt abscessus oriūtur in his qui
a triginta annis minores sunt, ita
quartana eos qui trigessimū annū aut
agunt aut exceſſerunt, præcipue corri-
pit.

31.

Igitur scire licet, abscessus hyeme
magis accidere, serius finire, sed nō
facile reuerti.

32.

8 iii

PRÆSAG.

SI cuiuspiam in nō letali febre, caput dolet, aut ante oculos obscura q̄dam obseruātur, aut cordis dolor accidit, is bilem euomet. Si vero horruerit & inferiores præcordiorum partes frigore afficiantur, citius ad vomitionem properabit quòd si eo tempore quidpiam aut biberit, aut ederit, id quoque quācelerrime euomet.

33. 34.

Quibus itaque à primo p̄tinus die dolor supuenerit, iis quarto & quinto die ingrauescit, mox in septimo liberantur. Sunt nō pauci qui in tertio die dolere incipiunt, quinto maxime molestantur, deinde nono vel vndecimo tuti euadūt. Sed quos dolor quinto die vexare cœperit, reliqua ex proportionē respondeant, iis decimoquarto die finitur morbus. Hæc tum viris, tum mulieribus, sed in tertianis maxime contingere solent. Junioribus vero cum in is ipsis, tum præcipue in continuis febribus, atque tertianis synceris.

35.

ITaq; quibus in huiusmodi febre caput dolet, oculi vero obscuras illas imagines non vident, sed caligatione hebetantur, aut splendentia quādam cernere se putant, ac præcordis dolore, in alterutra parte præcordia tenduntur, ac neq; dolor infestat, neq; inflammatio, iis pro vomitu sanguis è naribus profluet, idque præcipue iunioribus accidit. si vero trigessimum annum vel agunt, vel superauerunt, vomitum potius quā sanguinis fluxum expectabimus.

36.

Si pueris in acuta febre alius nihil deiicit, neque somnus accedit, sed terrentur, flent, color mutatur, ut modo pallidus, modo liuidus, aut ruber efficiatur, neruorum distentio timeri debet, utpote quæ pueros qui septimum annum nondum excefferunt, quā promptissime inuadit. Grandiſculos vero pueros, atque adultos, non adeo in febribus neruorum distentioprehendit, nisi vehementis admodum malitiæ signum aliquod affuerit, qualia videlicet in phreneticis videntur.

g iiii

PRÆSAG.

37.

ERgo ex omnibus signis, vt de singulis morbis singula præscripta sunt, & morituros, & eos qui ad bonam valetudinē redire poterunt, siue pueri sint, siue natu maiores, sic conii cere oportet.

38.

ATq; hæc de acutis morbis, atq; de his qui, ab eis nascuntur, dixisse velim.

39. 40.

CÆterum si recte discernere volueris, & morituros, & eos qui à periculo tuti sunt, & quis morbus longo, & quis breuiori spacio finietur, discerne omnium signorū inter se collatorum vires (vt supra demonstrauimus) accurate iudicare, tum aliorū, tum præcipue vrinæ, ac sputi, quum scilicet simul & pus & bilis æger sreat. itē supuenientium quoq; morborū impetū, ac temporū anni conditionē accurate obseruare oportet.

41. 42.

Postremo quod ad coniecturas, reliquaq; signa pertinet, haudquaquam vel ignorandum, vel negligendum est, quòd quouis anno, & quouis anni tempore, mala signa timorem, vtilia ve-

ro bonam spem denuncient. Etenim
in Lybia, & Delo, atq; Scythia, pro-
posita iam signa, vera esse comproba-
uimus. 43.

VNde scire licet, in iisdē terris mul-
to plura quā supra proposuimus,
illum facile assequi posse, qui ea recte
& iudicare & perpendere didicerit.

44.

Sed nullius morbi hic nō descripti
nomen desyderandum est. nā om-
nes qui in dictis temporum spaciis
morbi finiuntur, iisdem quoq; indi-
ciis discernuntur.

HIPPOCRATIS COI PRÆ
SAGIORVM TRIVM
LIBRORVM
FINIS.

HIPP.
CHIPPOCRATES
DE NATURA HOMI-
nis, ab Andrea Brentio
Patauino con-
uersus.



Vi consuevit audi-
re eos qui de huma-
na natura altius q̄
ad medendi facul-
tatem pertinet, di-
sputant, huius certe
oratio, vt ab aliis
audiatur, apta non est. Neque enim
prorsus dixerim hominem aerem
esse aut ignem, aut aquam, aut ter-
ram, aut aliquid aliud: quod minime
vnum in homine inesse manifesto
apparet. Sed id quibus placet, dicere
permitto. Atqui mihi quidem nō vi-
dentur huiuscemodi hoīes recte sen-
tire. Nam cum idem sentiant, idem-
que concludant, loquuntur tamen
diuersa. Aiunt enim vnum quid esse
quod est, ac id esse vnum & omne:
verbis autem discrepant. Quoniam

id vnum & omne eorum alius asse-
rit esse spiritum, alius colorem, ali-
us liquidum, alius aridum. Tum sua
quisque ratione concludunt argu-
menta, ac testimonia & indicia af-
ferunt, quæ nullius sunt penitus mo-
menti. Quod vero eodem sunt sen-
su, verbis autem dissentiunt: ea re
patet eos ignorare quæ profitentur.
Quod quidem his præcipue perspi-
cere licuit, qui illorum contentioni-
bus interfuerint. Nam cum iidem
illi boni viri eodem in conspectu at-
que confessu auditorum inter se con-
tendant, nunquam tamen in eodem
sermone vnus idemque vir tres de-
inceps alios conuicit. sed modo hic
superior est, modo ille, cuicumque
præsertim fuerit lingua magis flu-
xa, magisque in turbam idonea.
Qui autem recte sentire putans ali-
quid de rebus pollicetur, is meritò
rationes suas probabiles atque inui-
ctas semper affert. siquidem vera in-
telligit & recte demonstrat. At ve-
ro isti quidem videntur impruden-
tia sua non tam in verbis, dum dispu-

HIPP.

tant, errare, quàm etiam Melissi sententiam sequi atque probare. sed de his hæcenus. Etiã ex medicis quidã ho iem sanguine tantũ, quidã bile quidã pituita constare dicunt: ipsique omnes eandem subiiciunt conclusionem. Aiunt enim vnum quid esse, cui nomen ad illorum cuiusque libidinem imponitur. porrò id vnum formam & vim mutare à calore, vel frigore coactum: mox dulce aut amarum, aut album, aut nigrũ, aut aliud quid diuersum fieri. Verum hæc non sic habere mihi videntur. Nam si homo vna re constaret, nullo vnquam morbi genere afficeretur. neque enim esset vnde doleret, cum vnum tantũ modo foret. Quodd si affligeretur, vna vtique curatio necessario foret. Contrà, nunc plures existũt: quia plura in corpore sunt, quæ cum plus iusto inter se calfiunt, aut refrigerantur, aut siccescũt, aut humefiunt, morbos pariunt. ex quo multa habentur ægrotationum genera & multæ quoque illarum curationes. Cæterum, mea quidem opinione, qui hominẽ

sanguinem & nullam aliam rem esse
censet, is deberet demonstrare eum
non mutare formam aut variari, aut
saltem aliquod anni tempus: aut ho-
minis ætatem ostendere, qua sanguis
solus appareret esse in homine. veri-
simile nanque fore aliquod tempus,
quo id vnum in seipso esset. Hæc a
me dicta etiã in eos conueniunt, qui
bili sue pituitæ tantum tribuunt. Ex
quibus vero hominem ego constare
dixerim, ea & secundum legem, &
secundum naturam, cum & vniuscuiusque
ætati tam iuuenili, quàm se-
nili, tum tempori tam calido quàm
frigido conuenire demonstrabo: at-
que signa etiam & argumenta affe-
ram, eaque aperiam, quibus necessa-
rio quodque augetur aboleturue in
corpore. Primum generatio ab vno
fieri nequit. Quoniam enim pacto
vnum quid generare posset, nisi quid
aliud admisceretur? Tum nec quæ
miscentur, generarent: nisi essent eius-
dem generis, eandemque haberent
facultatem. Rursus nec generatio qui-
dem nobis perfecta foret, nisi cali-

HIPP.

dum & frigidum, siccum & humidū
 inuicem temperate & pati modo se
 haberent: aliter inanis esset si alteru-
 trum altero valentius infirmius ve fo-
 ret. Proinde qui verisimile est vt ali-
 quid ab vno generetur, cum id ne
 pluribus quidem fieri possit, nisi mu-
 tuo temperamento mixtis: Cum igi-
 tur natura eiusmodi sit cum omniū
 reliquarum rerum, tum etiam homi-
 nis: necesse est hominem non vna re
 constare, sed vnumquodque eorum,
 quæ generationi suppeditauerint, ta-
 lem quampiam vim in corpore pos-
 sidere, qualem contribuerit. Rursus
 homine animam agente singula in
 propriam naturam discedunt, vdu-
 m inquam in vdu-
 m, siccum in siccum,
 feruidum in feruidum, algidum in al-
 gidum. Nempe talis est tum animun-
 tum, tum cæterarum omnium re-
 rum natura. omniaque sic orta, occi-
 dunt similiter. Ex his enim quæ præ-
 diximus omnibus, cuiusque natura
 consistit, desinitque pari ratione: cum
 id in seipsum vnde concreuerit, se re-
 ceperit. Corpus autem humanum ha-

bet in se sanguinem & pituitam, & bilem duplicem, tum flauam tum atram, ex quibus & consistit & egrotat, & valet. Valet quidem præcipue cum ea inter se vim & copiam mediocriter temperatas maximeque permixtas habuerint. Contrà, laborat cum eorum aliquid est plus minusve iusto, siue cum in corpore secretum est, neque cum aliis confusum. Quod quidem non modo locum, ex quo abscesserit, afficit: verum etiam ad quem abscesserit, exercet, propter nimiam & exuperantem copiam. Vtique si quid citra superfluitatem foras eruperit, negocium præbet propter exinanitionem similiter intus si vacue sit migrat ve, aut ab aliis excernitur, duplicem molestiam præbeat, necesse est, quemadmodum dictum fuit, videlicet vnde abscesserit, ac ubi exuperat. Quod vero dixi me quibuscunque hominem constare statuerim, ea semper esse demonstraturum secundum institutum & naturam, idcirco aio sanguinem esse & pituitam, & bilem tum flauam, tum

atram. Atq; horum nomina primū
quidem instituto distincta esse dico,
quòd nulli eorum idem nomen in-
ditum sit: deinde secundum naturam
formas discrepare, minimēque pi-
tuitam similem esse sanguini, aut san-
guinem bili, aut bilem pituitæ. Quo-
nam enim pacto inter se similia esse
possunt, cum neque ad visum, neque
ad tactum similia esse cognoscantur?
Neque enim pariter calida, siue frigi-
da, siue sicca, siue humida sunt. Ergo
quando tantum inter se & forma &
vi differunt necesse est ea non esse
vnum: siquidem neque ignis & aqua
idem sunt. Quòd ea omnia vnum
non sint, sed ex ipsis quodque pro-
priam vim atque naturam trahant,
vel hac vna re tibi maxime consta-
re posset. quia pharmaco quod pitui-
tam siue bilē aut flauam, aut atrā cit,
dato, pituita siue bilis flaua aut atra
tibi euomitur. Itē aliqua corporis ps-
vulnere affecta, tibi sanguinē emittet.
Atq; oīa vsu hæc tibi veniēt tā inter-
diu q̄ noctu, tā hyeme quā æstate, nul-
lo tēporis spacio itermisso. donec ho-
mo spiritū

mo spiritum accipere reddereq; potest. poterit autem, donec aliquo isto rû priuetur cognatorû. Quæ quis negaret esse cõgenita: cû luce clarius appareat hominem dum inter viuos agit, cum ea omnia in se semper habere quæ nunc dico atq; demõstro, tum etiam natum altumq; ab homine eadem illa omnia habente. Qui autem vnum quid esse hominem putant, hi mihi propterea in hanc opinionem venire videtur, qd ex iis q epoto pharmaco inter purgationes animam efflarût: quosdam bilem, quosdã pituitam euomentes conspicati, putarunt hominem quoduis illud esse, quod p purgamenta morientem eiicere conspexissent. Eadem nituntur ratione qui hominem dicunt esse sanguinẽ, quoniam cruorem, qui sibi sub conspectum ex iugulatis hominibus manans subiicitur, animum in homine esse putarunt. hæc sunt quibus omnes isti vtuntur in suis sermonibus, argumenta. Verum qui bilem solum per purgationem eiecerit, adhuc mortuus est nemo, sed sumpto pharmaco

h

HIPP.

quod bili mouendæ est, primum bilem, mox pituitam, porro alteram bilem atram & quidem per vim, tū demum moribundus sanguinē euomit purum: quod idem contingit his qui sumunt potiones pituitam mouentes, Primum enim pituitam, deinde bilem flauam, ex hac atram, postremo sanguinem purum euomunt, atque è vestigio finiunt vitam. Nam pharmacum cum corpus intrarit, primo id quod omnium maxime sibi secundum naturam cognatum atque simile est, agit: exinde reliqua trahit & purgat. quemadmodum stirpes & semina terram ingressæ, sibi quod ex ipsarum natura est trahunt vel acre, vel amarum, vel dulce, vel salsum, vel aliud quid diuersum, in primisque ex eo plurimum, quod sibi naturali propinquitate maxime coniunctum est, arripiendo, tum cætera deinceps attrahendo. Talem quoque modū pharmaca seruant quæ bilem mouent, primum meracissimam purgant, deinde mistam. Item pituitæ pharmaca primū meraciore pituitā ciunt, post

confusam. iugulatis sanguis fluit primo quidē feruentissimus atq; perquā rubidus, mox magis pituitosus magisq; biliosus. Hyeme crescit in homine pituita. quod ipsa præcipue ex oībus quæ in corpore sunt, natura sua, eo tēpore frigidissima, est argumēto. quia si pituitā, bilē, sanguinē tangere libuerit, pituitā profecto facile oīum algidissimā reperiēs: tamē & si lētissima sit ac non nisi summa cū violentia secūdū atrā bilē citetur. Quæ enim per vim veniunt, ea propter violentiā feruētiora reddūtur. Sed tamē præ his oībus pituita suapte natura multo frigidissima apparet. Quod autē hyems corpus pituita impleat, tibi patebit, cū ex sputo & mucco ac pituita nasi, quæ hyeme supra modum fluentia emunguntur, tum vero ex cæteris morbis pituitosis, præsertimque tumoribus qui præcipue eo tempore maxime albicant. Vere autem pituita in corpore valentissima inest: sed sanguis crescit, suscipitque indies maius incrementum. tunc enim frigora remittuntur & im-

bres relaxantur, ex quibus & dierum quoque tempore sanguis augetur: cuius naturæ id anni tempus, quoniā humidum est & calidum, maxime cō simile existit, indicio q̄ homines vero æstiuoq; tempore potissimum torminibus corripuntur, ac supra modum calescunt & rubent atq; sanguis ē naribus fluit. æstate vero adhuc sanguis cum viget, sed bilis effertur accrescitque & in autumnum pertinet. In autumno sanguinis parum est, quia illius naturæ id temporis contrarium habetur. Bilis & æstiuo & autumnali tempore imperium corporis obtinet, argumento, q̄ homines & sponte sua & per purgationum potiones bilem biliosissimaq; res euomūt vel excernunt. quod item ex febribus & hominū coloribus patet. Pituita æstiuo tempore longe infirmissima est, quod ei tempus ob calores siccitatesque vehementer aduersatur. Autumno, sanguinis quota pars est in homine: quoniam id tempus siccum est, & hominem iam refrigerare incipit. Sed atra tūc bilis, quā plurima est & po

tentissima, quæ instante vero hyeme
 decrefcit imminuiturque refrigerata.
 Rurſus pituita viciffim augetur, tum
 ab imbris numeroſioribus, tum à
 noctibus longioribus. Profecto hæc
 omnia ſemper habet corpus huma-
 num. quæ certe nō negauerim pro tē-
 poris circūſiſtentis qualitate, ac pro-
 pria cuiuſq; natura, ſeparatim modo
 maiora, modo minora fieri. Vt an-
 nus omnis omnium iſtarū rerum ca-
 liditatis ſcilicet & frigiditatis & ſicci-
 tatis & humiditatis particeps eſt. ne-
 que enim quæpiam illarum vel quo-
 ta temporis parte conſiſteret, ſine re-
 liquarum omnium quæ in hoc mun-
 do ſunt, conſortio. imò ſi qua defice-
 ret, omnes ſimul abolerentur: quippe
 quæ ab eadem ſunt conſtitutę neceſſi-
 tate, inuicemq; aluntur & ſubſtentan-
 tur. Simili modo homo, ſi quid eorū
 ipſi deficeret quæ congenita ſunt, nō
 amplius vitā degere poſſet. In anno,
 modo hyems maxime, modo ver,
 modo æſtas, modo autumnus viget.
 haud aliter in homine interdum pi-
 tuita dominatur, interdum ſanguis,

h iii

interdum bilis, tum flaua, tum atra,
euidentiore quoque argumēto: quia
si quater in anno eidem homini vnā
eiusdem generis potionem dederis,
hyeme tibi euomentur pituitosissi-
ma, vere humidissima, æstate biliosis-
sima, autumno nigerrima. Cum igitur
hec ita se habeant, oportet ægro-
tationes quæ hyeme incrementum su-
scipiunt, æstate desinere: & e contra,
quæ æstate creuerint, hyeme termina-
ri, nisi intra dierum circuitum, de quo
postea loquemur, absoluantur. Verno-
rum morborum liberatio in autum-
num expectanda est. Autumnales au-
tem, veris tempore liberentur neces-
se est. Hæc vero quisquis stata tempo-
ra supauerit, hunc fore annum scire
oportet. Sic medicum morbis mede-
ri oportet, habita bene cuiusq; quod
in corpore pro tempore & eius natu-
ra viget, ratione. In primisque præte-
rea non ignorare debet morbos qui
ex impletione proficiunt, ex ina-
nitione curari: & ediuerso, qui euacue-
factione proueniunt, sanari saturitate.
Qui à labore, hos quiete: qui ex ocio,

eos exercitatione euinci. In summa,
oportet medicū scire obsistere instāti
bus & morbis & formis & tempori-
bus & ætatibus, & cōtenta laxare, &
laxata contendere. tali nanq; modo
morbi vitium facillime desistere po-
terit. Et hoc mihi sanatio esse videtur.

Observationes morborum.

MOrbi alii á victus genere,
alii á spiritu quē trahētes vi-
uimus, proueniunt. Sed de
vtriusq; hoc modo discepta-
ri atque diiudicari oportet. Cum vna
ægritudine complures eodē hoīes tē-
pore corripīūtur, causam ad id reiice-
re debemus, quod maxime cōe est,
quoq; oēs vtimur. id autē spiritus est
quē accipimus reddimusq;. tunc enim
victum nostrum nequaquā in causa
esse manifesto cōstat, cū morbus om-
nes pariter attingit, tā iuniores q̃ se-
niores, tam fœminas quā mares,
tam temulentos quā abstemios, tā
qui ordeaceum quā qui triticeum
in cibatu sumunt panem, tam qui pa-
rum quā qui multum laborant.

Ergo non victus rationi in causa po-

h iiii

nendum est: cum homines quoque
 scendi modo vtentes in eandem inci-
 dunt ægrotationem. Cum vero eodē
 tempore diuersi morbi gignuntur, si-
 ne dubio victus cuiusq; culpa ē. Opor-
 tet itaq; remedia adhibere cum mor-
 bi occasione, quemadmodum a no-
 bis alibi dictum est, repugnando, tū
 etiam victus genera mutando. quan-
 do quidem cibos quibus homo vti so-
 litus est, nequaquā aptos esse liquet, vel
 vniuersos vel plerosq;, vel vnum eorū
 quēpiam. quod cum didiceris inspe-
 cta tamē & considerata, vt à me iam
 dudum dictum est, hominis natura,
 ætate, forma, & anni tēpore, & mor-
 bi genere; debes victum mutare & re-
 media facere, modo demēdo, modo
 addendo: cum hoc vt omnem cura-
 tionem tuā siue victum ad cuiusq; eta-
 tis habitum tempora, formas, mor-
 bosq; dirigas. Atqui si morbus vnus
 omnes promiscue & vulgo infestat,
 clarum est non victum, sed quem tra-
 himus spiritum, in causa esse. quippe
 qui morbidam plane quandā excre-
 tionem habeat, Perpetuum igitur est

homines per id temporis hæc admo-
neri, scilicet ne victum mutant q mor-
bi causa nō existat: prospiciant vt cor-
pus sit quàm solidissimum atque atte-
nuatissimum cibis potibusq; quibus
vti consueuerint, sensim demendo. qd
si festinantiùs victus mutaretur, à mu-
tatione periculum foret aliqd in cor-
pore innouandi. Quare solito victu
vtendum est, cum noxæ causa sit nul-
la hominis. Insuper vt q; paucissimus
spiritus corpus igrediatur, isq; vt ma-
xime peregrinus sit prouidendū, tum
loca in quibus morbus grassatur, quo
ad fieri potest, mutando, tum corpora
attenuando. sic enim minime mul-
to ac denso homines egeant spiritu.
Morbi qui à corporis membrorum
validissimo profiscuntur, grauissimī
sunt: atq; si ibi vbi cœpti sunt, manse-
rint, necesse est validissimo membro-
rū laborāte totum corpus laborare.
Sin autem ab ibecillioribus se in va-
lidissima insinuauerint, facilius absol-
uuntur. quia vi facile vindicantur quę
influunt.

De venarum natura.

H I P P

VEnæ corporis crassiores ad hunc modum oriuntur, quatuor paria sunt. Primum quod ab occipite ortum, tendit per cervicem summa perreptans latera spinæ, ad clunes & crura: deinde per tibias & malleolos exteriores ad pedes. quam ob rem doloribus dorfi & coxarum, de poplitibus malleis ve exteris sanguinē mitti solitum est. Secundum venarum par, de capite circum aures per cervicem, iugulariæ dicitur sunt, intus propter spinam & lumbos ad testes & fœmora perfertur, atque per poplites & tibias propter interiores malleolos ad pedes. Quapropter doloribus lumborum & testium sanguinem poplitibus aut malleolis mittimus interioribus. Tertiū par venarū, à tēporibus per cervicem sub scapulis porrigitur ad pulmones & altera de parte dextra in sinistram pergēs māmam subit, & ad lienē renemque descendit: altera de sinistra in dextrā procedens à pulmonibus māmam subit, mox iecur petit & renē: vtraque postremo ad podicem desit.

nit. Quartum par, ortum à sincipite, de sede oculorum per ceruices ad humerorū clauiculas deuenit, vnde per lacertos ad agilem, mox per cubitos ad volam & digitos. vnde intus remeans ad alas propaginem mittit, quæ summās costas perreptat, dum altera ad lienem, altera ad iecur perueniat. deinde vtraque emīnens per ventrem ad genitale desinit. ita venæ crassiores habent. Procedunt quoque à ventriculo per corpus aliæ per multas & variæ venulæ ramulorum modo, per quas alimentum corpori transmittitur, quod à crassis venis & interioribus & extimis ferunt ventriculo, & reliquo corpori sibi que inuicem subministrant, internæ: scilicet externis, & externæ internis. Quam ob rem has mittendi sanguinis rationes seruare aptissimū est. operæque preciū est, vt cultellus q̄ longissime à loco vbi dolor esse & sanguis cogi dicit, adigatur. quia tali modo haud magna repent e mutatio fieret & cōsuetudo remoueretur eodē amplius cocūdi, oībus q̄ aut febre ītegrī mul-

tum puris excreant, aut dolore vacui
 sedimentum vrinae admodum puru-
 lentum, aut stercora cruenta, sicut in
 torminibus, & diuturna habent: qua-
 lia esse solent iuuenibus quinq; & tri-
 ginta annos natis, & hominibus etiā
 grandiore æuo: his omnibus eadem
 illa res morbi causa existit. Qua pro-
 pter eos exercitationibus atque cor-
 poris laboribus deditos esse oportet,
 ac ne operariorum quidem labores
 in adolescentia subterfugere, deinde
 laboribus remissis corpus implendū
 est molli carne & à priore multū dis-
 ferēte, ita vt adeptū & aduenticiū
 corpus à superiore & vernaculo disci-
 minis habeat multum. Si quis igitur
 ita affecti quādoq; in ægrotationem
 inciderint, quā primum euadunt. sed
 post à morbo, subinde tēporis curri-
 culo corpus liquatur, & ad saniei effi-
 giem per venas, quæ latissimæ & p-
 uix sunt, diffluit. Quodd si ad inferiōre
 ventriculum cite ruit, tale ferme qua-
 le intus erat emittitur per meatus se-
 cessum. quippe quod utpote via de-
 cliui & lubrica, haud diu in intestino

detineatur. Quibus in pectus destilla-
rit, suppuratione infestatur: quia diu-
tius in pectore sedens cum veluti ac-
clivi expurgatione sursum versus dif-
ficulter eiiciatur: marcescit & suppu-
rat. Si ad vesicam eruperit, à loci ca-
lore calefit, album redditur, secerni-
tur ac rarefit, rarefactūq; desuper flui-
tat, pars crassa subsidet, quæ pus di-
citur. ideoq; pueris calculi concrescunt,
ob eius loci & reliqui corporis calidi-
tatem. quod vsu viris nequaquam ve-
nit, propter corporis frigiditatē. Nō
alienum est scire, hominē prima die
supra quā possit, esse calidissimum,
nouissima autem frigidissimum. ne-
cesse enim est calere corpus quod ado-
lescit, & ad vires incrementūque ten-
dit, ediuerso illud supra modum, fri-
gere, quod coeperit aboleri & tanquā
maturum ac victum atque caducum
in ruina præceps festinare. Atque
hac ratione homo prima die quanto
maximum suscipiat incrementū, eo
magis calefit. sic extrema quanto,
plurimum vitalis roboris detrahitur,
tanto frigidiores esse necesse est. Ex

illis autem qui prædicto modo affecti sunt, plerique sponte sua, si tempestive, scilicet quinto & quadragesimo die liquari cœperint, sanescunt. Sin autem eam dierum metam præterierint, per se annum conualescunt, nisi vero quapiam alia re homo offendatur. Morbos qui sensim oriuntur & quorum causæ cognitu faciles existunt tutissimos appellare licet. Quare presentissima curatio, si quāprimū morbi causæ occurratur. qua sublata, morbus absque negotio discedit. Quibus in vrina ad arenularum similitudinē aliquid subsidit, seu pori, id est tophi lapilli, his tubercula ad crassam venam enata sunt, atque suppuruerunt. deinde cum ea haud ita cito erumpuntur, pori deuoluti ex pure per venam, simul cum vrina in vesicam extruduntur. Si vrinae cruentæ sunt, in venis vitium est. Si vrina quæ crassa est, habuerit ad effigiem capillamenti caruunculas admodum minutas, signo est vitium esse in renibus & articularibus. Si pura & i summa vrina veluti furfures huc illuc quæ inatet, scilicet

vesicę scabię subesse. De febribus.

Magna ex parte febres à bile sunt. genera earum quatuor sunt, absque illis quæ doloribus eueniunt. Nuncupantur autem, continens, quotidiana, tertiana, quartana. Continens, à copiosissima atque meracissima bile prouenit, & per quā breui iudicatur. qm corp⁹ à vehemēti calore feruescē dū nullo tps īteruallo refrigescit, celeriter soluitur & absumitur. Quotidiana, secūdu cōtinētē à largissima bile est, & ex omnibus aliis citissime euincitur. longior est continente, quo pauciore ex bile venit. tum quia corpus propter intermissionem requiescit in continente autem nullo vnquam tempore quietem habet quia nulla sit intercapedo. Tertiana, diuturnior est quam quotidiana, a minore bile accedit. quanto plus in tertiana quā in quotidiana corpus requiescit, tāto diuturnior ē, quā quotidiana. Quartana aliogn pari rōne lōge diuturnior terni anis ē: tū qā minus bilis hñs estū afferētis, tū quia corpus amplius refri-

*que dolo: q
vide 2^o d
crisi ear.
191. col. p*

HIPP.

gescit, quod ab atra bile id superan-
tis materiæ profiscitur ac difficulter
euellitur. Nā cum ea inter omnes cor-
poris humores lentissima, & glutino-
sissima sit: diuturniores sedes cōstituit.
Quòd autem febres quartanæ, atræ
bilis participes sint, hac re tibi pate-
bit quòd homines autumnali potissi-
mum tempore, & in ætate viginti-
quinque annorum vsq; ad quadrage-
simum quintum annum, quæ ex om-
nibus ætatibus, maxime atra bile de-
tinetur, corripuntur quartanis, qui-
bus autumnus inter omnia alia anni
tempora expositissimus est. Quos igi-
tur ultra citra ve id tempus ac eam
ætatem quartana accesserit, pro com-
perto habere debes hanc febrem mi-
nime diuturnam fore, nisi quid aliud
homini officiat.

LIBRI DE NATURA HV-
MANA FINIS.

HIPPOCRATIS

COI, DE RATIONE VI-

ctus in morbis acutis liber pri-

mus, Gulielmo Copo Ba-

siliensi interprete.

Priscorum medicoꝝ tres fuisse fami-
lias meminit Galenus libro de curan-
di via & ratione. Vna eorum fuit me-
dicoꝝ, qui Coũ insulam incolebant:
quoꝝ princeps fuit Hippocrates. Alia
Rhodioꝝ. Tertiæ sectæ authores Cni-
dii vocabantur, á Cnido ĩsula: vna ex
quinque Cycladibus. Horum placita
Hippocrates hoc loco Cnidas sen-
tentias vocat.



Vi Cnidas vocatas sen-
tentias, posteritati lite-
ris prodiderunt, quam-
uis in singulis morbis,
& affectus & accidentia
quædam egroꝝ recte quidem illi scri-
pserint, tamẽ ea dũtaxat attigerũt, q̃
nullo ferẽ negotio scriberet is quoq̃,
qui medicinã nõ didicit, si laborantẽ
accurate sup singulis affectionibus in-
terrogaret. quippe multa, quę non re-

DE RA. VICIN MOR. ACV.

- ferēte agro, medicum pranoscere ne
 cesse est, pręterierunt. atq; in aliis qui
 dem alia, quorum nonnulla non me
 1 diocrem ad coniecturas cōmoditatē
 habere videntur. Igitur de his quę vel
 3 ad coniecturam, vel ad curationis ra
 tionem pertinent, equidem longe ali
 ter atque illi enarrauerunt, sentiendū
 4 puto. quāpropter eos haudquaquam
 laudauero, idque non solum ob hanc
 causam, verū etiam quòd paucis ad
 modum medicamentis vsi sunt. Nam
 prater ea quę de acutis morbis prę
 cipiunt, hęc dumtaxat tradiderūt, ela
 terium, id est medicamentum quod
 purgādi vim obtinet, serum, & lactis
 suo tempore potionem. Quę si satis
 efficacia ad morboꝝ curationē essent
 ipsi summa laude fuissent extollendi,
 utpote qui pauca admodū, sed qbus
 nihil deesset, prescripsissent. Id vero lō
 5 ge ab est à veritate. Proinde postero
 res, suscepto corrigēdi munere, medi
 ca magis via, ea q singulis exhibenda
 sunt, instituere tētauerunt. Etenim de
 6 victus rōne, veteres nihil pene scripse
 rūt. sed hęc ptē haudquaq; cōtemnēdā

pteriusse videtur, quibus nonnulli singulorum
morborum varietates multifidosque ipsorum
modos, non ignorarent. Quin et in hoc pec
cauerunt, quod omnium morborum nume
rum manifeste deprehendere conati sunt.
id vero perdifficile est, si inde coniecturam
feceris, quod morbi inter se differunt, nullus
que sit idem morbus, nisi idem quoque no
me sortiatur. ¶ Mihi vero placuit vni
uersae huic arti sic mentem adhibere, ut
enarrata in ipsa singula officia, per
ficiantur, & quae celeritatem desiderant, ce
lenter, & quae puritatem, pure: & quibus do
lor accedere non debet, ea iucundissime
tractentur, ac reliqua id genus omnia secun
dum hunc modum (quod a proximo illo plane
abhorret) in meliorem formam redigan
tur. Quocirca illum medicum in primis
laudandum putaverim, quod in acutis morbis,
ea quae plures enecare solent, longe diuersa
ab aliis ratione, imo melius commutare possit.
igitur hi sunt acuti morbi, quos veteres
vocauerunt costalem, peripneumoniam, ischa
miam, lethargum, ardorem, & si quae alii illos
sequantur, inter quos omnino febres con
tinuae egrum interficiunt. Quum enim
nullum commune pestilentis morbi genus

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

grassatur, sed dispersi, dissimilesque
suerint morbi, ii magis quam reli-
qui omnes hominem perimere solēt.

Ioldiote vero (quod ad huiusmodi mor-

I1 bos pertinet) sicuti nequeunt quan-
tum quisq; à proximo differat, discer-
nere: ita modo has, modo illas cura-
tionis formas, aut laudant, aut vitu-

I2 perant. Cuius rei haud mediocre indi-
cium est, qd horum morborum curan-
di rationem populares, vtpote rudes,
omnino ignorant. medicos enim ar-
bitrantur esse eos qui medici nō sunt,
maxime vbi dictorum morborum
genus aliquod inciderit. facile enim
est apud agros nomina vsu compro-
bata proferre: quippe si aut ptisanæ
cremorem, aut vinum aliquod, aut
aquam mulsam quis nominauerit,
vulgares hæc eadem apud medicos,
tum præstantiores, tum deteriores si-
ne vllō discrimine in vsum venire exi-
stimant. verum e contrario res sese ha-
bet: nam longo interuallo (quantum
ad iam proposita attinet) inter se dif-
I3 fident. Igitur scribere aggredior, in
primis ea, quæ quamuis scitu vtilia

sint, tamen si medicis ignorantur, de
inde ea quoque quæ magnopere vel
iuuare, vel lādere consueuerunt. Quæ
ignorantur, hæc ferè sunt. Cur alii qui
dem medici non colatam ptisanam
perpetuo exhibentes, minime se erra
re putant. alii vero omnino præcipi
unt, vt ne hordeum quidem vllum la
borans deuoret, magnam inde no
xam timentes, sed per lintheum cola
tum cremorem exhibent. Sunt qui ne
que crassio rem ptisanam, neque suc
cum eius dādum censeant, idque alii
vsque ad septimum diem, alii donec
finiatur morbus. Sane huiuscemodi 14
quæstiones, medici neque propone
re, neque propositas explicare consue
uerunt. Quam ob rem populares gra 15
ui admodum calumniā vniuersam
artem dānnant, perinde ac si nulla
(quātum ad acutos morbos attinet)
videatur esse medicinę professio. Tan 16
ta enim est artificum inter se pugna,
vt quod vnus saluberrimum, id alter
protinus perniciosum esse contendat
Atque hac ratione factum est, vt diuī
nationi ferè ars ipsa comparetur. Si

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

quidē augures, eādē auem, ad sinistrā quidem faustam, ad dextram vero infelicem esse putāt. Similiter vbi victimarum exta inspectantur, talia quædam inueniri solent, a quibus deinde vatum nonnulli omnino dissentiunt.

- 17 Hanc perpensionem, tum honestissimam esse, tum cognatione quadam, plurimis, eisdemq; perquam vtilibus in arte rebus, cōuenire dixerim. vtpote quæ ægris vniuersis, magna quadā vi, sanitatē, sanis securitatē, exercitantibus bonū habitum, & quicqd aliud quoq; volueris, pollicetur.

DE PTISANA.

- 18 **I**gitur ptisana in his morbis, cæteris quæ ex frugibus constāt pulmētariis, mea quidem sententia rectissime antefertur. neque mediocri laude efficiendi sunt ii, qui eam anteponere decreuerūt. Nam viscositas eius lenis, contiua, iucunda, lubrica & modice laxa est, sitim arcet, & (vbi ablutione opus est) facile descendit, non astringit, non vellicat grauius, neque in ventre tumescit. quippe quum decoqueretur, tumuit quan-

tum maxime tumescere potuit. Cæte-
rū qui in huiusmodi morbis ptisana 19
vtūtur, ne vna quidē die venas (vt ita
dicam) concidere sinant, sed ab eius
vsu nequaquā desistant, nisi aut medi-
camentū aut clyster id impediāt. Pro 20
inde qui bis die cibum ex consuetudi-
ne sumunt, bis quoq; ptisana eis exhi-
benda est. Qui vero semel duntaxat,
iis primo quidē die semel tātū detur,
facta tamen additione. Quōd si fieri
pōt, bis quoq; exhibeatur, vbi videli-
cet res ita expostulare videtur. At in 21
přicipio neq; multā, neq; crassam da-
re, sed aliquid tum cōsuetudinis gra-
tia, tum ēt ne venæ concidāt ingerere
conuenit. Sed de sorbitionis incremē-
to animaduertendum est. Nam si quā 22
aridissimum esse conieceris morbū,
haud ita multum ipsius dare oportet:
sed ante sorbitiouem, aut aquā mul-
sam, aut vinū, vtrū magis profuturū
existimaueris, ppinare. vtriusq; vero
vsum in singulis affectionibus postea
dicemus. At si humidū fuerit os, & q̄ 23
à pulmone excernūtur debitam qua-
litatem seruauerint, augenda est (vt

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- summatim dicam) sorbitionis quantitas quippe quo copiosior, citatiorque humor apparuerit, eo maturiorem: quo vero tardior, minorque, tardiorē
- 24 morbi finem denunciat. Verum hæc ipsa per se magna ex parte talia deprehenduntur. multa vero haud inutilia à quibus cōiecturas capere oportet, hic omisimus, de ipsis postea dicturi. Cæterum quo copiosior fuerit
- 25 purgatio, eo cibum oportet esse austiorem, idque vsque ad morbi iudicationem, cuius impetus magna ex parte duos dies non excedit, vbi vel quinto, vel septimo, vel nono die morbus finiri debet. quocirca & pares, & impares dies accurate ppēdere oportet. His ita cognitis, sorbitionem matutino quidē tempore exhibe, vespere autem ad alios etiam nū cibos trāsire poteris.
- 62 ¶ Huiuscemodi igitur institutio magna ex parte iuuat eos qui protinus ab initio tota vtuntur ptisana.
- ¶ Quum itaque pleuritici aliquid
- 27 notatu dignum scire & expurgare cœperit, dolores ipsorum ilico sua sponte desinunt. Quinetiam purga,

tiones hoc pacto longe perfectiores
sunt, minusque suppuratione afficiū-
tur, q̄ si aliena victus ratione educa-
rentur. insuper iudicationes simplici-
res, facilioresq; fiunt, neq; tam facile
morbi reuertuntur. ¶ Sane ptisanam 28
ex hordeo quam optimo facere, &
eam probe concoquere oportet. idq;
præsertim si non solo cremore vti de-
creueris. sic enim præter reliquas pti- 29
sanæ commoditates, lubricitas eius
prohibebit, ne inter deuorandum, no-
xam inferat; hordeum, neque enim
adherebit, neq; per thoracē transeun-
do morā faciet. Quum enim studio-
se coquitur, perq; lubrica euadit, sitim 30
nequaquā excitat, atq; vt facillime con-
coquitur, ita imbecillissima est. qui-
bus nimirum omnibus indigemus.
¶ At nisi exquisita fuerit huiusmodi
sorbitiois præparatio, adeo vt nihil 31
desit, quo minus expectatum auxiliū
præstet, noxia sæpenumero efficitur.
¶ Erenim quibus cibus recens conclu-
sus est, si eo non vacuato, sorbitio de- 32
tur, dolor iam instans irritabitur aut
si dolor nō est, ptinus inducetur, spūs

DERAT.VIC.INMOR.AC.

- reddetur q̄ frequentissimus, id quod
nō mediocre malum est. nam pulmo
exiccatur, & præcordia, abdomen,
atque septum trāsuerſum dolore cru-
33 ciantur. Quinetiam vbi lateris dolor
continuus est, atq; calidis fomētis nō
leuatur, neq; procedit sputū, sed lentū
& iocōtum est, si tum neq; alui ductio
ne, neq; sanguinis missione (si horum
auxiliorum alterutrum conferre vi-
deatur) dolorē solueris, sed ptisanam
sic affectis exhibueris: nihil obſtabit
quo minus præcipiti morte rapiantur.
34 Et itaq; ob has causas, atque id ge-
nus alias, qui totam ptisanā ingerūt,
vel septimo die, vel citius moriuntur,
ac alii quidē demētes, alii vero à spiri-
tus difficultate ſterrentes ſuffocantur.
35 Proinde vetuſtiſſimi, eos ſyderatos cē-
putabant, cum ob eas quas modo cō-
memorauimus cauſas, tum vero q̄
mortuis, latus liuore affectum ad pla-
36 gæ ſimilitudinē videbatur. Cuius rei
cauſa eſt, q̄ perſeuerante adhuc dolo-
re, mors propter difficilem anhelatio-
nem obortam, ipſos præoccupat. ci-
tantur enim ſpirationes. Ex multa re-

ro frequētiq; spiratione (vt diximus)
sputum incoctum, viscosumq; factū,
non procedit: sed in pulmonis meatibus
retentum, stertorem efficit. Quū
itaque ad hoc difficultatis peruenerit
magna ex parte mortiferum esse cō- 37
suevit. Quippe retentum sputum, pro
hibet aeris ad interna lationem, ip- 38
sumq; celeriter egredi cogit. quo fit,
vt vicissim alterum ab altero male af-
ficiatur. siquidem retentum sputum,
spiritū frequētem reddit: spiritus au-
tē frequens, sputum sic facit viscosum 39
vt elabi non possit. ¶ Solent vero ea,
quæ supra diximus, accidere, non so-
lū ob ptisanam importune sumptā,
verū etiam multo magis, si quid aliud
edatur, vel bibatur qđ sit ptisana de-
terius. Ergo easdem fere commodi-
tates magna ex parte adipiscuntur, 40
& ii qui tota ptisana, & qui succo ip-
sius, quique neutro horum, sed potio-
ne duntaxat vtuntur. Atque accidit in-
terdum vt diuersæ sint singulorum cō-
moditates. Id vero omnino obser- 41
uādū est. Si quempiam qui non ita
dudum cibū accepit, nec alui adhuc

DERAT.VIC.IN MOR.AC.

- onera deiecit, febris, vel vnà cum dolore, vel etiam sine dolore corripuit, sorbitio danda non est, donec conieceris cibum ad imas intestinorū partes descendisse. Infestante itaque dolore, potui dandum est oxymel, hyeme quidem calidum, æstate vero frigidum. Sed vbi sitis vehementer cruciat, & aquam mulsam, & aquā ipsam dare conuenit. deinde si vel dolor, vel periculum, aliquod aliud imminet, danda est sorbitio, sed neque multa, neque crassa, ac ne id quidem prius quam dies septimus præterierit, si vires ægri sufficiant. Illi qui nuper cibum accepit, si vires valent, & viget ætas, clyster immitti debet, si cibus iam pridem sumptus, nondum descendit Imbecillo autem glandem supponere oportet, nisi sponte deiectio sequuta est. Sane tempus exhibendæ sorbitionis, tum ab initio, tum per totum morbi decursum summo pere obseruandum est. etenim pedibus frigore affectis, non solum à sorbitione, verum etiam à potione maxime abstinendum est. sed tum dabi
- 42
- 43
- 44
- 45

mus & sorbitionem & potionem, quum calor ad pedes vsque peruenerit. Nam hoc tempus quam maxime oportunum est, cū in omnibus morbis, tum præcipue in acutis, potissimum vbi & febris, & periculum vehemens subest. ¶ Proinde si acurate, 46
ea quæ supra proposita sunt, animadu-
uerteris, in primis ptisanæ cremorē,
deinde ipsam quoque ptisanam da-
re curabis.

LIBER SECVNDVS.



Ateris dolorem, siue is
protinus à principio, si-
ue postea obortus est,
non ab re fuerit tenta-
re, tepidis fomentis dis-
soluere. ¶ Calorifico au-
tē fomento, quo aqua calida in vtre,
vesica, vel vasculo æreo, aut testaceo
adhibetur, nullū aliud præstantius ē,
sed molle aliquod (quo iucūdius fiat
fomētū) prius lateri apponendū est.
¶ Quinetiā vtiliter adhibetur spongia
magna, mollisque, ex aqua calida ex-
pressa. vestiendū vero fomentū ē, vt
neq; vis eius celeriter deleatur, euane- 4

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- scatque, neque nidor ad ægri spiritū
pertingat, nisi fortassis vsum quen-
dam prestare videatur. nam interdū
nonnihil utilitatis in ipso deprehen-
ditur Ad hæc hordeum & eruum, in
5 aceto ita temperato, vt paulo acidi-
us sit, quàm vt ipsum bibere quis pos-
sit, macerantur, feruentque, deinde
marsupio iniecta adhibentur. Nec se-
cus de fursure quoque sentiendum ē.
6 Arida autem fomenta ex sale, miliō-
que frictō rectissime in laneis marsu-
piis apponuntur. etenim milium &
7 leue est, & iucundum. Sane dolores
ad iugulum vsque extensos, huiusmo-
di fomentum discutit. Sectio autem,
8 nisi iugulum quoque dolor compre-
hendat, haud æqualem in doloris di-
scussione obtinet facultatem. Vbi fo-
9 mentis dolor sedatus non est, nō diu-
tius calorificis vtēdum est, ne vel pul-
monem exiccent, vel suppurationem
excitent. ¶ Quum ergo ad iugulum
10 dolor extēditur, aut grauitas vel bra-
chium, vel mammillam, aut partes
quæ supra transversum septum sunt,
infestat interna cubiti vena secanda

est. Neque dubites copiosum detra-
 here sanguinem, donec vel rubicun-
 dior multo, vel pro puro, rubidoque,
 liuidus effluxerit. vtrūque enim acci-
 dere solet. At si eas ptes q̄ sub trāsuer-
 so septo sunt, dolor afficit, sed ad iu-
 gulū nō ascēdit, tū vel nigro veratro,
 vel peplio alius ducēda ē miscere ve-
 ro oportet veratro vel daucū, vel sese-
 li, vel cuminum, vel anisum, vel aliud
 quidpiā odoris iucūdi. Peplio vero la-
 ser, id est silphii succū, quāquā & hæc
 ipsa simul mixta, haud absimiles vi-
 res obtinent. Cæterum vt hæc ambo 11
 quæ diximus, ita plura quoque alia
 quæ alui ducendæ vim habent, dolo-
 rem mitigant. sed omnium quæ ego
 nouerim hæc longe optima sunt. Nā
 & in his quæ sorbitionibus mixta vē-
 trē soluūt, nō nihil p̄sidii ē, nisi vel ob
 amarorē, v̄l aspitatē, aut mltitudinē,
 aut colorē, aut suspicionem aliquam,
 omnino fuerint ingrata. Quum me- 12
 dicamentum aliquis ebibit, mox
 ptisana sorbitioni danda est, non mi-
 nori pene quantitate q̄ consuevit, ni- 13
 si consuetudo rationi aduersetur. In

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

media vero purgatione sorbendum non est, sed vbi ad purgationis finem deuentum est, sorbitio detur, minor tamen q̄ pro consuetudine. Tandem leuato dolore, nisi aliud quidpiā obstiterit, liberalius exhibeatur. ¶ Idem
14 dixisse velim, quum ptisanæ cremor
15 in vsum venerit. Equidem satius esse puto, vt protinus ab initio sorbitionem dare incipias, quā tertio, quarto, quinto, aut septimo die: quum videlicet venę conciderunt, nisi sub hoc spacio morbus fuerit iudicatus. ¶ At
16 que hos similiter, vt superiores, præ
17 parare oportet. De sorbitionis exhibitione, hec ferē sunt quę dicere decreueram. Ac de potione quoque (qualiscunq; ex his, quas post hac declarabimus, sumatur) eadem ratio est.

DE CONSVETVDI.

nis mutatione.

18 **S**ed nō ignoto omnes fere medicos à debita obseruatione, quā grauissime aberrare, quippe q̄ ab initio duos, aut tres, aut etiā plures dies, fame cruciāt egros deinde
& sorbitiones

& sorbitiones, & potiones exhibent,
quod videlicet operæ præcium ipsis vi
detur, magnæ corporis mutationi
quidpiam quod valde sit magnū obii
cere. Equidem mutationem laudo, si
modica fuerit, recta enim debet esse
mutationis translatio. Maxime vero
in ciborum exhibitione mutationis
consideratio habenda est. Porro gra
uissime læduntur ii, qui tota vtuntur
ptilana, si mutationi peccatum acce
dat. ac læduntur quoque qui succum
duntaxat assument. Deinde noxa af
ficiuntur, qui solam potionem acci
piunt, sed minus quàm superiores.
Cæterum vt rectam victus rationem
instituiamus, salubria præcepta quæ
per bonam valetudinem obseruan
da sunt perpendere oportet. Quum
enim non parum intersit, hæne, an
illa victus ratione sani vtantur: cum
in aliis quibusdam, tum præcipue in
mutationibus: quomodo fieri potest,
quo minus magna sit in morbis va
rietas, idque maxime in acutis. Quod
autem vitiosam victus rationē, quæ
nunquam variat, longe tutius sit ob

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- seruare, quàm subito vel ad meliorē transire, facile intelligitur. Quippe siue bis, siue semel dūtaxat in die, quis cibum accipere solitus est, si subito cōsuetudinem mutauerit, noxam, imbecillitatemque subibit. Etenim prādiū assumens, qui id non consuevit protinus imbecillus, grauis, agrotus segnisque redditur. Quod si præterea cœnauerit, ructus acidus, & alui leuitas subsequitur. grauatur enim subinsueto onere ventriculus. qui antea aridus esse, ac neque bis intumescere, neque toties cibum coquere solebat.
- 22 Proinde iuuandi sunt tales compensata mutatione. siquidē dormire eos oportet, tanquā noctem à cœna ducerent, ac hyeme quidem frigus, estate vero calorem vitare. Si somnus nō accedit, lento, frequentique incessu ambulare, ac neque stare, neque cœnare debēt, nisi forte per exigua quedam eāque minime noxia sumant, minus bibere, idque meracius & nequaquam dilutum.
- 23 24 Maiori tamen molestia afficietur is: qui ter eadem die ad satietatem vsque cibum inies-

ferit, ac multo magis si crebrius etiā
num assumpserit. Quāquā sunt non
nulli quibus nihil molestiæ affert, ter
in die cibo repleri, præsertim si ita
educari consueuerint. Quibus cōsue-
tudo fuerit bis die cibum assumere, ii
nisi pransi fuerint, imbecilli, egrotiq;
ac ignaui redduntur, dolore præcor-
dia torquentur, veluti suspensis visce-
ribus, vrina calida pallidāque reddi-
tur, & alui sedimina aduruntur, os a-
marore afficit, oculi cauantur, tem-
pora mouentur, extremæ partes fri-
gescunt. ¶ Sunt plærique qui omisso
prandio cœnare nequeunt. quòd si tū
cœnauerint, ventris grauitate mole-
stantur, ac per somnum multo ma-
gis vexantur, quàm si pransi fuissent.
Quā igitur eos, qui bona adhuc vale-
tudine degūt huiuscemodi ifestēt ac-
cidentia, si p diei dūtaxat medietatē,
rō victus à cōsuetudinē mutetur, cōstat
vt neq; addi qcquā, neq; minui vtilr
possit. Igitur q pter cōsuetudinē semel
dūtaxat cibū accepit, deīde ex ianitis
toto die venis, q̄tū solebat cœnauerit,
si quū à pradio abstinuit, & doluit, &

15

16

17

k ii

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

ægrotauit, assumpta autem cæna gra-
uis effectus est: par est eum multo ma-
gis grauari. Cui vero ex longiori spa-
cio venę conciderunt, si repente cæna
uerit, multo grauius afficietur. ¶ Re-
ficiuntur autem hi quibus præter cō-
suetudinem venę exinanitæ sunt, si
eodem die à frigore, calore, & fatiga-
tione tuti seruentur, quippe quod oīa
hæc ægre tolerari solent. deinde cœ-
na multo leuior, quàm pro consuetu-
dine, instituenda est: eaque nō aridā
esse sed humiditatis modum seruare
oportet. Vinum haud quaquam dilu-
tum potare, neque minus quàm cibo-
rum ratio desiderat. postero die exi-
guum cibum in prandio sumere, vt
paulatim ad consuetudinem fiat redi-
tus. ¶ Huiuscemodi vero noxas gra-
uissime ferunt ii, quibus superiores
partes amara bili redundāt. Quibus
vero in superioribus pituita contine-
tur, ii in ediam præter consuetudinē
magna ex parte facile tolerant. quo
fit vt minus quoque lædantur, si præ-
ter consuetudinem semel dūtaxat in
die cibo reficiantur. ¶ Præterea effi-

cax argumentum vel ex eo deprehēditur, quòd maxime in nobis mutationes, tum naturæ, tum habitus, potissimum morbos pariunt. Quamobrem neque venas importune exinanire, neque vigentibus, feruentibusque morbis aliquid ingerere, neque etiā per totum morbi decursum, vel ad hoc, vel ad illud quicquam permutare conuenit. ¶ Multa iis consentanea de ventriculo dixeris. vt pote qui cibos vel malos, ac potiones quoque (si ipsis vti cōsueuerit) facile sustinet. Cōtrā grauitèr ferre solet, tum cibos, tū potiones, quamuis suapte natura vitio careant, si præter consuetudinem ingerantur. Quo minus mirandū est, si maiore dolore afficitur illorū ventriculus, qui præter consuetudinē multas carnes, aut alia, aut laserpitium, aut laser, aut eius caulem, aut reliqua id genus vehementes vires obtinentia, edunt. Nec vlla admiratione capieris, si didiceris, mazam præter cōsuetudinem ingestam, tumultum, tumorem, flatum, tormināque excitare, præsertim vbi quis mazam edere

DERAT.VIC.IN MOR.A.C.

non consuevit. Et quòd calidus panis
 sitim, subitamque plenitudinem præ
 bet: quippe qui ariditatem inducit,
 tardeq; descendit. Item quòd panes,
 seu admodum puri, seu cibarii, repu
 gnante consuetudine ingesti, diffe
 rentes inter se affectus committunt.
 Similiter maza siue arida, siue humi
 da, siue viscosa sit. Ad hæc qualiter re
 centes polentæ, præter cōsuetudinem
 illas comedentem, afficiunt. Sic vini
 quoque & aquæ præter cōsuetudi
 nē potatio, subita in diuersum vsum
 facta permutatione. Præterea vinum
 quoque affatim epotum, siue dilutum
 est, siue meracum. hoc enim venas im
 plet & capitis grauitatem, sitimque
 excitat. illud superiores ventriculi par
 tes laxat, inferiores flatibus cruciat.
 Idem ex vino, tum albo, tum nigro
 44 accidet, vbi subita fuerit à consuetu
 dine mutatio. quāuis enim vinosum
 fuerit vtrunq; , magno tamen discri
 mine, corporis respectu, alterum ab
 altero dieffrit, vt nihil mirum sit, si dul
 45 ce, idemq; vinosum vinum, vbi subi
 ta fuerit mutatio non idem efficere

videatur. ¶ Cæterum hanc senten- 36
tiam, contraria quoque ratione ful-
cire oportet. siquidem in iis ratio vi- 37
ctus permutata est, corpore non per-
mutato, vt neque ob auctum robur
cibos addere, neque ob infirmita-
tem eos minuere oporteret. In singu-
lis itaq; perpende & vim & speciem 38
morbi, atque hominis naturam, ac
ægotantis in victus ratione consue-
tudinem, non solum in cibis, verum
etiam potionibus. ¶ Sed perquã mo- 39
dice, additioni studendum est, abla-
tioni vero in totum intendere, sæpe
numero prodest, modo sufficere pos- 40
sit infirmus, donec per vigorem mor-
bus maturus fuerit. Id vbi faciendum 41
sit post hac perstringemus. Cæterum 44
quamuis multa iam dictis consenta-
nea scribi possent, tamen res de qua
plurimum habui sermonem, effica-
cius testimonium nō desyderat, quip-
pe quæ cōmodissimum contemplati
præbet aditum. Incipientibus igitur
acutis morbis, accidit interdum vt la-
borantium alii eodem quo incœperūt
die cibos ingerāt, alii postero die, alii

DE RAT. VIC. IN MOR. A. C.

quicquid forte fortuna nacti sunt sor-
beant, alii cyceonem, id est cinum
bibant. Quorū error etsi grauior est,
quā si diuersa victus ratione vsi fuif-
sent, tamen longe minus læditur is,
qui hac occasione peccauerit, quā si
duobus, tribus ve primis diebus, ve-
nas pœnitus concidere sinens, mox
quarto quinto ve die huiusmodi vi-
ctus rationem aggrediatur. Sed lon-
ge grauissimum est, si omnibus iis die-
bus venas exinaniri permittat: de-
inde posterioribus diebus, prius ta-
men quam morbus maturetur ad hu-
iusmodi victus rationem se cōuertat.
Siquidem plurimi hoc pacto mortis
periculum subeūt, nisi salubris admo-
dum fuerit morbus. Errores autē ab
initio protinus commissi, non ita dif-
ficulter corriguntur, sed faciliore cer-
te admittunt medelaīm. Hoc documē-
44 to nullum aliud puto salubrius. pri-
mis enim diebus nullum sorbitionis
genus subtrahendū est his, qui paulo
post vti sorbitione cogantur. Etenim
45 qui hordeacea ptisana vtuntur, peni-
tus nesciunt ipsam noxiam esse, si tri-

bus, quatuor, pluribus ve diebus exinanitis iam venis sorbere incœperint. Neque etiam cremorem eius dūtaxat accipientes, quum non recte sorbere incœperint, noxam sibi inferri intelligunt. sed tum primum & cauent, & periculi magnitudinem agnoscunt, quum ante morbi maturationē, quis ordeaceam ptisanam sumit, qui cremore eius vti solebat. Vnde manifestissime colligitur, medicos non recte agrotis victus rationem præscribere. quippe qui in morbis, non venarum exinanitione, sed sorbitione egentibus venas concidere permittunt. Contrà vbi à venarū exinanitione ad sorbitiones transire periculosum est, ipsi confestim transmutando plarumque peccant. Ac nōnunquam a venarum inanitione, ad sorbitiones eo tempore transeunt, quo satius esset (ita exigente morbi irritatione) a sorbitionibus ad venarum exinanitionem transire. Quapropter quibusdam ex capi

46

47

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

tia, amaritudineque infestantur, delirant, ac splendentia quædam ipsorum oculis obiiciuntur, aures sibilo implentur, extremæ membrorū partes infrigidantur, vrinx redduntur incoctæ, sputa tenuia, salsa, colore syn-
cero, exigua, sudores a ceruice profluunt, anxietate vexantur, spiritus errat, quippe quum sursum fertur aut frequens est, aut valde magnus, supercilia grauantur, animi defectio vrget, eaque mala, vestes a pectore piiciunt, manus tremore afficiuntur, imum labrum nōnunquam concutitur. ¶ Hec si ab initio apparuerint delirium, & quidem multum ac vehemens denunciant, atq; æger magna ex parte moritur. Quod si mortem effugerit, aut abscessu, aut sanguinis fluore è naribus, aut crassi puris sputo liberatur, nec aliter euadere poterit. Neque video medicos harum rerum experientia ita exercitatos, vt imbecillitates in morbis discernant, siue ob venarum inanitionem, siue ob aliam quādam irritationem (vt vel dolorem, vel morbi vehementiam) eueniant.

Neque eas affectionum species digno-
 scunt quas vel natura nostra, vel ha-
 bitus, singulis efficere solet, quanquā
 ab iis, vel salus (si cognoscantur) vel
 mors (si propter imperitiam lateant)
 expectada est. Sane ut grauissimum
 peccatum censetur, si vel ob labo-
 rem, vel morbi vehementiam im-
 becillo, aliquis vel potionem, vel sor-
 bitionem, aut cibum exhibeat, exi-
 stimans eum a venarum exinanitio-
 ne factum debiliorem, ita impuden-
 tissimum est, eum quem venarum exi-
 nanitio reddidit imbecilliolem, non
 cognoscere, & abstinentia torque-
 re, quanquam ne hoc quidem pecca-
 tum periculo vacat. tamen ut supe-
 riore leuius est, ita magis deriden-
 dum. Si enim alius quispiam siue me-
 dicus, siue plebeius, accesserit, nota-
 ueritque accidentia, deinde contra
 prioris medici institutum, cibum, po-
 tionemq; exhibeat, plane cōstat hūc
 non nihil auxilii attulisse: pinde prio-
 ris artificis institutum grauissimam
 subit calūniam. videturq; superueniēs
 vel medicus vel plebeius veluti mor-

DE RAT. VICIN MOR. AC.

25

tuum resuscitasse. Nos de hac re notas quasdam scribemus, quibus singula discernantur. atq; hæc quæ iam proposui, similia fere sunt accidentibus, quæ ventriculum nonnunquam instant. Etenim si vniuersum corpus præter consuetudinem diu quieuerit, non protinus robustius euadit. Quòd si longiori quoq; spacio torpuerit, deinde protinus labores aggrediatur, id quod effecerit, vile erit. Similiter de reliquis quoq; corporis partibus sentiendum est. Neque enim pedes, neque aliæ corporis partes, recte sua munera perficient, disuetudine laborem intercipiente, si aliquando subito laborare tentauerint. Similiter & dētes & oculi & cæteræ quoq; partes afficientur. Nam & cubile præter consuetudinē, aut molle, aut durum molestum est. quāquam quod sub diuo præter consuetudinem stratum est, corpus indurat. Porro horum omnium satis fuerit exēpla quædam perstringere. Esto sane quod tibia cuiuspiam vlcere nō omnino salubri laboret quodd neque perdifficilem, neque facilem omnino

curationem admittat. Si prima protinus die, inter curationis videlicet initia, sic iaceat, vt nequaquam crus eleuet, inflammatione haudquaquam afficietur, multoque citius bonæ valetudini restituetur, quàm si inter curandum errorem committat. quòd si à die quinto, aut sexto, vel serius etiam surrexerit, & incedere conetur, magis dolebit, quam si protinus ab initio in curatione peccasset, si vero subito multumque fatigetur, grauiori cruciabitur dolore, quam si per iam propositos dies inter curandum fuisset fatigatus. Itaque ex his omnibus perfectum licet colligere testimonium, quòd omnis subita mutatio, si modum exceserit, noxam inducit. Venter autem grauius læditur si ei postea quàm vehementer conciderunt venæ, protinus imodice quidpiam ingeratur. Sic reliquum quoque corpus si ex multa quiete, subito ad vehementes labores deducitur, magis lædetur, quam ubi ex pleniori cibo ad venarum exanitionem transmutatur. Illorum etiamnum corpora torpere necesse

56

57

DE R A T. VIC. IN M O R. A C.

est, qui ex multa fatigatione, repente ad ignauiam secordiamque sese conuertunt. Proinde ventriculos ipsorū, haud ita multo cibo exercere oportet: alioqui & dolore & grauitate totum corpus vexabitur. Cæterum de immutatione vel ad hæc vel ad illa, longius fuit nobis sermo, quod huiusmodi notitia, ad omne fere negocium vtilis est, præsertim ad hoc nostrum propositum, quod scilicet in acutis morbis a venarū exinanitione ad sorbitionem trāseuntes, pmutatione a nostris præceptis aberrare nō permittant. Etenim non est exhibenda sorbitio donec maturus videatur morbus, aut aliud signum, vel circa intestina, vt vacuatio aut irritatio, vel circa præcordia apparuerit. Vehemens vigilia, vt cruditatem incoctionēque, tum ciborum tum potionis efficit, sic in diuersam partem transmutatio, corpus resoluit, & velut decoctum reddit, capitisque grauitatem inducit.

DE VINO.



Gitur vinum dulce,
& vinosum, & albū,
& nigrum, atq; aquā
mulsam, & aquā, &
oxymel, quātum ad
acutos morbos per-
tinet, his ferē notis distinguere oportet. Dulce quidem vinum, non adeò, vt vinosum, capiti grauitatē affert, & minus tentat metem, nec vllū aliud tam facile p intestina descendit. sed iecur, & lienē in tumorē attollit: ac ne his quidē vtile est, in quibus amara bilis exuperat. Nā & sitim excitat, & superiorē intestinorū partem inflat. inferiori vero intestino (q ad flatu rationē attinet) non adeò infestū est. Sane flatus, quē dulce vinum excitauit, non facile pertineat, sed in p̄cordiis diu commoratur. Vrinā oīno minus hoc, quā album vinosumq; ciere potest. At nullum aliud eff. caciū promouet sputum, nisi quum sitim induxerit, tum enim minus quā ceterā spu-

DE R A T.V.C.IN M O R.A C.

tum euocat.vbi vero nō excitat sitim,
omni alio efficacius scretum iuuat.

- 8 Vini albi vinosi, tum laudes tum vitu-
perationes, in dulcis vini enarratione
magna ex parte continentur. ipsum
enim omni alio facilius ad vesicā trā-
sit, vrinam ciet, magnāq; semper au-
xilium in his morbis afferre solet. quā-
uis enim (quod ad reliquos vsus perti-
net) ab alio vino superetur, quia tamē
per vesicā purgat, magnifice liberat,
si exhibeatur vt oportet. Has igitur
de vini tum vsu, tum noxa coniectu-
ras (licet perpulchræ sint) maiores no-
9 stri ignorauerunt. Fuluum vinum, &
nigrum austerum, eundem vsu ha-
bere censerē in acutis morbis, nisi ca-
pitis grauitatem inducerent, & men-
tem attingerent, atque sputi vrinxq;
exitum impedirent. Cæterum a vino
albo aliisq; id genus non maxime ab-
stinendum est, quum alui excremēta
10 & mollia, & ramentosa fuerint. Id ve-
ro neminem latere debet, qd superio-
res & inferiores corporis partes, vt mi-
nus lædit vinum, dilutū, ita meracius
intestinis magis auxiliatur.

DE AQVA

LIB. III. 81
DE AQVA MVLŒA.

Aqua mulŒa per totum mor-
bi acuti decurŒum epota, his
qui amara bile abundant,
& quibus tumida Œunt viŒce-
ra, minus conuenit. quamquam ipsis
non adeo, vt vinum dulce, Œitim ex-
citāt : pulmonem autem lenit, Œpu-
tum mediocriter educit, tuŒŒientibus
prodeŒt, quippe quæ abŒtergendi fa-
cultatē obtinet, Œed plus viŒcoŒitatis
quā oportunū Œit, Œputo inducit. Ciet
vrinā efficaciter, niŒi viŒcerū aliquod
obŒtiterit. alui bilioŒa excremēta edu-
cit, quæ interdum vicioŒa Œunt, inter-
dum magis quā oportet & exupe-
rant & Œpumāt. Id vero bilioŒis ma-
xime accidit, & his quibus intume-
Œcunt viŒcera. ¶ Aqua mulŒa quo Œue-
rit dilutior, eo efficaciorē euocandi
Œputi vim obtinet, atq; pulmonem
reddit leniorē. Quæ vero minus dilu-
ta eŒt, alui Œpumofa excrementa, &
Œupra modum bilioŒa, & calidiora
magis quā dilutior ducit. quāuis
alias præterea noxas inferant huius-
modi excremēta. Neq; enim præcor-

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- diorum ardorem extinguunt, sed excitant, efficiuntq; vt difficult er morbum sustineat ager, & membra hinc inde deiiciat. intestina etiam, & anū
- 17 vlcera. Quibus vero auxiliis ea curare oporteat, postea explicabimus.
- 18 igitur si in huiusmodi morbis, quis aqua mulsa, pro alia potione, post habitis sorbitionibus vtatur, is vt multa felicissime conequetur, ita ferre nunquā sua spe frustrabitur. Ergo quibus danda vel inhibenda sit, vel quas ob causas ab ea temperandum sit, magna ex parte iam dictum est. Sed damnauerunt nonnulli aquam
- 19 mulsam, q; bibentium vires frangat, maturamq; mortem citet. Cui errori occasionem dederunt hi, qui mortē sibi fame consciuerunt. Sunt enim nonnulli qui aqua mulsa perinde ac si huiusmodi quandam vim habeat, vtuntur. sed id perpetuum non est.
- 20 quippe per se potui data (nisi ventrē,
- 21 turbauerit) aqua longe valētior est.
- 22 Quinetiam vino albo, tenui, imbecillo, non odoro, interdū valentior interdum imbecilior deprehenditur.

Etenim vini, mellisq; puri, si vtriusq;
vim cōsideraueris, magna est diffe-
rētia. Nā si duplo plus vini puri quis-
piam biberit, q̄ linxerit mellis, longe
plus viriū à melle, modo ventrē non
turbauerit, cōsequetur, vel hoc argu-
mento, q̄ plus subinde stercoreis deii-
ciet. ¶ Aqua mulsa à ptisanæ sorbi- 24
tione epota, vehementer replet, &
inflat, visceraq; in precordiis lædit.
Ante sorbitionē autē assumpta non
solū nō adeo ledit, verū etiā interdū
magnifice prodest. Coctū mel, aspi- 25
cientibus quidē longe p̄stantius cru-
do videtur. est enim splēdidū, tenue,
candidū, & perspicuum. sed quibus
ab eo viribus differat equidem non
intelligo. Neque enim (si bonum fue-
rit) crudo suauius est, & minus ab eo
stercoreis descendit, quanquam neu-
tro horum ad aquæ mulsæ proba-
tionem indigemus. Aliquando tamē
cocto melle vtendum maxime si vi-
tiosum, impurum, nigrum, & haud
iucundioris mel fuerit. si quidem plu-
rima huiusmodi turpitudinis vitia
coctio tollit.

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

DE OXYMELLE.

26 **P**otionem ex oxymelle voca-
to, sæpenumero vtilem inue-
nies in his morbis : siquidem
27 sputum educit, spiritumq; red-
28 dit faciliorem. Atq; hæ sunt eius oc-
casiones. Quod si vehementer fuerit
acidum, modum in sputis quæ non
facile redduntur non seruabit. Etenim
si retenta educeret, gutturq; ipsum le-
ue & lubricum redderet, pulmonem
haud mediocriter iuuaret vtpote qd
molliendi vim obtineret: quæ si cõ-
tingerët, inter maxima nimirũ esset
auxilia numerandum. sed euenit in-
terdum (quum vsque adeo acutũ fue-
rit) vt non solum non possit sputum
educere, verũetiam viscosius ipsum
efficiat atq; submergat. Sane illi po-
29 tissimum sic afficiuntur, qui alioquĩ
pernicioso morbo laborantes, neq;
tusses, neq; ea quæ intus continentur
screare possunt. His itaq; sic se habẽ-
30 tibus, ægri vires perpendere, & si ad-
huc in spe fuerit, tũ dare ipsum oportet.
quũ vero dare decreueris, vt per
quã tepidum sit studendũ est, ac neq;

affatim, sed paulatim exhibendum
 est. Vbi vero non adeo fuerit acidū,
 os & fauces humectat, sputū euocat,
 sitim compescit, præcordiis, visceri-
 bus, ceterisque id genus partibus ami-
 cum est. Etenim mellis (quas prædi-
 ximus) noxas prohibet. quippe quod
 in melle biliosum est, ita reprimitur.
 flatus præterea illud quidem discutit,
 & urinam ciet. sed intestini partem
 imam laxat, & ramenta elicit. Atqui
 in acutis morbis inutiliter nonnunquam
 exhibetur. præcipue vero quia non
 solum flatum cohibet, verum rursus
 ipsum reuerti cogit, vires frangit, &
 membrorum extremas partes infri-
 gidat. Atque hæ sunt (quas equidem 36
 nouerim) aceti multis noxæ, haud in-
 dignæ quæ literis prodantur. Huius
 quidem potionis paulum noctu, ac 37
 ieiuno, ante videlicet sorbitionem
 recte propinatur. quamquam nihil
 prohibet ipsam a sorbitione quoque
 bibere, modo longum interueniat
 spacium. Porro qui in victus ratione 38
 sola potione, posthabitis sorbitioni-
 bus, vtuntur, iis ipsum non semper

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

exhibere conuenit, vel ob hanc maxime causam, quod intestina abradit, & exasperat, utpote tum nihil stercoreis continentia, & quidem vacuis iam venis, atque fractis ab aqua mulsa viribus. **39** Quod si per vniuersum morbi decursum, ab hac potione, eaque multa, praesidium aliquod expectaueris, paulum aceti infunde, tamen videlicet ut gustanti, dumtaxat sensum moueat. sic enim citra noxam, debita auxilia praestabit. **40** Ceterum acuta vis aceti (ut summatim dicam) his magis quibus amara, quam quibus atra bilis exuperat, conferre solet. quippe amara ab ipso dissoluuntur, & agitantur, ac in pituitam degenerant. Atra vero bilis in massam attollitur, & multiplicatur. **41** Nam acetum atram bilem parit. Mulieribus autem longe magis quam viridis aduersatur, utpote quod vterum dolore cruciat.

DE AQUA.

42 **A** Qua in acutis morbis potui datur, nec aliud ab ea praesidium petendum censeo. Neque enim in peripneumonia tussim sedat. nec est

alia potio, quæ minus sputum producat, si crebro quis eam biberit. Sane si inter oxymel & aquam mulsam, aqua modice bibatur sputum euocat, siquidem potionum qualitatem, facta inundatione transmutat, alioqui neque sitim sedat, sed amarescit bilem etiam parit in his qui suapte natura biliosi sunt. præcordiis infesta est. Quum vero vacuo etiam dum ventriculo ingeritur, ut longe pessima, & summe biliosa redditur, ita vires maxime prostermit. Lienem & iecur (ubi inflammatio infestat) attollit, fluctuat, supernatat, tarde transmittitur, utpote frigida, & cocta difficilis, non ducit aluum, nec ciet urinam, atque ex eo quoque viciosa est, quæ stercoris suapte natura expers est. Quod si refrigeratis aliquando pedibus quis eam, biberit, ex iam propositis noxis omnibus illa multo grauius ipsum afficiet ad quam fuerit perlicuior. Vbi vero in huiusmodi morbis timueris, ne vel caput vehementer grauetur, vel mens tetetur: tum vel aquam, vel vinum aquosum, & album, & haudquaquam odorum exhibere oportet: deinde pau

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

lum aquæ superbibere. Sic enim vi-
ni potentia non tam facile caput &
mentem attinget. Sed in quibus a-
44 fectibus, aqua potui dāda sit, & quā-
do plurima, & quando modica, ac
vbi frigida, & vbi calida, partim iā
diximus, partim vero suo loco dice-
45 mus. Cæterum de potionibus quæ
fiunt ex hordeo, herbis, vua, vel eius
corticibus, tritico, cneco, myrtis, ma-
lo punico, vel ex aliis quoq; rebus,
quando ipsis vti conueniat, seorsum
à singulis morbis dicemus, ad quem
locum composita quoq; medicamē-
ta seruamus.

DE BALNEIS.

46 **L** Auacri vsus in plerisq; mor-
bis confert, idque in aliis qui-
dem morbis perpetuum est,
in aliis minime. Sed raro vtū-
tur eo homines, q̃ ipsum præparare
nesciunt. quippe in paucis admodū
domibus, vel instrumenta vel mini-
stri apti inueniuntur. & nisi exacta
cura inter lauādū adhibeatur, haud
mediocre proueniet à lauacro ma-
lum. Etenim tegmine indiget æger

cui fumus non accedat: itē aquæ abū-
 dantia, & crebra lotionē, sed quæ nō
 sit impetuosa, nisi res ipsa ita exigere
 videatur. Ac neq; abstergere eū oportet. 47
 q̄ si absterfionis vsus aliquando
 inciderit, calorifico aliquo, eodemq;
 multiplici smegmate, pro ipsius cō-
 suetudine, vtendum est. Perfundere
 vero celeriter multam aquam oportet. 48
 Via ad solium brevis sit, vt & ac-
 cessum, & exitum faciliore prebeat.
 Is vero qui eluitur decentem compo- 49
 situmq; gerat corporis habitum, atq;
 50
 taceat, ac ne ipse quidem quicquam
 faciat, sed alii perfundant & abster-
 gant. deinde temperaturas multas
 51
 pparent, & celeriter pfusiones ipsas
 52
 expediant. Spongia pro strigili vtā- 53
 tur, vehementer exiccatum non vn-
 gant. Caput adhibita spongia ter- 54
 gendum, & quantum maxime fieri
 potest, siccandum est. Extremæ mē- 55
 brorum partes, & caput, ac reliquum 56
 quoq; corpus, a frigoris iniuria tueri
 debet. Neq; lauacro committendus 57
 est is, qui nuper vel sorbitionem vel 58
 potionē sumpsit. ac ne lauacro qui

DE RAT. VIC. IN MOR. ACV.

dem ilico vel sorbere, vel bibere con-
59 uenit. Magnopere tamen laboranti
indulgendum est, si quū bona adhuc
esset valetudine, vel amauit lauacrū,
vel elui consuevit. Quippe qui maio-
re lauacri desyderio tenentur, ii ma-
ius inde præsidium ferunt, adeo q̄ le-
duntur quoq̄, nisi lauentur. ¶ Peri-
60 pneumoniae magis quā ardoribus
auxiliatur lauacrum. namq̄ lateris,
pectoris, & dorsi dolorem mitigat,
sputum maturat, & educit. spiritum
facilem reddit, fatigationē lenit, ar-
ticulos, & ambientem cutem emol-
lit, vrinam ciet, capitis grauitatem
soluit, nares humectat. Tanta ex la-
uacro proueniunt commoda, quibus
nimirum omnibus indigemus. Qd̄
si in apparatu, vel in re vnica vel plu-
ribus quoq̄ tantum abest vt prosit,
vt etiam noceat, peccatum inciderit
(nam quicquid a ministris improbe
præparatum est, id citra noxam esse
61 non potest) qui per morbos citatio-
res sunt aluo quā fuerit oportunū,
aut quibus supra modum aluus astri-
cta, non ducitur, ii lauacro comuni

non debent. ac neque ii, quibus imbecillæ sunt vires, aut qui fastidio, aut vomitione affecti sunt, aut qui biliosa ructant, aut quibus sanguis è naribus profluit nisi minus, quam occasio expetit effluat. Nec ignorare debes occasiones. Etenim si occasionis respectu, exiguus est fluor, abluendus est æger, siue vniuersum corpus, siue caput dūtaxat, ita iuari videatur. Igitur si singula cōmode parata sunt si æger citrà noxam lauacrum subire potest, quotidie lauāndus est. Quòd si præterea lauacro delectatur, eum si bis quoq; laueris, non lædes. Santius vero est eos lauacro vti, qui integrā ptisanam, q̄ qui solum cremorē eius assumunt, & si his quoq; nōnunquam vsui est. Qui vero potu dūtaxat vtūtur, minime lauacrum subeant: quāquā horum nōnulli ab ipso arcendi interdum non sunt. Coniicere itaque oportet ex his quæ supra demonstrauius quibus lauacrum, & in quo victus genere, auxiliari possit necne, si enim quidpiā eorū, q̄ ad lauacri bonitātē pertinent, deest, quāuis nōnihil

62

63

DE RAT.VIC.IN MOR.ACV.

præsidiū à lauacro speraueris, lauari
tamen non oportet. Quòd si nihil
horum deest, videaturq; ex notis qui
busdam vsui fore, tū lauari cōuenit.

LIBER QVARTVS CONTINET

ea præcepta, quæ non Hippo-
cratis propria, sed spuria
esse creduntur.

DE ARDORE.



2

3

4

Enæ æstiuo tempore
exiccate, auellunt ad
sele acré, biliosamq;
saniē. Vnde & vehe-
mēs febris oritur, &
corpus fatigatiōe op-
p̄ssum laborat & do-
let. Accidit autem magna ex parte,
& ob longa itinera, & diutinam si-
tim, quum exiccatae venæ, acres, calī-
dasq; fluxiōes alliciunt. quocirca lin-
gua sit scabra, arida, & prænigra: ven-
ter torminibus cruciatur, alui sedimī-
na liquida sunt & pallida, vehemēs
sitis cruciat, somnus nequaquam ac-
cedit, interdum mens quoque turba-

tur. Huic & aquæ, & aquæ mulsæ co- 5
cta, quantum voluerit, potui dabis. 6

¶ Quodd si amarulentum fuerit os, tū
& vomere, & aluum eluere conue-
nit. si vero ne ab his quidem soluitur
ex asinæ cocto lacte purgato. Nihil 7
vel falsum, vel acre exhibendum est. 8

non enim descendit. Sorbitiones do-
nec morbus decretorios dies præte-
rierit, non dato. Quumq; sanguis è 9
naribus fluxerit, sudoresq; decretorii
& legitimi fuerint atque in vrina al-
ba quædam & crassa & leuia subse-
derit, aut si alicubi apparuerit absces. 10
sus soluitur affectio. Quæ si nullo ho-
rum apparente soluta fuerit, vel ite- 11
rum reuertetur, vel coxam, aut crura
dolor infestabit, & crassa quædam ex-
puet, si videlicet bonæ valetudini re-
stitui debeat.

ARDORIS ALIVD GENVS.

12
Alius soluta est, vehemens sitis,
lingua scabra, arida, falsa, vri-
næ defectus, vigiliæ extreme mē-
brorum partes frigida. ¶ Huiusmo- 13
di ardor non finitur, nisi aut ex nari

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

bus fluat sanguis, aut ceruici absces-
sus, aut cruribus dolor superueniat,
atq; crassa sputa quis excreet (id quod
astrieta aluo solet accidere) aut coxæ
dolor aut genitalium liuor appareat
14 aut testiculus intēdatur: atq; hoc mo-
15 do solutam aluum ardor comitatur,
16 Sorbitiones attractiuas dato. In acu-
tis affectibus sanguinē detrahe, si ve-
hemens videatur morbus & infirmus
17 ætate floreat, abundetq; viribus. Igi-
tur si angina fuerit, siue, alius quispiā
morbus ut costalis, eligmate etiam
num purgato. Quod si ob multi san-
guinis missionem, vires prostratum
iri timueris, tertio quoq; die clysterē
aluo iniice, donec in tuto fuerit eger
18 & fame indigeat. Inflammata præcor-
dia septum transuersum non ab in-
clusis flatibus intentum, vel ob flatuū
quoq; præsentiam, arida suspiria, quī
bus pus non subierit sed ubi flatuum
clausura huiusmodi affectus fiunt, po-
tissimum vero iecoris dolores, lienis
grauitas, ac reliquæ inflānationes, itē
septi trāsuerſi dolores, & morborū
cōuersiones solui non possunt, si pro-

tinus ab initio medicamētis curatio-
nē aggrediaris. Nā p̄cipuū in his pro-
positū est in primis sanguinē detra-
here. deinde clysterē exhibere, idq; si
magnus vehemēsque fuerit morbus. Si
vero nō ita vehemens fuerit, medica-
mento curatur, qđ tu te, moderatēque
misso prius sanguine adhibendū est.
Qui statim īter morbi initia īflāma-
tiones medicamēto soluere conātur,
ii à distēta, īflāmataque pte nihil aufe-
rūt. affectus vero, vtpote crudus, non
remittitur, ac ptes sanę morbo resistē-
tes, colliquescūt: quocirca morbus ī-
becillū iā corpus vincēs, curationi nō
obedit. Si repēte qs obmutuerit, is ve-
narū conclusione molestatur, id sa-
no homini sine occasiōe, ac sine alia
vehemēti causa acciderit, dextri bra-
chii internam venam secare oportet,
& pro habitus ætatisque ratione,
sanguinem detrahēre, consyderan-
do exuperantiam atque defectum.
Porro sic affectis, huiuscemodi quo-
que casus eueniunt, faciei rubor ocu-
lorum constantia, manuū incontine-
tia, dentiū stridor, pulsus maxillarū,

19

20

21

22

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

extremarum partium frigus & contractio, flatuum in venis conclusio.

- 23 ¶ Superueniente ab atra bile dolore, acrisque ruente fluxione, internæ partes mordicus dolent, venæ vellicatæ aridioresque factæ tenduntur, & inflammatae alliciunt ad sese ea quæ affluunt quam ob rem corrupto sanguine, ita ut spiritus in ipso nequeant naturales meatus pertransire, frigora ob plenitudinem eueniunt: item obtenebrationes, taciturnitas, capitis grauitas, neruorum distentiones, idque præcipue si iam vel ad cor, vel iecur vel venam peruenierit. Hinc igitur comitiales morbi, & attoniti proueniunt si incontinentes sedes inciderint fluxiones, spiritusque egredi nequeunte, are-
24 scant. ¶ Quapropter statim ab initio, adhibito fomento, sanguinem detrahare oportet, dum adhuc omnia infestantia, tum status, tum fluxiones suspenduntur, sic enim facilius vincuntur remediis. Deinde reficere, atque habita iudicationis ratione, nisi fursum ferantur, medicamentis purgare. Quod si alius astricta fuerit,

eta fuerit, clysterem iniice, & coctum
asinae lac exhibe, idq; plus quam sede
cies, si vires tolerare possint.

DE ANGINA.

A Ngina fit, quū hyeme aut vere, 16
multa eademque viscosa fluxio
ad iugulares venas descēderit, q̄ qui
dē, vtpote ample, plurimū ad sese spi
ritū cōuellunt. Quū itaq; fluxio quæ
frigida, viscosa quæ est, & spiritus,
& sanguinis meatus obstruxerit, quic
quid sanguinis proximum est, figit,
ipsum vero imobilem, constantemq;
efficit. quippe quæ suapte natura re
frigerandi, obstruēdique facultatem
obtinet. Proinde suffocantur egri, lin
gua liuente, rotunda, & incurua, pro
pter subditas ei venas. Præcisa enim
vua (quam nonnulli columellam vo
cant) vtrinque crassę apparent venæ,
quæ vbi impletæ sunt, linguæ (quæ ob
siccitatem rara, fistulosaq; est) innitū
tur. Hæc deīde vi coacta, ex venis hu
morem suscipit. quam ob rem latitu
do in rotunditatem, coloris venustas
in liuorem, mollities in duritiē per
in

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

mutatur, vt quę facile antea flectebatur, curuari nequeat. Itaq; celeriter iugulat, nisi protinus iuueris, sanguinē ex brachiis detrahendo, deinde venas sub lingua fecare, medicamento quod trahendi vim habeat purgare, calida gargarismata exhibere, caput radere eidemq; atq; ceruici ceratū imponere, lanis inuoluere, molli spōgia ex aqua calida expressa fouere, aquā egelidam, & aquam mulsam (sed ne hāc quidē frigidam) potui dare iusculum quoque tum exhibere oportet, quum iudicato iam morbo, in tuto fuerit ager.

ALIUD ANGINAE GENVS.

27

Q

Vum p æstatem, aut autumnum, calida fluxio á capite, destillauerit, eaq; nitri qualitātē imitetur, fueritq; (vt ab anni tempore) acris & calida: hęc quum huiusmodi fuerit, mordet, vlcerat, spiritu implet, orthopnoeam, & ariditatem vehementem inducit. Partes aut, quas visus cōsequi potest, tenues apparēt. tendines ceruicis posteriores adeo intēduntur, vt ri-

28

29

gidi videantur. vox abrūpitur, spiri-
tus paruus est, spiratio densa violētā-
q̃. Atq; sic affectis arteria vlceratur, 30
pulmo ardet. Namq; externū aerem
attrahere non possunt. Itaq; nisi sua
spōte in exteriores partes huiusmodi
affectus efferatur, grauissimum ineui-
tabilēq; periculum cōminatur. idq; p-
pter anni tempus, & qđ a calidis acri-
busq; constat humoribus. ¶ Si febris 31
aliquē inuadit, vetere nondū deiecto
stercore, aut nuper accepto cibo, is, si
ue lateris dolor infestet, siue nō, quie-
ti permittendus est, donec ad imum
ventrem cibus primum descenderit,
ac subinde acetum mulsum in potu 32
sumat. Quum vero grauitas ad lum-
bos vsq; descēderit, tum vel clysterē
exhibere, vel medicamento purgare
conuenit mox a purgatione victū in-
stituire, atq; in primis forbitionem,
deīde aquā mulsam. postremo cibos
pisces videlicet elixos exhibere, & vi-
nū dilutū idq; exiguū, atq; noctu dū
taxat. iterdiu vero aquā mulsam di-
lutā. Si flatus foetidi fuerit, balneū cō-
uenit aut clyster, nisi acetum mulsum

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

epotum obstiterit, donec ad imum
ventrem defenderit. tum enim aluum
ducere, iniecto clystere nihil prohi-
bet. Vbi soluta aluo, ardor acciderit,
videaturq; medicamentum posse cō-
ferre, id intra tres dies exhibendum
non est, sed quarto. ¶ Quum à vacua-
tione sorbitiones exhibere volueris.
obserua februm accessiones, vt neq;
quum adsunt neque quum venturæ
sunt, eas ingeras, sed quum iam finite
sunt, aut cōquieuerunt, & quum ma-
xime ab initio distare videntur. Cæ-
terum pedibus frigore affectis, neq;
sorbitionem, neque aliud quicquam
dato, sed maximū te præsidium attu-
lisse putato, si donec percalfacti fue-
rint expectaueris, deinde sic vtile qd-
piam exhibueris: siquidem refrigera-
ti pedes magna ex parte iam affutu-
ram febris¹ accessionem significant.
Quo tempore si cibum ingesseris,
omnia maxime errore turbabis, vt
qui non parum auxeris morbum. At
quum febris quieuerit, tum econtra-
rio pedes reliquo corpore fiunt cali-
diores. Aucta enim febris pedes ipsos

refrigerat, atque ex thorace incensa,
mittit flammam in caput. Igitur vni
uerso calore cōfertim superiores par
tes petente, euaporanteque in caput,
nihil mirum est, si pedes īfrigidātur.
quippe qui suapte natura vt carnis
expertes sunt, ita nervis abundant, ac
non parum distant ā calidis sedibus.
itaque collecto in pectore calore ipsi
refrigerantur. Sic haud absimili ratio
ne, victa, quiescētēque febre calor in
pedes descendit, atq; hoc tempore, &
caput, & pectus refrigerātur, ac tum
cibus dandus. Cuius rei causam sic ac
cipe. Nam occupante pedes frigore,
ventriculum calidum, & fastidio af
fectum, atq; præcordia intēta esse ne
cesse est. quinetiam corpus ob inter
nam turbationem iactatur, mens su
spenditur, dolores infestant, æger di
strahitur, vomere affectat, quumq; vi
tiosa quædam vomuerit, dolore affli
gitur. Ergo quum in pedes calor de
scenderit, nisi sudare videatur, emis
so prius lotio, sorbitionē dare oport
et, alioqui perniciosam. Quibus per
febres alijs assidue soluta est iis vti

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

lius est pedes calfacere, ceromata adhibere, & fasciis inuoluere: nec vnq̃ committe vt reliquo corpore ipsi sint frigidiores. vbi vero calent, calorificis opus non est. sed ne infrigescant cauendum est. deinde vel aqua frigida, vel aqua multa, eaque perexigua,
 36 potui danda est. Febricitantes non pauci, quibus alius liquida est, & mēs turbata, flocos decerpere, nares fodere, interrogati paulum respōdere, neque sua sponte quicquam aptum dicere solent. Hæc (vt opinor) ad atrabilem pertinent. quibus in hunc modum se habentibus, si ob alium solum tam homo cōsumi videtur, sorbitiones (mea quidem sententia) frigidiores, crassioresque potiones vero reprimentes, & magis vinosæ, aut astringentes exhibendæ sunt. Quibus inter febrium initia, vertigines & capitis pulsationes accidunt, fuerintque vrinae tenues, iis febris impetus apud iudicationem expectanda est. quod si tum delirant, nihil mirandum est.
 38 Quibus incipiente morbo vrina crassa est, aut veluti nubeculae in ipsa su-

spenduntur, eos purgare conuenit, si
 nihil aliud obstiterit. Qui vero tenu-
 es urinas ab initio mingunt, medica-
 mento purgandi non sunt, sed clyste-
 rem exhibendo, eos curare in hunc
 modum oportet. corpus quieti pmit-
 tere, mox & ungere & æqualiter co-
 ponere, aquam mulsam dilutam po-
 tui dare, ad uesperam ptisanæ cremo-
 rem sorbere, aluum ab initio clyste-
 re ducere. Sed medicamentum eis dā-
 dū non est. si enim aluum citaueris,
 nō ma turabitur urina, sed febris diu
 sine sudore permanebit, & post lon-
 gum quoque spacium finietur. Ne-
 que sorbitiones per tumultum, quū
 scilicet proxima fuerit iudicatio, da-
 re, sed donec inclinetur, & in melius
 tendat febris, eas seruare oportet.
 Omnium præterea febrium iudica-
 tiones considerandæ sunt. nam eo
 tempore (ut iam didicisti) sorbitio-
 nes sunt auferendæ. Si longæ fue-
 rint huiusmodi febres, ægri absces-
 sus habere solent, idque si aurium
 imæ ptes, ceruixq; frigescat. Si vero
 nō afficiatur frigore, alia erit febriū

m iiii

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

mutatio. nam & sanguis fluet è nari-
bus, & ventres eorum turbabuntur.
Quibus molestæ febres sunt, & præ-
cordia tenduntur & in cubili contine-
re in eodem se positi nequeunt, atq;
extremæ membrorum partes infrigi-
dantur, ii multa omnino diligentia,
& accurata obseruatione indigent.
atque sic educandi sunt, vt nihil aliud
quàm acetū mulsum eis exhibeatur.
forbitiones nequaquā offeras, donec
morbus finiatur & maturetur vrina.
in obscuro cubiculo decumbere de-
bent, & strato perquā molli: diu eun-
dem positum tolerare, & haudquaquā
44 sese iactare, quo præsidio nullū aliud
salubrius est. deinde præcordia ex lini
semine linere, cauendo ne dum illi-
nuntur, frigus horrorem citet. ipsum
vero tepidum esse debet, quātum ma-
xime potest, Coquitur autē ex aqua
45 & oleo. Quid autem futurum sit, ex
lotio conicere oportet. vt enim cras-
sum pallidūque melius est, ita peius
est id quod vel candicat vel nigrum
46 est. Varium vero lotium, diuturniorē
fore morbum significat, cuius iniqua

litatē, modo ad peius, modo ad me-
 lius conuerti necesse est. Inconstantes
 febres sinere oportet, donec in ordi- 47
 nem redigantur. deinde & victus ra-
 tionem & aptam curationem eis op-
 ponere, non neglecta naturæ contem-
 platione. At quia variæ sunt ægorū 48
 facies animaduertat medicus ne vllæ 49
 ipsum occasiones lateant, siue ad con-
 syderationem illæ pertineant, siue ad
 numerum vel parem vel imparem re-
 referantur. Maxime vero impares 50
 dies metuēdi sunt, qui videlicet egros
 in diuersas affectiones distrahere, cō-
 sueuerunt. Obseruandus itaque pri- 51
 mus dies est quo debilior factus est la-
 borans cōsyderando initium, ex quo
 & vnde acciderit, id enim præcipuum
 esse putatur qđ scire oporteat. Itaq;
 interrogando ipsum, hæc omnia per-
 pendere debes. In primis quidem ca-
 pitis affectionem, an dolore, grauita-
 teq; infestetur, deinde præcordia & la-
 tera: hæc quidem, nullō ne dolore cru-
 cientur, illa vero nū laborēt, aut suspē-
 dātur, aut intorqueātur, aut satietate
 grauentur, an latus doleat, an simul

DE RA. VIC. IN MOR. AC.

cum dolore, tussis, aut tormina, vel
ventris dolor infestet. Quod si horū
quidpiam acciderit, potissimum in
præcordiis, alius soluēda clysteribus
est, & aqua mulsa eaq; cocta calidāq;
potui detur. Præterea dicere oportet,
an exurgentem animus deficiat, an
spiritus facile feratur. Ad hæc alui
quoq; sedimina inspicere, an nigra
admodum colore infecta sint, an syn
cera sint, qualia scilicet sanus deice
re consueuerat. an febris tertio quoq;
die magis irritetur, qppe in his mor
bis accuratæ considerandæ sunt hu
iusmodi tertianæ afflictiones. Quin
etiam alia quædam aspicere oportet.
Nam si dies quartus, in aliquo iā di
etorum, tertio fuerit similis, scire licet
infirmū in periculo versari. Sunt præ
terea alia signa, vt nigra excremēta,
quæ mortem: si vero per omnes dies
qualia in sanitate deiciebātur, appa
reant, bonā valetudinem denūciant.
Si dum glans supponitur aluus non
obedit, sed spiritus facile fertur: si
agrū, siue erectus in sede, siue in ipso
quoque cubili iaceat, animus deficit

hæc siue mari siue foemine acciderint
 futurum delirium expectato. Manus
 etiam considerandæ sunt, quæ si tre- 53
 munt, sanguis ex naribus fluxurus est.
 Deinde nares quoque aspiciantur. nam
 si æqualiter per utraq; multus spiri- 54
 tus trahitur, neruorum fere distentio
 superuenire solet. Id ubi acciderit, in
 propinquo mortem esse testatur, quæ
 prædixisse perpulchrū fuerit. Si hye- 55
 mali febricula laboranti, lingua sca-
 bra sit, animusque deficit, quamquam
 quietior febris videtur, nihilominus
 tamen imperari debet inedia, ab
 aqua quoque, & aqua mulsa, atque
 cremore arcendus est. febribus enim
 quibus hæc accedunt signa, haud
 quaquam fidendum est, utpote æ
 quibus mortis periculum pendet.
 His igitur accurata perpensio con-
 sideratis, in hunc modum (si pla-
 cet) prælagire poteris. Quum vero 56
 terrificum quidpiam febribus super-
 uenerit, fuerintque ipsæ quintanæ,
 & alius de repente liquida quædam
 excernit, acceditque animi defectio,
 & taciturnitas, & neruorum distentio,

DE RA. VIC. IN MOR. VC.

& singultus, ab his angor euenire so-
let, ac sudor circa mustacem, frōtem,
& ceruicem ab occipitio. Qui sic affe-
cti sunt, paulo post inflati moriētur.
57 Quibus per febres circa crura orta tu-
bercula, tractu temporis nō maturā-
tur, perdurante etiamnum febre, si
faucibus iam pridem extenuatis sus-
focatio accesserit, neq; extincta fuerit
tubercula, iis solet sanguis ē naribus
fluere: qui si plurimus eruperit, mor-
bum soluit: si vero non ita multus, lō-
gum fore morbum significat: & quo-
minus fluxerit eo peior, & diuturnior
erit ægritudo. Vbi vero cætera quidē
securissima fuerint, pedū dolores ex-
pectandi sunt. Pede itaq; sic affecto, si
assidue dolens inflammetur neq; leue-
tur dolor, paulo post ad ceruicem, iu-
gulum, humerum, pectus, articulum
(nam & in hoc tubercula expectari
debent) dolores peruenient. Quibus
extinctis, si manus vlcerantur, aut tre-
munt, neruorum distentio & deli-
rium superuenit, in superciliis pustu-
læ, ruboresq; nascuntur, gena altera
ad alteram ex latere germinat, dura

inflammatio infestat. oculus vehemē
ter tumet, delirium valde intenditur.
Atqui delirii signa, noctu magis, q̄
interdiu notantur. Atq; huiusmodi
signorū plura, diebus imparibus ma
gis q̄ paribus deprehenduntur, quāq;
vtrolibet eueniant nuro, pernicioſa
censenda sunt. Hos si à principio me
dicamentis purgare decreueris, ante
diem quintam id facere oportet, si vi
delicet murmurauerint intestina, nul
lo vero percepto murmure, à medi
camentis abstinendum est. Quòd si
murmurante ventre, excremēta quo
q; fuerint biliosa, exhibito scamonia
modice purga. deinde (quod ad reli
quam curationem pertinet) potiōes,
sorbitionesq; exiguæ offerendæ sunt,
quo melius valeat infirmus, nisi for
tasse diem decimumquartum excessse
rit. Quum febricitans aliquis, die de
cimoquarto obmutuerit, is non solet
celeriter aut solui aut à morbo libera
ri. quum vero eadem die apparuerit,
longius procedit. Si febricitanti quar
to die lingua conturbata quēdam dis
ferit, & alius excernit biliosa, & liqui

58

59

60

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- 61 da, is sere delirabit. Sed accurata obseruatione consideranda sunt ea quæ accidunt tum æstate, tum autumnò, idque in morbis acutis. Nam si sanguis subito destillauerit, robur, & venarum inflammationem declarat, & quòd postero die vrina tenues apparebunt, quòd si tum vigeat ætas, fueritque corpus ob exercitationes bene corporatum, aut melancholicum, aut manus ob potationem tremulæ, haud absurdum fuerit, aut delirium, aut neruorum distentionem præfagire. Id vero salubrius est si paribus eueniat diebus, quippe in decretoriis perniciosum est, nisi multus sanguis confertim aut per nares, aut per anum effusus, exuperantem plenitudinem finiat, aut abscessum, vel dolores, præcordiorum, testiculorum, aut crurum inducat. Quibus solutis, redduntur sputa fluuntque vrinae crassæ, leues, candidæ. Si febrienti singultus accidit, laser, daucum tritum ex aceto mulso potui detur, item galbanum ex melle, & cuminum in eligmate. mox ab iis ptisanæ cremorem sorbeat.

quāquam nulla salus per huiusmodi
affectum speranda est, nisi vel sudor
res decretorii, aut somni æquales su-
peruenerint, aut vrinæ crassæ, acresq;
effluxerint, aut apparuerit abscessus.

Ex cocalo, id est, fructu pini, & myr-
rha eligma eis exhibendum est, sed
aceti mulsi perquam exiguum. quòd
si admodum siti crucientur, aquam
hordei bibant.

64

65

DE PERIPNEVMONICIS

& pleuriticis.

IN peripneumonia & pleuritide
q̃ acuta sit febris, considerādum
est. item ambò ne latera, an vnū
duntaxat dolor infestet, an ægre spi-
ritus reddatur, an tussis cruciet, an
sputum educatur, sitque vel rufum
vel liuidum, vel tenue & spumofum
& floridum, aut si alias quasdam dif-
ferentias præter iam declaratas ha-
buerit, eas sic diducere oportet. Si do-
lor ad superiores partes extenditur
vt iugulum mammillam, brachium,
internam brachii venā secare oportet, ab eo videlicet latere qđ dolore

66

67

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- fuerit affectum, & pro corporis habi-
tu, & anni tempore, & ætate, & colo-
re, sanguinem detrahare, utq; copio-
sior sit purgatio, si dolor fuerit acu-
tus, ad animi defectionem ducere. Po-
stea clysterem exhibere. si vero sub
69 pectore pleuriticum dolor vehemen-
ter cruciat, venter purgandus est. atq;
inter purgandum quidem nihil, à pur-
gatione vero acetū mulsum dare con-
uenit. Porro die quarto purgandum:
sed tribus ab initio diebus clysteres
exhibere, quibus si dolor leuatus non
70 est, tum demū purgare oportet. Cau-
te tamē obseruandum est dum febris
soluatur. septimusque dies prætereat.
deinde si ager in tuto eē videtur, tum
exiguum, tenuemq; cremorem, eūq;
melle conditum in primis exhibere.
deinde si facile reducitur, & bene spi-
rat, & latera dolore vacant, paulatim
crassiore m, ac liberalius (nempe eadē
71 die bis) dare non erit alienum. ¶ Si
vero non facile liberari posse videa-
tur, tum minore portione, exigua for-
bitione, & cremore tenui vtatur, idq;
semel dūtaxat, ea videlicet hora qua
melius

melius degit: hanc vero ex vrinis deprehendes. Sorbitio enim in huiusmodi morbis exhibenda non est, donec & vrinæ, & sputa maturescere videantur. Si medicamento quis purgatus creberrime deicit, eum parcius, ac magis tenuiter alere oportet. is enim, obstante vacuatione, neque dormire, neque concoquere, ac neque iudicationem sustinere potest, sed postquā cruditas colliquata fuerit, & quæ restiterunt abiecta, tum nihil prohibebit pleniorē ei cibum exhibere. At vero scire licet sputum tum esse maturum, quum puri simile videtur: vrina vero quum id quod residet, sicut etiam subrubrum est. Ceterum nihil prohibet ad alios quoque laterum dolores, tepida fomenta, & ceromata adhibere, atque crura, & lumbos, calido vnguento vngere, & pinguedinem illinere: præcordiis vero ad māmillas usque ex lini semine cataplasma imponere. Quū ad vigorem iam peruenit peripneumonia, nisi expurgetur, in nullo auxilio sperandū est, quidpe quod mala est, præ-

DE RAT. VIC. IN MOR. AC.

tertium si difficulter spirat æger, fuerintq; vrinæ tenues & acres, atq; sudores in capite, ceruicæq; oriantur. Eiusmodi enim sudores mali sunt, ob violentiam morbi estum, impetum, ac violentiam, nisi vrina multa, & crassa eruperit, & sputa matura procedât. vtrumlibet enim si sua sponte supuerit, soluendi morbi vim obtinet.

ELIGMA AD PERIPNEUMONIAM.

- 73 **C** Albanum & coccalus, id est picnearum nucleus, ex melle attico. Abrotonum ex aceto mulso. Item pleuritico piper, veratrum nigrum coquito, & in principio quum infestat iam dolor dato. Prodest etiam panace ex aceto mulso cocta, deinde percolata, & potui data. Similiter & hepaticis & renum doloribus, ac vbi alius citanda est, aut vrina, ex vino
- 74 & melle. Quæ vbi ad ventrem exhibentur, magna ipsorum quantitas ex aqua multa diluta in potu sumatur, Sic etiam sedabis dysenteriam, ab

scellum, aliosque quosdam tumores,
nisi vel in febres vel sudores (apparē-
tibus vrinis crassis, albis, dilutis) vel
in tertianas vel varices transierit, aut
in testiculos, aut crura, aut coxam,
dolor tanq̃ ad firmam stabilemque
sedem permutetur. Si ante septimū
diem febricitanti superueniat mor-
bus regius simul cum horrore, solui-
tur febris. si vero sine horrore, atque
extra occasiones siue extra tempora
acciderit, perniciem denunciat. Lum-
borum rigores, ac ob atram bilem
factæ spirituum interceptiones detra-
cto sanguine solvuntur. Sed quum
per tendines vehementer in antero-
rem partem retrahuntur, ac ceruix,
& facies sudauerit, vtpote vellicatis,
aridisque ob laborem tēdinibus, cau-
dæque vinculis, quæ videlicet crassio-
ra quum sint, spinam continent, vbi
maxima vincula exorta, ad pedes
vsque tendunt, ibique finiuntur. Qui
sic afficitur, si neq̃ febris neq̃ som-
nus superuenerit, sed sequatur vrina
coctionem significans, atque sudores
decretorii, is vinū creticum vinosum

75

76

77

DE RAT. VIC. IN MOR. ACV.

epotet, edat polentam coctam, cera-
to vngatur illinaturq; , crura in sca-
pha, prius calida aqua perfusa, ad pe-
des vsque inuoluat. item brachia vs-
que ad digitos. Spinam etiam & lum-
bos á ceruice incipiendo ad coxas,
mollem pellem salua subigens, vt
exteriores quoque partes contine-
at. Relictis deinde fomentis, vter
aqua calida plenus ac lintheo tectus
adhibeatur. Alius non admodum
soluenda est. satis enim fuerit glan-
dem supponere, vbi scilicet iam pri-
us fuerit astricta. Quòd si nihil in-
melius proficere videatur $\tau\alpha\mu\omicron\lambda\alpha$
modi radicem tritem ex vino odora-
to, & daucum, mane ieiuno, ante fo-
menta, potui dato, idque celeriter de-
inde polentam coctam, tepidam, li-
beraliter comedat, bibatque vinum
temperatum quum voluerit, atq; sic
78 fortasse melius valebit. Sin minus,
ad presagium refugere oportet. Mor-
bi soluentur, aut per os, aut aluum,
aut vesicam, aut aliquã aliam huius-
79 modi particulam. Sudoris vero spe-
cies omnibus communis est. Veratro

80
22
purgare oportet eos, quibus a capite
destillatio fertur. Quibus vero vel ab
scessus, vel venę ruptura, vel intempe
rantia, vel alia aliqua vehemens cau
sa, suppurationem fecit iis veratrum
haud quaquam dandum est, quippe
quod tum nihil pręsidii affert. etenim
si ob aliam forte causam, æger quid
piam passurus est, id omnino ad ve
ratrum referetur. Si vero corpus resol
uitur, aut caput dolet, aut obstructę
sunt aures, aut nares, aut sputum nō
redditur, aut genua grauitate infestā
tur, aut corpus pręter consuetudinē
intumescit: quicquid eiusmodi accide
rit, siue ob potationē, venerem, mœ
rorem, curas, siue vigilias: quodcūq;
horum causę rationem habuerit, ad
ipsum curationem dirigere oportet.
Dolores qui ab itinere proueniūt, vel 81
ī lateribus, aut dorso, aut lumbis, aut
coxis, ac si aliquis inter spirandū do
let, aliqua habita occasione (nam sæ
penuero lumboꝝ, coxarumq; dolo
res ex crapula, & cibis instantibus, p
uenire solent) itaq; qui huiusmodi ac
cidentibus afficiuntur, vrinā difficul

DE RA.VIC.IN MOR.AC.V.

81 ter reddunt. Horum omnium causa
est iter, ac præterea destillationum
quoq; & raucedinis. Sed quæ ob vi-
ctus rationem eueniunt, horum mul-
ta vnusquisque, vt in victu à consue-
tutine maxime aberrauit, ita aper-
tissime declarabit. Etenim qui pran-
dere non consueuerunt, si pransi fue-
rint, venter eorum intumescit, som-
nolenti redduntur & pleni. Quod si
præterea cœnauerint, venter ipsi tur-
babitur. quibus vtile fuerit à balneo
dormire, expergefæctis vero circui-
tione lenta illa quidem, sed crebra, in
ambulare, deinde deiectis a lui one-
ribus, paulum vini meraci assumere.
Si vero alius non fuerit soluta, cali-
do vnguento corpus vngere debent.
mox vinum dilutum, album, aut dul-
ce (si sitiant) bibere, atque sic conquie-
scere. Reliqua vero victus ratio haud
secus, q̃ vbi crapula aliquem læsit, in-
stituenda est. Potiones, dilutæ quidẽ,
tarde permeant, circūducuntur, & su-
pernatant in præcordiis, nec vrinam
mouent. Qui huiusmodi potione ple-
nus est, nullum opus, quod videlicet

eliquato iam corpore, aut vi, aut ce-
 leritate aggrediendum sit celeriter p-
 ficere valet. Itaq; à cibo donec cum co-
 ctus fuerit quiescere oportet. Mera-
 ciores vero, austerioresque potiones,
 corpori cremorem, & capiti pulsatio-
 nem inducunt. Proinde si affectus su-
 per dormire debet, & calidū aliquod
 iusculum quod q̄ iucundissimum ei
 videatur sorbere. vix enim citra no-
 xam tolerat ieiunium is quem capi-
 tis dolor & crapula īfestat. Qui vero
 semel dūtaxat comedūt, ii imbecilli
 sunt & calidam emittunt vrinam, vt
 pote præter consuetudinem exinanī-
 ti, os ipsis falsum redditur, & amarū,
 & in quo vis opere contremiscunt,
 tempora tēduntur, coenam cōcoque-
 re non p̄inde possunt, ac si pransi fuif-
 sent, quocirca minus quā consueue-
 runt, bibere debent. Et liquidiorē
 mazā, panis loco assumere. ac ex ole-
 ribus rumicem aut maluam aut be-
 tam, item ptisanam. Atque dum ci-
 bantur, vinum modicum bibere, idq;
 dilutius, à coena parum ambulare do-
 nec vrina defluat & mingant. Neque

n iiii.

DE RA. VIC. IN MOR. ACV.

- 83 inutiles sunt eis pisces elixi. Caterum
84 ex cibis hi maxime notantur vt insi-
gnes. Allium flatum efficit, pectus cal-
facit, caput grauat, fastidium parit,
dolorem qui antea infestare consue-
uit, irritat, vrinā ciet. atq; hæc est eius
utilitas, sed tum maxime conducit,
vbi quis vel potationi, vel ebrietati in-
85 dulgere proposuerit. Caseus, flatum
inducit & angustiam, cibos accendit,
cruditatem parit, & coctioni resistit.
his vero qui potu se repleuerunt, non
86 alius cibus nocentior est. Legumina,
& cruda & cocta & fricta, & macera-
ta, & viridia, omnia flatum excitant,
quam ob rem (nisi cū aliis cibis) ipsis
vtendum non est. Præterea singule spe-
87 cies sua habent vitia. Cicer siue crudū
siue frictum, flatum laboremq; parit.
88 Lens, non detracto cortice, astringit,
89 tumultumq; efficit. Lupinum vero ab
90 horum viciis vel minimis, quā ma-
xime abest. Laserpitii tum caulis, tum
succus, vt quibusdam maxime, ita in-
91 expertis minime alium ducit. nomi-
92 natur vero arida cholera. Id vero po-
93 tissimum accidit, vbi cum multo ca-

feo, aut bubularum carniū edulio
 miscentur. Quippe bubulæ carnes at
 trabilarios excitant morbos. supera-
 ri enim natura nō potest, sed ventrē
 non mediocriter ledere natæ sunt, vt
 pote coctū difficiles. quāquam facilli
 me descēdunt, si coctis ipsis, vetustisq;
 quis vtatur. Caprinæ carnes magis cō
 ducere viderētur, nisi oīa bubularum
 carniū vicia haberēt. Nā & coctū dif-
 ficiles sunt, & flatum magis suscitant
 & ructum bilemq; pariunt. Igitur vt
 odoratissimæ & solidæ & suauissimæ
 saluberrimæ sunt, siue coctæ, siue fri-
 gidæ, ita iniucundæ odore graues, &
 duræ pessimæ sunt. Nec secus de re-
 centibus dicendum est. Præterea vt
 per æstatem optimæ sunt, ita per au-
 tumnum, vt pessimæ damnantur. Por-
 cinæ carnes, siue subcrudæ, siue am-
 bustæ sunt, malæ sunt. Nam & bilem
 pariunt, & turbationē. Suillis, nullæ
 aliæ carnes meliores sunt, idque si nō
 admodum pingues, neque etiam per-
 tennes sint, ac neq; veteris victime æta-
 tem sint assequutæ. At vero reiecta
 pelle, & subfrigide edēde sunt. Arida

94

95

96

97

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- cholera ventrem inflat, strepitum & dolorem, tum laterum, tum lumborum excitat. alius nihil deiecit, sed
- 98 astringitur. Eum qui sic affectus est obseruare oportet ne vomat, sed alius ducenda est. Proinde ex aqua calida, caq; quàm pingui clysterem adhibe: mox perunctum in aquam calidam demitte, ita vt decumbere possit, ac paulatim calida aqua perfunde. Si enim sic calfacto alius subducitur,
- 99 haud dubie soluitur morbus. Hunc somnus quoq; iuuat, ac bibere vinum
- 100 tenue vetus, idque meracius. Dabis etiam oleum, vt & quiescat, & alius subducatur, atq; soluatur affectus. à
- 101 reliquis vero cibis arceatur. Quòd si dolor nō remittitur, lac asinæ, donec purgetur, potui dandum est. Soluta aluo, si bilis deiciatur, & tormina, vomitiones, suffocationesq; infestāt,
- 102 quiescere oportet mox aquam mulsam bibere & vomere.
- 103

DE AQUA INTER CUTEM.

- 104 **A** Quæ inter cutem duo sunt genera, vnū subcarnosum: id homi

nem, quū aggreditur, ineuitabile est. Altez ex flatibus constat, quod multa, eaq; bona fortuna indiget maxime vero erumnis fomentis, temperātiaq; curatur. Igitur sic affecto aridos, acresque cibos exhibere oportet, ita enim citissime reddet vrinam, & perquam fortis efficietur. Quod si spiritus quoq; difficulter redditur, idque verno tempore, & in ætate vigoris, fuerintq; vires valdæ, ex brachio sanguinem detrahere, mox calidos panes, ex vino nigro ac oleo submersos edere, atq; vt potionem maxime minuere, ita plurimum exercitari conuenit. Carnes vero suillas easque crassas ex aceto coctas edere vt arduas in ambulationes tolerare valeat. Qui venterem inferiorem calidum habent, atque excrementa acria & inequalia deiciunt, ii ob eliquationem sic afficiuntur. quod si valeant vires, albo veratro diuertenda sunt: sin minus, frumentacei tritici cremor crassus, frigidusque, & lenticula, & faba, & panes subcinericii, & pisces exhibendi sunt. febricitanti quidem elixi non febrili

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.

- citanti vero, assi. atq; huic vinum nigrum, illi vero aquam aut à mespilis, aut myrtis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut labruscæ flore dare oportet. ¶ Si vero non febricitantē tormina cruciant, in primis quidem
- 106** paulum lactis bubuli calidi dandum est, deinde augenda eius quātitas est. Item lini semen & triticea polenta. Ægyptia quoq; faba decorticata, madidaq; , amara parte abiecta , potui detur. Edat vero oua assa semiconcreta, similā, milium, chondrū ex lacte coctum. Hæc, facta prius decoctione refrigerentur, ac sic deinde comedantur. Quod si aliæ quædā vel escæ vel potiones iis similētur, ipsæ quoq; exhibeantur. Id vero maxime pertinet
- 107** ad victus rationem, vt obserues caueasq; , tum in acutis tum diuturnis ægritudinibus, accessiones, inclinationesq; febrium, vt quo tempore cibus exhibendus sit deprehēdas. item quando plurimum ab impetus vehementia abesse videntur. Ac consyde
- 108** rare quoq; oportet capitis dolores, aut ab exercitatione, aut cursu, aut

itinere, aut venatu, aut alia quadam
 intempestiua ambulatione, aut ve-
 nere proueniētes. item decoloratos,
 raucos, splenicos, exangues, suspirio-
 sos, sicca tussi laborantes, sitientes, fla-
 tuosos, venarum clausuras, intenta
 prae cordia, dorsum & latera, itē tor-
 pētes, obscure videntes, aurium tin-
 nitu vexatos, vrinam non continen-
 tes, regio morbo affectos, cruda per
 aluum deicientes, sanguinem ē na-
 ribus, aut sede profundentes, & infla-
 tos, & quos fatigatio vehemēter in-
 festat. Eos itaq; (si dictas affectiones
 vincere nequeunt) haudquaquā me-
 dicamento purgabis. nam & pericu-
 lo agrum expones, & nihil iuueris,
 & spontaneas etiam iudicationes, li-
 berationesq; īpedies. ¶ Si sanguinis
 detractio cuiuspiam conducere videat, 109
 tur, alius in primis astringenda est,
 postea vero sanguis mittendus est. fa-
 mem quoq; instituire & vinū aufer-
 re oportet. deinde decēti vicius ratio-
 ne, & fomētis, & persusionibus reli-
 quā curationē pfice. Si vero astricta 110
 fuerit alius, mollē adhibe clysterem.

DE RAT.VIC.IN MOR.AC.V.

- 111 **¶** Quòd si medicamento opus esse animaduuerteris, exhibito veratro, per superiores partes tuto expurga, sed per inferiores horum neminem.
- 112 Ac mirifice prodest, vrinam ciere, sudores excitare, in ambulare, leniter perfricare, ne videlicet habitum redas densiorem, id quod alii, ipso pronò in cubili iacente, facere debent.
- 113 Si supra septum transuersum pectus afficiatur, æger, vt magna ex parte sedere, ita nequaquam decubere debet, vt (quoad vires permiscerint) sedens calido fomento perfricetur. At inum ventrem sub septo trāsuerſo, infestante dolore infirmus neq; moueatur, neq; fricetur, sed quietus iacere debet.
- 114 **¶** Quæ ab imo ventre per vrinas, sudoresq; resoluuntur, si per se modice labuntur: debiles quidem affectus discutiunt, vehementes autē nō tā facile. quippe qui ita laborant, aut pereunt, aut sine malis alijs sanari non possunt. nam confirmari solent eiusmodi affectus,

AD AQVAM INTER CVTEM.

CAntarides tres, abiectis pedibus, & capite, teruntur in aquæ cyatis tribus, atque ieiuno potui dantur. Quôd si dolor potantem affecerit, calido fomento perfudatur. deinde vinctus panem edat ex oleo.

SANGVINEM
SVPPRIMEN-
TIA.

FIci succum lana susceptum, in- 115
tus ad venam adhibe. aut inuoluto coagulo nares obstrue. aut chalcitim adhibens, digito comprime extrinsecus compressis vtrinque cartilaginibus, aut ventrē cocto asinino lacte solue. Item derafo capiti refrigerantia impone, si videlicet calido id tempore contingat. Sesamoides sesquidrachmæ pondere tritum, ex aceto mulso potui datum, per superiores partes expurgat. Admiscetur quoque veratris: vt tertiā faciat portionis partē, atque sic minus suffocat.

FINIS.

MEDICINALIS. 105

GALENI ARS ME-

DICINALIS, INTER,

prete Nicolao Leonicensio.



Res sunt oēs doctrinae quae ordini inherēt. Prima quidē ex notionē finis, quae per resolutionē fit. Secūda ex cōpositiōe cōstat eorum quae ex resolutione fuerit inuēta. Tertia ex diffinitionis dissolutiōe, cui nūc incubimus. Licet autē huiusmodi doctrinā appellare, nō tām diffinitionis dissolutiōne, sed & explicationē ut nōnulli, vocarunt, vel resolutionē, vel diuisionē, vel (ut nōnulli alii) explanationē, vel expositionē, ut alii. Conati sunt & Herophiliorū quidā talē facere doctrinā, quēadmodū Heraclides Erythricus. Conati sunt & eā quae per cōpositionē, & ipsi Herophilii, & quidē Erasiparticulati, & i pluribus cōstrati sectatores, & Athenaeus Ataleus Neminē tām ante nos ea quae oritur à notionē finis feri-

o

A R S

plisse comperimus, ex qua oēs artes
via quadam, atq; ordine constituuntur: sed illam quidem alio pertracta-
uimus loco. Hic vero diffinitiuā fa-
ciemus doctrinā quæ quantū ab ea
quæ ex resolutione cōsistit, & dignita-
te, & ipso docendi ordine linquitur,
tantū & ad totius compendium, &
ad singulorum memoriam præstare
inuenietur. Sufficiēter enim facillime
memoriæ cōmendātur ex diffinitio-
nis dissolutione vniuersa. Quoniam
totius artis capita in se optima diffi-
nitio cōplectitur, quā quidam substā-
tialem vocant, ex aduerso distinguē-
tes alius, quæ notionales appellantur.
Illæ siquidem ab his quæ accidunt re-
bus diffinitis, hæ vero ab ipsa essen-
tia constituuntur. Elaborata autē est
à nobis particulatim & in pluribus
conscripta tractatibus totius medici-
næ cōtēplatio, quibus vti quis possit
ad triplicē doctrinā. Nūc vero diffini-
tiuā aggrediemur, hoc vnū præfati,
quod solū capita, & quæcūq; veluti cō-
clusiones eorum, quæ alibi latius sunt
demonstrata, nunc à nobis dicentur.

Quid est medicina. Cap. ii.

Medicina est sciētia salubrium,
& insalubrium, & neutrorum.
nihil vero differt & si qs agro-
rum dixerit. Nomē vero scientiæ cō-
munius, nō autem propriæ accipere
oportet. Salubre autē, & insalubre,
& neutrum, vnūquodq; tripliciter di-
citur. hoc quidē vt corpus, hoc autem
vt causa, hoc vero vt signum. Etenim
corpus, qđ sanitatē natura suscipere
aptū est, & causam, quæ eandē effice-
re, vel cōseruare, & signum, quod po-
test indicare: hæc omnia Græci salu-
bria appellare consueuerunt. Eadem
ratione & susceptiua morborū cor-
pora, & eisdem efficientes, cōseruā-
tesq; causas, & signa indicantia, insa-
lubria vocāt. Nec aliter corpora neu-
tra, causas signa ve dixerunt. Et secū-
dum primam quidem rationem, at-
que præcipuam causarum salubrium
est medicina scientia. propter eas au-
tem, & aliarum secundo quidem lo-
co insalubrium, & tertio neutrarū.
Et post has eodem modo corporū,
primo quidem, & hic salubrium,

A R S

secundo loco infalubriū, tertio neu-
trorum. Itidem de signis dicendum.
In actionibus autem, prima quidem
est corporum cognitio quæ habetur
ex signis: post hac earum quę in ipsis
inuentio causarum.

E Quot modis dicitur ef-
fectiuum, indicati-
uum & susce-
ptiuum.

Cap. iii.

Sed quoniam & effectiuum, & in-
dicatiuum, & susceptiuum dupli-
citer vnumquodque dicitur, hoc
quidem simpliciter, hoc vero vt nūc,
nosse oportet amborum esse medi-
cinę scientiam. Ipsum vero simplici-
ter duobus dicitur modis, & quod
semper & quod plurimum: de quo-
rum vtroq; medicina pertractat. Neu-
tra vero & causa, & corpus, & signū,
& quod simpliciter dicitur & quod
vt nunc, tripliciter vnumquodque ap-
pellatur: hoc quidem quia nutrius cō-
trariorū est particeps, hoc vero quia
vtriusque, hoc vero quia aliquando

huius, aliquando illius. Horum autē
 ipsorum secundum, rursus duobus di-
 citur modis, aut quia vtrunq; cōtra-
 riorum ex æquo participat, aut quia
 aliquādo plus alterum. est vero & in
 tota diffinitioe, si verba animaduer-
 timus, ambiguitas quēdam, quam &
 ipsam dissolvere oportet. Cum enim
 dicitur medicinam esse scientiam &
 salubrium, & insalubrium, & neutro-
 rum, significatur & q̄ omnium par-
 ticularium, & q̄ quorundā, & qualiū.
 Sed omnium quidem infinitū quod-
 dam est, atq; impossibile, quorundā
 diminutum, atque artificio carens.
 qualium vero artificiosum pariter,
 atque sufficiens ad omnia artis par-
 ticularia, quod etiam dicimus in me-
 dicinæ diffinitione comprehendī. Pri-
 mum igitur de corporibus dicere ag-
 grediemur, qualia nam sint, & salu-
 bria, & insalubria, & neutra post hęc
 de signis, & causis differemus.

De corpore salubri.

Cap. iiii.

Salubre simpliciter corpus ē quod
 ab ipso naturæ ortu bonā habet

o iiii

temperaturam in simplicibus, & pri-
mis particulis, atque in his quæ ex il-
lis componuntur instrumentis, est cō-
moderatum. Salubre vero nunc, est
corpus quod in præsentī est sanū. Est
vero & hoc eo tempore quo sanum
existit, bonam habens temperaturā,
& commodationem, non tamen
optimam, at sibi propriam. Ipsius ve-
ro salubris simpliciter corporis, tale
quidem est semper id quod est opti-
ma temperantia præditum, ac maxi-
me est commodatum. Vt multum
autem quod à constitutione optima
non valde admodum deficit.

De corpore insalubri. Cap. v.
Insalubre vero simpliciter est cor-
pus quod ab ipso ortu nature, vel
in consimilibus partibus malam
habet temperaturā, vel in instrumen-
tariis incommodationem, vel utrū-
que vitium. Insalubre vero nūc est cor-
pus quod eo tempore, quo tale dici-
tur, agrotat. neque obscurum est, qd
& hoc ipsum, eo quo dicitur tempo-
re agrotans, vel in consimilibus ma-

lam habet temperaturam, vel in instrumentariis incommodationem, vel utrunq. Est vero & semper insalubre, quod ex ipso naturæ ortu vel pessimam habet temperaturā in simplicibus, & primis particulis omnibus, vel aliquibus, vel his quæ obtinent principatum, vel in instrumentariis, incommodatum existit. Similiter autem in his, vel omnibus, vel aliquibus, vel illis quæ obtinent principatum. Ut multum vero insalubre est corpus quod ab huius quidem vicio recedit, nondum tamen mediocritatem attingit.

De corpore neutro. Cap. vi.

Quoniam vero & neutrū corpus tripliciter dicebatur, vñ quidem quod neutrius erat extremæ dispositionis particeps, aliud autē quoniam vtriusq., aliud quoniam aliquando huius, aliquando vero illius. Iuxta primum significatum neutrum erit corpus, quod exquisitè medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi corporis: & huius hoc quidem simpliciter tale, quod ab ipso

o. iiii

201 211 A R S 111
ortu naturæ ita est constitutum, hoc
vero ut nunc, quod in præsentem tem-
pore mediū exquisitè existit saluber-
rimi, atque insaluberrimi corporis.
Ipsius autem simpliciter, semper qui-
dem tale est id, quod in omnibus æta-
tibus tale perdurat. Ut multum autē
quod nonnullas recipit muta tiones.
Iuxta vero secundum significatū neu-
trum erit corpus quod ab ipso ortu
naturæ contrariarum simul est parti-
ceps dispositionū, aut scilicet in vna
parte, aut in duabus differentibus. in
vna quidem si secundum alteram op-
positionem effectiuarum qualitatum
bonam habuerit temperaturam, vel
etiam secundum vtranq; , sed in for-
matione, & magnitudine, & nume-
ro partium, vel situ delinquat, aut cō-
trā in his quidem recte se habeat, vel
omnibus, vel quibusdam. peccet autē
intemperatura, in differentibus ve-
ro partibus, & iuxta omnes opposi-
tiones potest quidq; simul particeps
esse contrariorum. Et semper quidem
tale quod per omnes ætates in eodē
habitu perseverat. Ut multum vero

quod aliqua ex parte euariet. Ita vero & nunc neutrum erit corpus iuxta secundum significatum, quia vel parte in vna hæc quidē ipsi salubria existunt. illa vero insalubria, vel in differentibus ita afficitur partibus. Iuxta vero tertium significatum neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando vero insalubre, existit, vt nonnullis accidit, qui in pueritia salubritate corporis vigent, quum vero ad iuuentutē peruenerint, insalubres euadūt, aut contrā. In vno autē tēpore quod ita est neutrum consistere nequit: latius vero si accipiatur, contingit. Nouimus autem quod nūc, dupliciter dicitur. Salubre igitur, & insalubre, & neutrum corpus quot modis dicatur, & quale vnūquodq; sit, sufficienter explicauimus. De signis vero deinceps dicendum.

De signis salubribus. Cap. vii.

Sunt autē & ex his salubria quidem quæcunq; præsentem indicant sanitatem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiiciunt: insalubria vero quæ & præ

sentem indicant agitudinem, & futuram prænunciant, atq; præteritam memorię subiiciunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ subiiciūt, & quæ nihil omnino de dispositionibus indicant, vel nihilo magis salubrem, q̃ insalubrem dispositionem ostendunt, & partim quidem salubrem, partim vero insalubrem indicant dispositionē, & quæ aliquando quidem salubrem, aliquādo vero insalubrem, & hæc quoque secundum tria tempora, veluti salubria, & insalubria appellantur. Vocantur autem nōnunquā à vetustioribus medicis hæc omnia signa prænunciatiua, quāuis præsentium, ac præteritorum indicatiua. Vſus vero nō parvus ex prænunciatiuis, atque indicatiuis: minor autem ex his quæ memoriæ subiiciūt. Cum vero sint salubria corpora, hæc quidem simpliciter, hæc vero vt nunc, quæ & bene valentia dicuntur, salubrium simpliciter corporum duplicem diximus esse differentiam: quoniam nōnulla quidem sem

MEDICINALIS. 110

per, nonnulla vero vt multum essent talia. & semper quidem quæ optimā constitutionem sortita sunt, vt multum vero, quæ non magnopere ab illa recedunt.

De signis optimæ constitutionis.

Cap. viii.

HOrum autem dignotiones sumēdæ sunt ab his, quæ secundum essentia rationem ipsis insunt, & ab his quæ ex necessitate consequuntur operationibus, casibusq; qui proprie accidentia vocantur. Ab essentia quidem ipsa eorum quæ optimā habent constitutionem, commoderatione consimilium quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate & siccitate. Instrumentorum vero, in quantitate, ac numero eorum ex quibus componuntur, ac præterea formatione, situ partium singularum, ac totius instrumenti. Ex his vero quæ ex necessitate consequuntur consimilia, quantum quidem attinet ad tactum à mediocritate, quæ in mollitie, ac duritie consistit. Quatum vero ad aspectum, à colore optimo, & leuitatis, atq; hi

319
MEDICINAE
Spiditatis mediocritate. In operatio-
nibus, à perfectione, quā & ipsorum
virtutē appellamus. Ab his vero quæ
instrumentarias partes consequuntur,
à commodatione, & pulchritudine
omnium totius corporis instrumen-
torum: ac præterea earum quæ ipsis
insunt virtute operationū. Optimæ
igitur constitutionis corporum signa
indicatiua sunt hæc. Eorum autē quæ
ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen sa-
lubria existunt, nonnulla quidem in
consimilium temperatura vicium ali-
quod paruum, habent, nonnulla vero
in instrumentariorum cōmodatio-
ne, & hoc quoq; perexiguum. Accidit
autem hoc vel in omnibus, vel in ali-
quibus, aut in vtrisque. Viciorum vero
genera eadem sunt his quæ virtutem
perficiunt. Temperatura quidē in con-
similibus. Numerus autem, & forma-
tio, & magnitudo, & situs, in instru-
mentariis. Vtrisque vero cōmunis vni-
tas, quam & ipsorum continuitatem
appellamus. In his autē ipsis gene-
ribus sunt corporum insalubrium vi-
cia secundum vtrunq; insalubritatis

MEDICINALIS. III

modum. Terminus autem qui utrūque distinguit, est operationum læsio sensibilis. Quæ vero ab optima corporū constitutione breue aliquid deficiūt, re vera quidem & ipsa in aliquo sunt offensa, non tamen id sensu comprehenditur. Distinguuntur vero ex eo, quod magis minusve in operationibus existit, ac quia causis quæ ægritudinē pariunt, non æque resistunt. Quæ autem simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod facile à causis quæ morbos committendī vim habent, superantur, & quoniam in vigore operationum plurimū deficiunt. In medio autem amborum collocantur ea quæ neutra simpliciter appellatur, & cum latitudine quadam. Quo fit ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non parvam, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium. Post quæ deinceps sequuntur quæ iam ægrotāt corpora, quæ sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur. Quæ igitur

tur dolore infestantur, & quorū motus sunt viciosi aut omnino interierunt, manifestam habent determinationem. Quæ vero imbecilles ædunt operationes, in magnis quidē distantis facile discernuntur, in paruis vero ambigua sunt: atque idcirco in eo genere noxę collocatur, quę neutrius contrariorum participat dispositio, quā & ipsam neutram diximus appellari, ita tamen vt horum omnium sensus sit iudex, non ipsa natura rerum inspiciatur, ne periculū sit in dogma perpetuę passibilitatis incidere, & quidem signa sanorum corporū. Sed quæ insalubria, salubriāq; & neutra existunt quantitate distantia differēt duobus inuicem contrariis terminis a nobis statutis, optima videlicet cōstitutione corporis, & nuper facta ægritudine, ac deinceps consyderantibus vtri eorum vicinora sunt ea quæ ad examē corpora veniunt. Quæ cū proximiora sunt optimæ cōstitutioni, salubria: quæ vero ab hac longius distant, atq; ad ea quæ iam ægrotant magis accedunt, insalubria. quæ autē

intermedia, atq; æqualiter ab vtrifq;
distare videntur, neutra. Optime igitur
cōstitutionis corporis indicia ex-
plicauimus. Eorum vero quę ab ipsa
deficiunt, totidem sunt numero gene-
re, quę in magis, & minus secari pos-
sunt. Cum autem in tres latitudines
diuisa sint, corporis insalubris simpli-
citer indicia trademus. ex his enim
& reliquę duę latitudines innotescēt.
Generaliter igitur prius à nobis in eo
quem de optima cōstitutione sermo-
nem habuimus, specialiter autē nunc
dicetur, si prius partes diuiser imus.

Quot sunt differentiæ partium.

Cap. ix.

Sunt vero earum quatuor vniuer-
se differentię: quoniam nonnullę
earum principia existunt, aliquę
vero ab ipsis originem habēt, aliquę
nec aliarum gubernationi præsunt,
neque aliunde gubernātur quum in-
sitas habeant à natura potentias, à
quibus reguntur: quædam vero sunt
quę insitas simul, & aliunde emanati-
es habent. Principia igitur sunt, ce-

rebrum, cor, hepar, testiculi. Ab illis vero ortum habent, atq; eisdem subministrant, nerui quidem, & spinalis medulla cerebro: cordi vero arterie, hepatis, venę: ipsa vero seminaria vasa testiculis. Quę autem à se ipsis gubernantur, sunt, cartilago, os, copula seu ligamētum, membrana, adenes, adeps, caro simplex. Reliquę vero partes, cum vna cū istis habeant ex se ipsis regimen, arteriis, nervis, & venis insuper egerunt. Capillorum autem, atque vngulum neque regimen vllum est, sed generatio tantūmodo. Hę igitur sunt partiū differentię.

De signis cerebri.

Cap. x.

Indicia autem singularum temperaturę sumpto à cerebro initio, deinceps dicemus. Sunt vero quinque insita genera quę ipsius naturam ostendunt. Primum quidem totius capitis dispositio. Secundum vero sensibilia operationum virtus, & viciū. Et tertium actiuarū. Quartum earum quę tenent principatum. Et quintum naturalium. Aliud vero genus præter hæc omnia, ea quę extrinsecus

secus aduenit alteratio. Et quidem totius capitis dispositio ex magnitudine, & figura sumitur, atque capillis. De paruitate & magnitudine capitis. Cap. xi.

P Aruum igitur caput viciosa constitutionis cerebri proprium est indicium. Magnum vero non necessario indicat bonam cerebri compositionem. Sed si quidem ob insitæ virtutis robur, quæ multam, atque optimam materiam afformauerit, eueniat: optimum est signum. at si ob materiæ tantum multitudinem: haudquaquam bonum. Distinguenda vero sunt hæc, & ex figura ipsa & ex his quæ ab eo habent ortum. A figura quidem ipsa, si concinna. semper enim hoc bonum est signum. Ex his autem quæ ab eo ortum habet, si valida est ceruix, & si aliis ossibus optime cõstet, atque omnis præterea nervosa substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, veluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundā, ex cæra constructā, paulatim vtrinque

P

depressam. In hac enim necesse est,
vt posteriores, prioresue partes plus
gibbæ fiant, q̃ sphaeræ cōueniat. Quæ
vero vtrinque cōsistunt, magis rectæ.
Quòd si ea quæ secundū occiput emi-
nentia minuatur, simul intueri oportet
neruos, atque cervicem, vnà cum
ossibus aliis. Nam si secundum natu-
ram constiterint materiæ defectu, nō
virtutis imbecillitate contingit. Illis
vero non recte se habentibus, princi-
pium est debile, sed magna ex parte
defectus qui occipiti eueniunt conse-
quitur eorum quæ antediximus im-
becillitas, rarissimeque aliter euenire
consuevit. Caput etiam quod secun-
dum occiput in acutiem tendit, ani-
maduertere oportet, hisdem adhibi-
tis distinguēdi rationibus, quibus an-
tea in capite grandiori facto vteba-
mur. Vt plurimum vero, & hic opti-
mum est signum figura cōcinna eius
partis, quæ cerebro adhæret, quam
nonnulli medici posterius cerebrum
appellare consueuerunt, quemadmo-
dū & posterius existit ea sutura quæ
Græcæ litteræ σ formam habet præ-

finitam. Est vero huiusmodi pars spinalis medullæ principium, & eius ratione neruorum omnium qui actionibus obseruiunt. Ipsa autē pars posterior per seipsam paucos admodū sensitiuos obtinet neruos plurimos vero actiuos, sicuti & anterior, sensitiuos quidem plurimos, paucos admodum actiuos. Quare vbi bene fuerit affecta vtraque pars, robustas habebunt eas quæ ab ipsis. deriuationes. Exdem quoque distinctiones adhibendæ sunt ad partes capitis anteriores ad frontem attinentes, quæ etiam ad posteriores, earūdeque, & paruitatem, & magnitudinem inspicere oportet, atque itidē figuram, & sensus ibi collocatos, visum, gustum atque odoratum. Hæc enim se inuicem indicant, atque attestantur, & quæ à principiis oriuntur, principii virtutem, vel viciū, & principium eorū quæ ab ipso nascuntur.

De operationibus obtinentibus principium.

Cap. xii.

p ii

EArum autem operationum quæ
obtinent principatum, virtus, ac
viciū sunt ipsius principii seorsum
tantummodo indicia. Voco autem
operationes principatum obtinen-
tes, quæ à solo principio proueniūt.
Ingenium quidem igitur, subtilē cere-
bri substantiam indicat: tarditas ve-
ro intellectus crassam: discendi vero
facilitas, formarum facile suscepti-
uam: memoria autem, stabilē, ac fir-
mam: sicuti & discendi difficultas, for-
marum non facile susceptiuā: & ob-
liuio, fluidam. Mobilitas quoque in
opinionibus, calidam: stabilitas au-
tem frigidam. Adhuc autem duo in-
dicatorum genera mihi videor præ-
termisisse, de quibus sum ab initio me-
dicturum pollicitus, quorum alterū
ad operationes attinet naturales, al-
terum vero ad ea quæ extrinsecus oc-
cursant. Erit autem in vtrisque ser-
mo communis.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Cap. xiii.

Siquidem cerebrum sortiatur bo-
nam quatuor primarū qualitātū

temperaturam, omnia quæ diximus
 habebit moderata, & excrementa quæ
 vel per palatum, vel aures, vel nares,
 vel oculos expurgantur, hæc quoque
 modice se habebunt, atque ab his que
 extrinsecus occurrant minime læde-
 tur, quæ scilicet vel calefaciunt, vel fri-
 gefaciunt, vel humectant, vel exiccant.
 Talibus igitur capilli capitis: cū ad-
 huc sunt infantes subruffi, cum vero
 pueri, subflauī, cū iam adoleuerint fla-
 ui fiunt, mediiq; sunt inter eos qui om-
 nino sunt crispī, & simplices. nō tamē
 facile caluitium patiuntur. Quæ vero
 dicuntur ac posterius dicēda indicia
 sunt, accipere oportet, vt in bonam
 habentibus temperiem habitationi-
 bus. Quæ autem ad capillos attinēt,
 non ad locorum tantum, sed ad hu-
 morum quoq; temperaturā qui cere-
 bri tēperaturæ proportionē respon-
 dent, sunt referēda. Si vero calidius sit
 quā oporteat, in altera vero opposi-
 tione bonam habeat temperaturā,
 siquidē in caliditate excesserit, omnia
 quæ dicentur, validiora erūt indicia,
 sed si paruus fuerit excessus imbecil-

lia. Communis autem hæc ratio statuatur in omnibus partibus, quarum intemperaturis vniuersis indicia sumus tradituri.

Signa calidi cerebri. Cap. xiiii.

DEmceps igitur signa cerebri caliditatis, præter ea quæ nuper diximus, sunt quod ea quæ circa caput omnia rubicunda, & calida magis, & quæ in oculis venæ magis sensui patent. Capilli quoque, in his statim in lucē æditis habent in capite ortum. & quum plurimum in caliditate à mediocri temperatura recesserint, nigri, & robusti, & crispī fiunt. Cum vero non multum, subfauī quidem ab initio fiunt, deinde nigricant, ac progredientibus ætatibus caluitium patiuntur, atq; eo magis qui plus modico sunt calidiores. Excrementa vero quæ per palatum, & nares: & oculos, & aures, pauca, & concocta ipsis existunt quū integram habuerint sanitatem. cum vero eis caput repletur (continuo enī ac tum præsertim, cum nullam victus seruauerint rationem, tale quid eis

accidit)plura quidem in ipsis excrementa, atq; inconcocta generantur, implēturque:atque aggrauantur eorum capita à calidis cibis,& potibus odoribus,atq; hisce omnibus quæ extrinsecus occurrant,in quorum numero est,& qui nobis circūfunditur aere sed præterea magis, si non solum naturæ calida, sed etiam humida talia corpora extiterint. Breuib; autem somnis huiusmodi temperaturæ contentæ sunt,neq; admodū profundis. Signa frigidi cerebri. Cap.xv.

Frigidioris vero,quā oporteat, cerebri indicia sunt plura ī propriis meatibus excrementa, & capilli recti,& ruffi,& stabiles, & qui longo post natiuitatem tēpore nascuntur tenues,atq; ab initio male nutriti,& facile à causis frigidis offenduntur,atq; hoc ipso offensionis tempore distillatiōibus, & grauedinibus capiūtur,neq; si tetigeris, ptes ad caput attinētes admodū calidæ sentiūtur,neq; si inspexeris,rubicundæ apparet,& oculorū venæ oīno visum effugiūt,& somnolēti quodāmodo sunt.

p iiii

AR S
Signa sicci cerebri.

Cap. xvi.
Siccioris autē cerebri indicia sunt
paucæ superfluitates effluentes, &
sensuum perspicacitas. Sunt autē ad
vigilias prompti, & capillos habent
robustos, & qui celerrime eis statim
innascuntur. Crispi autē potius sunt,
quàm recti. Cito autem calui fiunt.
Humidi cerebri indicia.

Cap. xvii.
Humidioris vero cerebri indicia,
capilli plani, & nequaquam cal-
ui fiunt. sensus autem turbulenti, &
excrementorum multitudo. somni
multi, atq; profundi. Et hæc quidē sim-
plices sunt intemperaturæ.

Signa calidi, & sicci cerebri.
Cap. xviii.

Compositæ autem, primum ca-
lida, & sicca, secundum quam, &
superfluitatibus carēt, & sensibus vi-
gent, & plurimum vigilant, & cito
calui fiunt, & prima quidem capillo-
rum generatio celerrima est, ac pluri-
mo abundans alimento. Capillos ve-
ro habent nigros, & crispes, & tan-

gētibus caput, calidi sentiūtur, & sūt
rubicūdi vsque ad ætatē cōsistentiæ.

Signa calidi, & humidi cerebri.

Cap. xix.



I vero humiditas adiū
gatur caliditati, parum
vtriusq; qualitatibus supe
rantibus mediocritatē,
color bonus, & q̄ circa oculos calidiora,
venæ magnæ, & plura excremen
ta, & mediocriter cocta, & capilli re
cti, subflauī, & non facile calui fiunt.
Implentur vero atque aggrauantur
eorum capita à calidis. At si humectē
tur, protinus multo magis excreme
torum habent multitudinē. Et si plu
rimū caliditas, atque humiditas cre
uerit, his caput est ægritudinibus ob
noxium, atque excrementis habun
dans, & quod facile à calefaciētibus,
atque humectātibus offendatur. Au
ster vero semper eis aduersatur, atq;
optime in aquilone se habent, non
tamen diu vigilare possunt: & cum se
ad somnum conuerterint, simul graui
somno tentantur, & vigilāt, & soma
nia habent imaginationibus plena,

visus eis turbulēti, neq; satis sensibus
vigent. Quòd si plurimum in calidi-
tate cerebrum à mediocritate reces-
ferit, paululum autem humidius ex-
titerit, calidæ tēperaturæ indicia præ-
se feret, cum quibus leuia quædā hu-
miditatis signa coniungētur, veluti si
longe quidem humidius, paululum
vero calidius, vehementia quidē erūt,
ac manifesta humiditatis indicia, de-
bilia autem caliditatis. Communis
vero hæc ratio in omnibus compo-
sitis intemperaturis existit.

Signa frigidi, &
siccī cerebri.

Cap. xx.

F Rigidæ vero, & siccæ cerebri in-
temperaturæ, frigidum & mini-
me coloratū sui ratōe caput red-
dunt. Semper enim memoria rape-
tenda quæ à nobis ab initio est di-
stinctio posita, vt præterea aduerta-
mus quantum ex humorum tempe-
ratura alterentur quæ circa ipsum cō-
sistunt. Protinus autem huiuscemodi
temperaturæ venis carentes habent
oculos, & à causis frigidis facile ledū-

tur. Quare & inæquali fanitate fruuntur, quoniam nonnunquam læuissima habent capita, & excrementorum moderatos effusus, nonnunquam vero, & grauedinibus, & distillationibus minima ex causa capiuntur.

De sensibus. Cap. xxi.

Sensus autem eorum in iuuentute quidem omnes viget, atque omni vicio caret, sed progrediente ætate cito marrescunt. Et ut summam dicatur, omnes celerrimam circa caput senectutem ostendunt. Quare & cito cani fiunt. Capilli vero ipsis quidem genitis vix exeunt, & male nutriuntur, & rufi sunt. in progressu autem ætatis, superate magis frigiditate caliditatem, quam siccitate humiditatem, multum non caluescunt. Contra vero si contigerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditati, frigiditatem vero caliditati parum calui fiunt hi.

Signa cerebri frigidi, & humidi. Cap. xxii.

Humida vero, & frigida cerebri intemperatura faciunt homines graui sono tetari, & ad sonum

facile conuerti, sensibus quoque minime vigentes, atque excrementis redundantibus: & qui caput frigiditati, ac repletioni habent obnoxium, ac distillationibus, & grauedinibus facile tentantur, neque tamen hic alui fiunt. Hæc igitur indicia sunt cerebri temperaturæ, à quibus si progrediaris ad vnumquodq; sensorium dignotiones transferre licebit.

De oculis.

Cap. xxiii.

Sed sufficiet de oculis facere mentionem. Quicumq; tangentibus quidem manifeste calidi existunt, & facile à crebro motu ciētur, & venas latas habēt, hi calidi omnes sunt. Frigidi vero, his contrarii. Et humidi quidem molles simul, & multa humiditate pleni. Sicci vero duri simul, & aridi. A similibus autem suæ temperaturæ causis facile offenduntur, iuuantur autem a modico cōtrariorum vsu. Sed hoc quidem cōmune in omni cuiuscunq; partis temperaturæ dignotione oportet meminisse.

De magnitudine oculorum.

Cap. xxiiii.

Magnitudo oculorum quidem ubi concinnitas, & operationum virtus, multitudinem bene temperatę substantię ostendit, ex qua sunt conformati: quę si desint multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam ostendunt.

De paruitate oculorum.

Cap. xxv.

Paruitas vero oculorum, adiuncta quidem concinnitate, ac virtutum operatione, paucā quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt cōformati. Si vero sociam habuerint inconcinnitatē quādam, atque operationū vicium: tunc paucam simul ac viciosam materiā ostendunt.

De colore oculorum. Cap. xxvi.

Quæ vero ad colores attinent, ita distinguere oportet. Glaucci quidem oculi, qui pura humiditate, ac non multa præfulgēt, tales fiunt ob splendidi luminis abundantiam. Econtra vero nigri, & qui intermediam naturā seruant, causas

quoque intermedias habent.

De glaucedine, & nigredine oculorum. *Cap. xxvii.*

Glaucus igitur oculus fit, vel propter magnitudinem, vel propter splendorem humoris, qui à Græcis crystalloides nominatur. vel propter situm prominētem, aut propter tenuis & aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem, & puritatem atque omnibus quidem in vnum conuenientibus, fit glaucissimus oculus. Quod si aliqua adsit, aliqua vero non, tunc maior, minorve glaucedo contrahitur. Niger vero oculus fit, aut ob paruitatem crystalloidis, aut propter profundum, situm, vel quoniam splendidus ac fulgidus exquisitè non est: vel quoniam tenuis humor, vel superabundat, vel purus non existit: vel propter vnam aliquam ex his, quas ante diximus causas, aut propter omnes fieri consuevit. In ipsis autem magis, & minus (vt antea diximus) reperitur. Tenuis igitur humor quo magis ad aquæ naturam accedit, & superabundat, humidiores oculum ostendit: quemadmo

dū si crassior, ac minor fiat, sicciorē. Crysalloides autem, si quidem durior existat, sicciozem efficit oculum: si vero mollior, humidiorē. sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, sicciorē: si aut defecerit, contrariū.

De cordis temperaturis.

Cap. xxviii.

DE cordis autem temperaturis deinceps dicendū est. Si prius hec in memoriam reuocauerimus, quod vnā quāq; partem seipsa, vel calidiorē, vel frigidiorē, vel sicciorē, vel humidiorē dicimus factam, non alteri rei alteri comparantes. Vt cunque enī extiterit cor natura frigidius, multo sane calidiorē temperaturam possidebit calidissimo cerebro.

Signa cordis calidi.

Cap. xxix.

Calidioris igitur cordis, vt admodum qui ei proprius est, atq; cōueniēs, indicia quādam sunt inseparabilia, & propria, magnitudo respirationis, & pulsus velocitas, & frequentia, & audacia, & ad actiones natura

prompta. quòd si multum in calidita-
te excesserit, tunc furibunda quædam
iracundia, & temeritas adsunt. Est au-
tem his thorax hispidus, & præfer-
tim pectus, & quæcunque illis partes
proximiores. Magna vero ex parte ca-
lidi cordis temperatura, vniuersum
corpus calidum reddit, nisi hepar ve-
hemētius obstiterit. Dicemus autem
paulo inferius totius corporis idicia.
Est quidem & latitudo thoracis cali-
ditatis indicium, nisi & hic quoque
cerebrum plurimum obstiterit, quoni-
am ei magna spinalis medulla respō-
det: tantæ vero erunt vertebræ, quan-
ta & spinalis medulla, quare & spina
vniuersa. Configitur vero thorax ad
eam spinæ partem quæ methaphre-
non, id est, dorsum dicitur, tanquam
ad carinam navis: quare necessario
eius longitudo æquabitur dorso, lati-
tudo vero erit pro vertebrarum ra-
tione, quando ad proportionem ea-
rum crassitudinis fuerit constitutus.
cum vero cordis caliditas superans
perflauerit, ac dilatauerit, in primo
sui ortu thoracem, erit eiusdem cali-
ditati

ditati proportionē respondens. Quare cum caput paruum, thorax autem latus extiterit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Cū vero magno existente capite, paruus fuerit, propriissimum hoc erit cordis frigidioris signum. Si vero capiti fuerit proportionē respondens, tunc aliis signis de corde distingues, ex ipsius thoracis amplitudine nihil assumens.

Signa cordis frigidi.

Cap. xxx.

IN frigidiore vero corde pulsus minores existunt, q̃ modo naturæ conueniat; non tamen necessario tardiores, vel rariores. Respiration autē, si quidem tāto thorax minor extiterit, quanto cor frigidius pulsibus erit proportionalis. Si vero maior fuerit, q̃ pro frigiditatis uehementia: non minorem tantum, sed etiam tardio rem, & rario rem naturam ostēdit. Tales autem timidi sunt & sine audacia, & segnes, & nudum pilis habent pectus. De eius vero paruitate distinguēdū ut diximus prius.

Eodem modo & de totius corporis calidi tate,

Signa cordis sicci. Cap. xxxi.

COr autem siccus pulsum efficit duriores, & iram non promptam quidem, sed feram, & quae non facile sedari queat: magna quoque ex parte vniuersum corpus sicci⁹ existit, nisi hepar obstiterit.

Signa cordis humidi. Ca. xxxii.

COrdis vero humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidem procliuēs, sed talem quae facile sedari possit: & vniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstiterit. Secundum vero coniugationem qualitatum primarum viciose cordis temperatura ita se habent.

Signa cordis calidi & sicci.

Cap. xxxiii.

Calidi, & sicci cordis, pulsus duri sunt, & magni, & veloces, & frequentes, & respirationes magnae, & veloces, & frequentes, & multo magis ad velocitatem, ac frequentiam vergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Hi vero praecunctis peccus habet maxime hirsutum, & ilia.

MEDICINALIS. 722

Ad actiones autem prompti sunt, & iracundi, & subiti, & mores tyrannicos habent ad furorem faciles, nō facile vero placabiles. De totius autem corporis tēperatura, & thoracis amplitudine, his quę ante diximus pportionaliter est distinguendum.

Signa cordis calidi, & humidi.

Cap. xxxiiii.

SI vero caliditas vnā cū humiditate dominabitur, minus quidem his quos antea diximus, hi sunt hirsuti ad actiones vero nihilo minus prōpti, nō tamen ferior est aīus, sed ad irā pcliuis tātūmodo pulsus vero magni, ac molles, & veloces & frequētes existūt. Et respiratio, cū thorax cordi fuerit pportionalis, eādē pulsibus formam seruabit. Si vero minor extiterit. tātō illis velocior erit & frequentior, q̄to & thorax minor extiterit. Si aut multa facta fuerit euerfio itēperatura, ac si, hoc p̄sertim ī humiditate cōtigerit, pter ea q̄ diximus cōtingēt ēt ex putredine morbi his, quę in ipsis fuerint humoribus corruptis, ac putrefactis. Expirationes autē

q ii

MAIOR S
maiores sunt, ac velociores inspira-
tionibus, & submissio arteriæ in pul-
sibus velox.

Signa cordis humidi, & frigidi.

Cap. xxxv.

Humidioris vero, & frigidioris
cordis pulsus quidē molles, mori-
bus autem nequaquam audaces, sed
timidi, & segnes existūt. Tales etiam
glabrum pectus habent, minimēque
iram retinent, sicuti & ad iram non
admodum sunt prompti. Quæ vero
ad thoracem, & vniuersum attinent
corpus, distinguere oportet, sicuti ea
quæ ante diximus.

Signa cordis frigidi, & sicci.

Cap. xxxvi.

Frigidius vero cor, & siccus, pul-
sus quidem duriores reddit, &
paruos: respirationem autem, si
quidem thorax paruitatē cor-
dis frigiditati pportionalem habue-
rit, moderatam, si vero maior extite-
rit, raram ac tardam. Hi vero præ om-
nibus minime ad irascendum prom-
pti. Cum autem coacti fuerint irasci
quibusdam, retinent iram. Habent

autem maxime omnium nudum pectus. De paruitate autem thoracis, ac præterea totius corporis frigiditate similiter distinguendum. Vñ illud commune in hisce omnibus memoria repetētibus, q̄ quęcunq; de moribus, siue nūc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturę cognitionem, non de optimis moribus ac viciosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis, ac naturalibus nos exposuisse.

Signa calidi hepatis.

Cap. xxxvii.

Hepatis calidioris indicia, venarum latitudo, ruffa bilis abundantior, in consistenti vero ætate etiam atra, calidior ipsis sanguis, atq; eadem ratione corpus vniuersum, nisi obstiterit cor. His venter & ilia hirsuta.

Signa hepatis frigi. Cap. xxxviii.

Rigidioris vero, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, & totius corporis habitus, nisi à corde calefiat, venter illis glaber est, atq; ilia.

q iii

Signa hepatis sicci. Cap. xxxix.

Siccioris autem, sanguis quidē crassior, & minus abundans, venæ duriores, & totius corporis habitus siccior.

Signa humidi hepatis. Cap. xl.

Humidioris autem, sanguis quidem abundantior, atque humidior, venæ autem molliores, ita vero & vniuersum corpus, nisi partes ad cor attinentes obstiterint.

Signa calidi, & sicci hepatis.

Cap. xli.

Calidioris vero simul, ac siccioris hepatis indicia, illa plurimū hispida, sanguis crassior simul, ac siccior, ruffa bilis plurima est, consistente autem ætate & atra, venarum autem latitudo, & durities. Sic vero & vniuersum corpus se habet. Nam quæ ex corde caliditas originem habet, potest obtundere eā quæ ab hepate nascitur frigiditatem, sicuti & frigiditas caliditatem. Siccitatem vero non potest humidius cor ad contrarium habitum transferre. Media vero inter has, quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate

humiditas oritur. Magis enim à cor-
dis siccitate supatur, q̃ siccitas ab hu-
miditate: minus autem caliditate, ad
huc vero multo minus frigiditate.

Hec enim inter omnes qualitates quę
ab hepate eueniūt, facillime vincitur.

Liquet autem q̃ cum in vnum conue-
nerint vtriusq; principii temperatu-
ræ, totum exquisite secundum illas af-
ficitur corpus. paulo vero inferius ip-
sius dicentur indicia.

Signa hepatis calidi, & humi. C. xlii.

Humidius autē, ac simul calidius
hepar, minus quidē q̃ calidius,
& siccus illa reddit hispida. Plu-
rimum vero sanguinis, & venas am-
plas, habitumq; calidiorē, atq; hu-
midiorē facit, nisi obstiterit cor. Si
vero amplius in ambabus qualitati-
bus à naturę modo recedat, à morbis
qui ex putredine, ac viciosis humori-
bus fiunt, facillime capitur. Adhuc au-
tem magis si plurimum augeatur hu-
miditas, caliditas vero non ita. Si autē
cōtrā, parum quidem humiditas cre-
scat, plurimū vero caliditas, minime
viciosis humoribus laborant.

q iiii

Signa hepatis humidi, & frigidi.

Cap. xliii.

Humidius autem, & frigidius hepar habet ilia glabra, sanguinem vero ad pituitae naturam accedentem generat, cum venarum angustia: sic & reliquum afficit corpus, nisi a corde ad contrariam naturam transferatur.

Signa hepatis frigidi, & siccissimi.

Cap. xliiii.

Frigidius autem, & siccius hepar cum paucio sanguine, & venarum angustia efficit corpus, atque frigidius, & ilia glabra, nisi & hic cor dominetur.

Signa calidae, frigidae, humidae,

& siccae temperaturae testiculorum.

Cap. xlv.

Temperaturam vero testiculorum, calida quidem ad venerem propitius est, & masculorum generatrix, & fecunda, celerrimèque genitalis partes obsepit pilis, simul autem & circumiacentes attingit partes. Frigidior vero contraria efficit. Et humida quidem multo & humido semine

MEDICINALIS. 125

abundat. Sicca paucum, & modice crassum generat semen.

Signa calidæ, & sicce temperaturæ testiculorum. Cap. xlvī.

Calidior vero, ac siccior, & crassum semen habet, & foecundissima est, quæ celeriter ab initio protinus ad coitum excitat animal. Sed & his genitales partes citissime hispidæ fiunt, atque omnes quæ circumstant supra quidem usque ad umbilicum, infra vero usque ad media femora. Petulca igitur est, & ad libidinē prona huiusmodi temperatura, statim vero satiatur, & si cogatur, offenditur.

Signa calidæ, & humidæ temperaturæ testiculorū. Cap. xlvii.

Si autem caliditas humiditati coniungatur, hirsutis quidē tales minus, plus vero semine abundant, non tamen plus cæteris appetunt, sed minori detrimento præter modū venereis indulgēt. quæ si satis exercuerint, & caliditas, & humiditas non sine detrimento à venereis abstinent.

Signa frigidæ & humidæ temperaturæ testiculorū. Cap. xlviii.

SI vero frigidiorē, & humidiorē
temperaturam testiculi habuerit,
partes circūpositæ glabræ sunt, &
tarde rem venereā exercere incipiūt,
neq; proni ad actū huiuscemodi sunt.
Aquosum vero, & tenue ipsis est se-
men, & infœcūdum & fœminarū ge-
neratiuū, vel oīno non generans.

Signa frigidæ, & siccæ tēperaturæ
testiculorum. Cap. xlix.

Rigidior vero, & siccior tempera-
tura similis quidem in reliquis est
antedictæ. Crassius vero in ipsa se-
men existit, atq; omnino paucum.

De habitu totius corporis.

Cap. l.

TOtius autem corporis habitus
diximus, & superius quomodo
hepatis, & cordis naturam sequatur,
ei autem magis assimilantur, q̄ vnā
aliquā ex primis qualitatibus poten-
tiorē habuit, quas & effectiuas ap-
pellant. Totius vero corporis habitus
in illis maxime dicitur partibus quæ
primæ oculis subiiciuntur. sunt vero
hæ, muscoli, qui omnia ambiunt os-
sa, carnes quædam compositæ ex pri

ma & simplici carne, & filis quibus innascuntur. propria enim musculorum substantia his duobus constat. quæ vero ad ipsos, vasa pertingunt, veluti riui quidam sunt: qui non substantiam complent, sed eis subministrant, vt in vita permaneant. Dicuntur igitur, & horum temperaturę indicia, in bene temperata habitatione. nam quę male temperatę sunt cutem permutant ex se ipsis formantes, & quædam ex indiciis corrumpunt: ita & in bene temperata regione, si quis se tempore æstatis nudum soli exposuerit, permutabit indicia quæ ex calore, & durtiē, & mollitiē sumuntur. si vero quęadmodum bonam temperiem obtinet locus, ita & ipse bene temperato victu vsus fuerit, vt qui neque se singulis diebus in sole torrefaciat, neque sicuti plerique more puellarum continue in vmbra degat, hic certa atque exquisita temperaturę indicia præseferet. tanquam igitur de hoc futuro sermone nunc ad ipsum accedemus.

Signa moderatę tempera

turę.

Cap. li.

Moderatæ temperaturæ indicia
 secundum totum animalis ha-
 bitum. Color quidē ex rubro,
 & albo cōmixtus, capilli vero flauī,
 & vt plurimū mediocriter crispī. Car-
 nositatis autem mediocritas in quali-
 tate, & quantitate. Medium est enim
 exquisitè huiusmodi corpus inter oēs
 excessus, vt qui ad ipsum dicantur, &
 cognoscātur. nam & crassum corpus
 ad hoc cōparatum dicitur crassum,
 & tenue ad hoc eodem modo, & car-
 nosum, & macilentum, & pingue, &
 durum, & molle, & hispidum, & gla-
 brum. nullius igitur horum mediocri-
 tas est. Sed qualis Polycleti regula ad
 summum totius peruenit mediocri-
 tas, adeo vt neque tangentibus molle
 videtur neque durum, neq; calidum,
 neque frigidum: inspicientibus vero,
 neque hirsutum, neq; glabrum, neque
 crassum, neq; tenue, aut aliquē alium
 habens excessum, vel defectum.

De corpore calidiore. Cap. lii.

Quæcunq; autem in caliditate
 à medio recedunt, non tamē
 in humiditate, & siccitate,

hæc quantum ad carnosum genus at-
tinēt (de hoc enim præsens est sermo)
videntur quidem tangētibus calidio-
ra tantum quātum & eorum tempe-
ratura calidior. Tāto vero magis hir-
suta sunt, quanto & calidiora, & mi-
nus pinguedinis habent, colorē autē
rubrū, & capillos nigros habent.

Signa frigide tēperature. Cap. liii.

Frigidioris autem tēperature in-
dicia sunt pilorum carentia, pin-
guedo, & frigiditas quæ tangen-
tibus obuiat. Color autem vnā cum
capillis rufus. Et vbi frigiditas exces-
serit, liuidus quodāmodo existit, quē
nōnulli medici colorem plumbeum
appellant.

Signa sicce tēperature. Cap. liiii.

Siccior autem temperatura tan-
to gracilior est, & durior bona
temperatura, quanto maior est
siccitas. In reliquis autem eodē
modo se habet.

Signa humidæ temperaturæ.

Cap. lv.

ET humidior etiam in reliquis qui-
dem eodem modo se habet, me-

lius autem carnosā, & mollior: & quīdem secundum coniugationem qualitatum primarū factā intēperaturā cōpositam habent indiciorū formā.

Signa calidæ, & siccæ temperaturæ. Cap. lvi.

CAlidior simul, ac siccior est hirsuta magis, ac calida, & dura existit & pinguedine caret tenuisq; est, & capillos nigros habet. Si vero multum in calidi tate excedat, color quoq; niger illi adest.

Signa calidæ & humidæ temperaturæ. Cap. lvii.

CAlidior autem, & humidior tēperatura mollior, & calidior, & carnosior tanto est bona temperatura, quantum & vtriusq; qualitibus aucta fuerit. q̄ si plurimum augeatur, cito à putredinis corripitur morbis: quoniam & humorū vicio prompte laborat. Si vero parum quidem humidior sit, multo vero calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt his, qui bonam habent temperaturam, & magis carnosī, non parum vero hirsutiores, & tangentibus

non parum calidiores nigri vero eis capilli, & caro pinguedine cadit. Si vero paulo quidē calidior multo humidior, mollis his caro est, & multa: & color cōmixtus est ex albo, & rubro, & tangentibus paulo calidiores. Et vt summam dicatur, in omnibus temperaturæ coniugationibus semper super excedentis qualitatis indicia eminebunt.

Signa frigida & humida temperatura. Cap. lviii.

Frigidior autem, atque humidior temperatura, si parum quidem utraq; augeatur pilis nuda est, & alba, & mollis, & crassa, & pinguis. Si uero magis excefferit, reliqua quidē sunt secundū proportionem augmenti qualitātū, color autē unā cum capillis rufus, quemadmodum si plurimū utraq; augeatur, liuidus. Si uero qualitātū augmentū fuerit inæquale eius q̄ superexcefferit, indicia eminebunt.

Signa frigida, & sicca temperatura. Cap. lix.

Si autē frigiditas vna cum sicca a te equaliter augeatur, natura du-

rum ac tenue, & glabrum corpus habent, & tangentibus frigidū. pinguedo tamen ipsis, & si graciles sint, per carnes dispersa. Capilli autem, & color frigiditatis modum, ac proportionem sequuntur. Vbi vero calida, & sicca temperatura in tēpore decrementi, in frigidum, & siccum labitur habitum, tunc hi graciles fiunt, & duri, atque atra bilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, et hirsuti euadūt. vbi igitur altera qualitas plurimum dominatur, altera vero parum à mediocritate recedit, superabunt eius quā dominatur, exilia autem erunt altera qualitatis indicia. in omnibus vero de quibus supra diximus, & postea dicemus, cōmune est temperaturę indicium, si membrum facile frigefit, vel frigiditatis, vel raritatis. Si vero non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si vero à desiccantibus offendatur, & aridum & siccum, & non facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus grauiter se habeat humiditatis. Inspicere autē oportet si eandē omnes musculi seruant

uant temperaturam, vel minime eandem, atq; in omnibus animaduerte re subiectoꝝ ossium quantitatē. Nō nūquam enim gracile videtur membrum cū tamen non sit gracile, quoad musculos attinet, sed propter ossium tenuitatem tale videtur, sic & crassius quibusdam plerunque apparet, non ob ossium amplitudinem, sed ob multitudinem carnis, quæ vel aucta, vel comminuta, vel durior, aut mollior effecta, siccus, aut humidus membrum ostendit. Pauca igitur, ac dura, siccus multa autem, & mollis, humidus. Sic & intermedia spacia similium corporum, vt plus, vel minus humidæ substantiæ in se ipsis continent, vel crassius, vel tenuius, vel humidus, vel siccus membrum ostendunt. Humidus quidem vbi subtilior & plurima est humiditas, siccus vero vbi crassior, simul, & minor. Ipse enim solidæ corporis partes quæ vere solidæ sunt, ac primæ, nullo modo possunt effici humidiores: at satis ē, si quis eos celerius exiccare prohibeat. Intercepta autem in ipsis spacia, hac

211 AR 5
vel illa humiditate complere possibi-
le. Hæc vero est proprium partium si-
miliarium alimentum, quod ex ap-
positione fit, & non per vasa attrahi-
tur. Communis autem hæc ratio &
omnium partium existit. Et iterum
insalubrium, atque insalubrium cau-
sarum doctrina repetetur: nunc autē
ea quæ ordine sequuntur attingamus.
Signa siccæ ventriculi. Cap. lxx.

Ventriculi indicia, eius quidē
qui natura siccior existit, si
celeriter sitibundi fiant, &
paucus eis sufficiat potus, à
plurimo autem aggraentur, fluctua-
tionibus infestentur, aut superfluitet
id quod abundat, & cibis delectan-
tur siccioribus.

Signa humidæ ventriculi. Cap. lxxi.

Humidioris autem, si neque siti-
bundi fiant, & superabundās hu-
midum facile tolerant, & cibis
gaudeant humidioribus.

Signa calidi ventriculi. Cap. lxxii.

Calidior vero natura ventriculus,
melius quidem concoquit, quàm
appetat: & multo magis quæcū-

que dura sunt, & non facile alterationem suscipiunt. nam quæ facile alterantur in ipso corrumpuntur, gaudet que calidis potibus, ac cibis: neque a frigidis ullam percipit noxam. si modice ipsis utatur.

Signa frigidi ventriculi. Cap. lxiij.

Frigidus vero natura ventriculus, ad appetendum quidem plurimum viget, ad concoquendum autem minime, tales præsertim cibos qui frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Cito itaque in ipso acescunt, atque ideo aridis eruptionibus talis ventriculus plurimum abundat. & gaudet quidem frigidis, sed ab eorum usu immodico offenditur, ita & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit tolerare, quemadmodum neque calidus, calida. Mala vero temperaturæ quæ morbi ratione ventriculum occupant, hoc differunt ab his quæ naturales existunt, quoniam contraria, non autem similia appetunt, quemadmodum naturales.

De malis temperaturis in ventriculo coniugatis. Cap. lxiij.

MAlæ autem temperaturę in ventriculo cōiugatæ, ex cōpositione simplicium cognoscuntur. Oportet autem eas quæ iam sunt dictæ diligenter aduertere, easdem ab his quæ dicuntur, distinguentes. Non solum enim ventriculus sitibundos, & minime sitientes facit, & frigidi, calidius potus appetentes, sed ea quoque viscera quæ in thorace sunt, vt cor, & pulmo, sed qui ob horum sitiunt caliditatem plus inspirant, & longius expirant, atque æstum in thorace sentiunt, non sicuti qui ventriculi ratione in illis caliditatem patiuntur, & cum potauerint non statim sedatur sitis, & magis cum frigidum hauserint, quam cum calidum nimis. Refrigerat autem eosdem, & frigidi aeris inspiratio, quæ nihil eos iuuat qui ventriculi ratione sunt sitibundi, ita & hi qui contrario modo se habent à frigida inspiratione sensibilem sentiunt affectum.

Signa pulmonis frigidi. Cap. lxxv.

ET hoc maximum sit frigidi pulmonis indicium. Vt vero frigidum

inspirantes manifeste dolorem sentiunt & frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica, sed & pituitæ excrementa cum sreatu, & tussi expuunt. Signa pulmonis sicci. Cap. lxxvi.

Pulmonis aut siccitates excrementis vacat, & pituita & vocē clarā efficiunt quēadmodū humiditates obscurā reddūt, ac raukā: & cum vehemētius, aut acurātius loqui studuerint, tūc intercidūt excrementa.

De voce. Cap. lxxvii.

Non tamen ipsa vocis magnitudo à caliditate, sicuti neq; paruitas à frigiditate inest, sed altera quidē asperæ arteriæ latitudinē sequitur, & vehemētiorē efflatū, paruitas vero à cōtrariis aduenit causis. Quare neq; semper, neq; primū, sed ex accidēti, & solas naturales téperaturas nō autē aduentitias vocis magnitudo, aut paruitas sequitur. Quoniā etenim talia instrumēta temperaturæ ratione sunt facta, ad hæc consequitur huiusmodi vox. Idcirco contingit ex voce de naturali téperatura ratiocinari.

De leni, & aspera voce. Cap. lxxviii.

NAm & lenis vox, arteriæ lenitatem consequitur, sicuti & asperitatem. Lenitas igitur, arteriæ moderatam sequitur temperaturam asperitas vero siccitatem. Asperitas etenim fit ab inæqualitate duri corporis: arteriam vero duram similium partium ex quibus constat siccitas: inæqualem vero dispersæ in eisdem humiditatis defectus.

De voce acuta. Cap. lxxix.

EOdem modo, neq; acuta natura vox sine angustia faucium, neq; grauis sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab insita, atque innata nascitur frigiditate latitudo autem a caliditate. Differentiis igitur naturalium vocum hecque ex affectu aliquo fiunt, sunt proportionales, quæ & ipsæ indicia sunt causarum à quibus oriuntur, de quibus in libris de voce sufficienter distinximus. Reliquæ vero partes animalis interiores exilia habent temperaturæ indicia. Tentandum tamen ea ex iuuantibus, atque nocentibus agnoscere: ac præterea naturalium potentiarum.

operationes. Dictum vero est in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potētiae virtus, & viciū tēperatura principalis existat. Teperaturarū itaq; indicia iā explanauimus.

Signa naturæ instrumentaria.

Cap. lxx.

Circa magnitudinē vero, vel formationem, vel numerum, vel situm: quæcūq; quidē sensibus subiiciūtur errata, cognitu facillima sunt: quæ autem sensu percipi nequeunt, quædam cognitionem habent difficilē, quædam vero facilem. Capitis igitur magnitudo, ac figura, & cerebri, simul, in propatulo sunt, & de his antea diximus: sic & quæ thoracis sunt, & quæcūq; ad scapulas, & humeros, vel brachia, vel cubitos, v' extremas manus, vel coxas, vel fœmora, vel tibia, vel pedes attinēt nō est difficile agnoscere, siue secundū formationē, siue secundū magnitudinem, ex his aliquid nō recte se habeat, siue secundum numerū, vel partiū, ex qbus cōstant cōposituram, singularum etiam operationis detrimēta facile patent.

r iiii

Quæ autē intra corpus sunt nō omnia possunt agnosci.

De ventriculo.

Cap. lxxi.

Cuiusdam enim ventriculū aded paruum ac rotundum, ac pronū secundum ilia situm habentē inspe- xi, vt manifeste ex circumscriptione propria, & videntibus, & tangenti- bus appareret.

De vesica.

Cap. lxxii.



Itē & cuiusdam vesicam cōtingit intueri, ita ex- positam, ac parua, vt si quādo vrinā tardius ex- cerneret, tumor quidē circumscriptus manifeste cerneretur, nō tamē aliud ex interioribus quid- quā mihi vnquā manifestum prēbuit indiciū. Tentare autem oportet quā maxime fieri potest virtutē ipsorum ac viciū. & si nō certissima sciētia, ar- tificiosa saltē cōiectura cōprehēdere, veluti, exempli gratia, in hepate.

De hepate.

Cap. lxxiii

Vidienim aliquos: & quidem quā plures quibus venæ erant angu- stæ, & totum corpus colore priuatū.

quod si plusculum cibi assumpfissent
 qui p̄sertim flatibus excitandis aptus
 esset, & crassus, ac tenax: nonnulli qui
 dem veluti pondus quoddam insidēs
 atq; suspensum in profundo dextræ
 illorum partis sentiebant: nonnulli ve-
 ro quandam cum dolore tentionem.
 In his quidā verisimile est hepar esse
 parū, atq; angustos meatus habere.
 De homine pituitoso, vomente bilē.

Cap. lxxiiii.

Alterum vidi cuius totus habitus
 pituitā præ se ferebat, quotidie
 tamen bilē rufam euomebat. Censui
 igitur inspicienda alui excrementa,
 in quibus minimū bilis apparebat.
 Quare coniectura quadam compre-
 hendi eum meatū qui biliosum egur-
 gitat humorē in quo minimam eius-
 dē partē ad imū ventriculi locum, quē
 Græci pylorō idest ostiarium vocāt,
 effundere, vt in quibusdam apparet
 animalibus ex quibus id constat, quod
 plurimum ad eorum quæ latent sen-
 sum, confert cognitionem, ea quæ ex
 sectionis inspectione habetur peri-
 tia, & operationum, atq; vtilitatum

inuentio. Quicunq; igitur facultatem
dignoscendi huiusmodi corpora
quæ ita lapsa sunt conseq; cupit: oportet
ipsum in sectionibus, ac in operationem, atque vtilitatum inuentionibus
exercitari. Scripsimus vero de omnibus
seorsum in tractatibus aliis, de quibus
in fine libri omnino proposuimus
facere mentionem: vt discendi cupidi
intelligant quæcunq; discere optauerint,
ex quonā possint haurire tractatu, sed nō de hisce satis.

Quomodo cognoscantur corpora ægrotantia.

Cap. lxxv.

QUæcunq; vero vt nūc īsalubria
sunt, hoc ē q̄ iam ægritudine
patiūtur, dignoscere, & hæc
ipsa oportet. Quæ quidē subiiciuntur
sensui ex eorum quæ ipsis insunt, secundum
naturam permutatione, in magnitudine,
colore, figura, & numero, & situ,
& ea quæ est secundum duri-
tiem, & molliem, & frigiditatem,
& caliditatem differentia. Quæ autem
visum effugiunt (vt summatim

dicam) ex operationum læsionibus,
aut his quæ excernuntur, aut dolori-
bus, aut tumoribus præter naturam,
aut horum quibusdam, vel omnibus.

Signa cerebri patientis.

Cap. lxxvi.

P Articulatim autem quæ quidem
sunt in cerebro agræ dispositio-
nes, aut dementiæ speciebus, aut sen-
suum, vel imaginationum læsionibus,
aut actuum qui secundum electionē
fiunt, aut ex his quæ excernuntur, per
palatum, vel nares, vel aures, aut ho-
rum, qui ei dolores eueniunt diffe-
rentiis.

Signa cordis patientis.

Cap. lxxvii.

Q Vē vero ī corde fiunt, ex diffi-
cili āhelitus spēbus, & tremur-
lis motibus q̄ ipsi cōtingūt,
ex pulsibus quoq; eius, atquæ arteria-
rum, ab excandescēdi celeritate, aut
tarditate, à febribus, & refrigeratio-
nibus & in colore differentiis, ac eis
qui ipsi adueniunt doloribus.

Signa hepatis patientis.

Cap. lxxviii.

QUæ autem in hepate, ex defectu humorum, atq; abundantia, & ad id quod præter naturam euerfione, & colore malo, ac præterea ex permutatione nature in his quæ ad alimenti deductionem, aut superfluitatum attinet excretionem: sed & ex grauitatibus, & tumoribus & doloribus, nõ modo his qui in eo ortum habent, verum & illis qui compatiendi ratione proueniunt, quemadmodum in aliqua, vel spiritus grauis, vel tussis specie.

Signa ventriculi patientis.

Cap. lxxix.

Sic & ventriculi affectus agnoscitur vbi in concoctione, & appetitu humidi, vel sicci alimenti, vel superfluitatum excretionem delinquitur. Ita etiam, ex singultibus, eructuationibus, nauseis, vomitibus, & ipsis eorum quæ euomuntur speciebus.

Signa thoracis patientis.

Cap. lxxx.

Ita & thoracis agnoscuntur affectus & spirandi difficultatibus, tussibus, & doloribus q in ipso fiunt,

& ex eorum quæ expuuntur differen-
tia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines,
difficiles anhelitus, & dolor in loco,
& quæ expuuntur, & vocis offensio-
nes ostendūt. Secundum vero eandē
proportionē, & in aliis omnibus ac-
cidit partibus. nam ex tumore, dolo-
re, & operationum læsione, & excre-
mentorum differentia, sumentur in-
dicia. Excrescentiæ autem non natu-
rales, in inflātionibus, durisq; ac
laxis tumoribus, & erysipelatis, sunt
explorandæ. Dolor autem quæcunq;
obsederit locum, aut continuitatis so-
lutionem, aut subitam alterationem
ostendit. Soluitur autem continuitas
incisione, exesione, fractione, & ten-
sione. Alteratur vero substantia à ca-
liditate, frigiditate, humiditate, sicci-
tate. Læditur autem operatio triplici-
ter, aut quia vix, aut quia viciose, aut
quia nullo modo fit.

De differentia eorum quæ excer-
nuntur. Cap. lxxxii.

Quæcunq; autem excernuntur,
nonnulla quidem sunt veluti
partes patientium locorum:

216 ARS
nonnulla vero tanq̃; excremēta. Quæ
vero in ipsis naturaliter continentur,
singula propriam facient indicatio-
nem. Dictum est autem plenius de hi-
sce omnibus in tractatu de membris
passis, quem nullus ante nos, aut in
artem redegit, aut ad absolutā per-
fectionem deduxit: quēadmodum &
in omnibus aliis euenit, quibus initiū
quidem aliquod ab antiquis est da-
tum, non tamen absolutum est opus.
Ægrotantium itaq; corporum ex tra-
ctatu illo indicia sunt sumenda. eorū
aut qui in ægritudinem lapsuri sunt,
& qui sanitati restituendi, præsens do-
ctrina complectitur.

Signa futuræ ægritudinis.

Cap. lxxxii.

Eorum igitur indicia quibus ægri-
tudinis periculum imminet, me-
diam formam habent inter ea quæ
sanis, & quæ ægrotantibus eueniunt.
si quidem sanis omnia secundum na-
turam insunt, præter naturam vero
ægrotantibus. In confinio autem ho-
rum ea quæ sunt corporum neutro-

rum indicia, quorum nonnulla quidem sunt ex eorum genere quæ secundum naturam, sed vel qualitatibus, vel quantitativibus, vel temporibus permutata: quædam autem ex his quæ præter naturam, at minora his quæ ægritudinibus adsunt. Atque idcirco hæc quidem corporum dispositiones, quæ in ægritudinem casura monstrantur, sunt ex neutrorum genere, atque una ea quæ ipsa indicant signa. Primo enim hæc sanitatem ostendunt, secundo autem ægritudinem: & fiunt eadem signa secundum ad aliquid habitudinem, neutra, & insalubria. quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ vero futuram præmonstrant, insalubria. Eadem vero ratione, & quæcunque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicentur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt. dicentur etiam ægræ quatenus, præsentem ostendunt ægritudinem. Neque in ambiguo est, quæ sunt utrorumque indicativa, neutra dicentur, secundum unum quoddam neutri vocabuli significatum. Neque ve-

ro mirari oportet eadem signa tres
 in diuersis habitudinibus seruare ra-
 tiones, quę & salubria, & egra, & neu-
 tra dicuntur. Secundū vero alterum
 significatū, quęcunq; his qui à morbo
 reficiuntur, sunt signa neutra appella-
 mus. neq; in alio significato accipiunt
 ea quę senibus insunt, hæc quidem
 omnia pluribus, & conceptibus, &
 rationibus subiiciuntur. Quęcunque
 vero his qui integra sanitate fruun-
 tur, inter salubria tantummodo com-
 putantur. Et quęcunq; egrotantibus
 insunt, neque futuram prænunciāt sa-
 nitatem, soli & hæc ægro, tum conce-
 ptui subiiciuntur. Sed de his quidem
 postea dicetur: nunc quę futuram præ-
 monstrant ægritudinē prius exequa-
 mur. Cum vero sit eorum differentia
 duplex, prius ea pertractemus q̄ quā-
 titatibus, qualitatibus, temporibus,
 non autem propriis speciebus ab eo,
 quod secundum naturam, euariant,
 veluti ciborum appetentia, intenta,
 vel dissoluta, aut quę non seruet tem-
 pus consuetum, aut quę ad edulia nō
 uisitata feratur, aut excretiōes cibi su-
 perfluitatum

perfluitatum quæ aut pauciores, aut
plures, aut humidiores, aut duriores
existât. Sic humidorum excremento-
rum, vel defectus, vel superabundan-
tia præter consuetudinem naturalē,
aut in colore, aut in cōsistentia varie-
tas aliqua, aut in tempore excretio-
nis, & vigiliæ plures, ac somnus, aut
non cōsueti tempore. Eodem modo
potus pluris, aut paucioris, calidi, aut
frigidi, insolens appetitus, sicuti & cir-
ca rerum venerearum vsum immo-
dica, aut intēpestiua cōcupiscentia, &
plures, aut pauciores sudores his qui
sint opportuni, & ad motus torpor,
aut si moueri tētauerint grauitas, aut
vehemēs exolutio, menstruorum oc-
cultatio, vel immodica, aut diminuta
euacuatio. Sic & quæ per ora venarū
(Græci hemorroidas appellât) fit san-
guinis effusio, sed non eadem quæ pri-
us in cibo, potuq; voluptas, sunt futu-
ræ indicia egritudinis, hebetudóque
animi non naturalis, aut obliuio quæ-
dam inconsueta, aut somni qui pluri-
bus imaginationibus abundant, quā
prius auditus, & odoratus visus, ve-

21 ARS
hebetiores, aut turbulentiores. Et vt
simpliciter dicam quæcunq; secundū
naturam inerant, hæc quidem aug-
mentata, hæc vero comminuta, hæc
vero temporibus quibusdā, aut qua-
litatibus immutata. Siquidē & ipsius
corporis moles, aut maior, aut mi-
nor, aut magis alba, aut magis rubra
quemadmodum liuidior aut nigrior
ructusq; ac sternutamenta, & flatus
plures, aut pauciores his qui secundū
naturam: sic & quæcunq; per nares,
vel palatum, vel aures, per quos mea-
tus cerebrum expurgatur, vel tempo-
ribus, vel quantitativibus, vel qualitati-
bus immutata. Hæc igitur omnia ex
genere eorū sunt, q̄ secundū naturam,
morsus quoq; vētris, vel in ore ventri-
culi, vel in aliquo intestino, aut cū al-
uus subducitur, aut cū vomitus exci-
tatur, aut cū mingitur, siue aliq; alius
dolor moderatus ex genere qdē exi-
stet eorū quæ p̄ter naturam: non ta-
men qui ita se habent, agrotare dicū-
tur, sicuti neque qui capite grauantur
aut dolent, aut vigilant cum non-
dum in consuetis impediuntur ope-

rationibus . Hic enim in huiuscemodi dispositionibus terminus est . Atque idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram appellabimus . Nam pro vigore potentiæ quæ vel facile sustinet, vel vincitur, vnaquæque ex his, quas antea diximus, vel morbus est, vel neutra dispositio, sic & quæcunque in sensibus, non in eo quod magis, aut minus inuicem differunt, sed toto genere sunt præternaturam . Et hæc sunt signa morborum, donec modica fuerint, & nondum hominem à consuetis operibus sufficiunt amouere . talia vero sunt in gustu quidem, cum vel salæ, vel amaræ, aut alicuius alterius qualitatis sapor nobis indicatur, siue in omnibus quæ bibuntur, aut manducantur, aut præter quòd aliquid assumatur, saliuæ ipsa talis sentiatur . In odoratu autem quando alicuius vnius qualitatis sensum habemus, nullo odore præfente, aut quum plura differentia naribus admouemus, oia veluti similia sètimus . Sæpius vero

nihil sentimus, aut aliqd foetens, etiā
 si nihil adsit quod foeteat. Quantum
 vero ad auditum soni, & strepitus ad
 id quod præter naturam pertinent.
 Quemadmodum in visu, quæcunque
 ante oculos apparere creduntur nigra
 & atra, & cerulea, & ruffa, & rubra,
 & nonnulla rotunda, nonnulla autem
 oblonga, quædam gracilia, quædam
 crassa oculis prætendi videntur. In sen-
 su autem tactus quum inæqualitas ali-
 qua, vel spissitudo, vel grauitas, vel tē-
 tio, vel torpida, vel vlcerosa disposi-
 tio in toto corporis habitu sentitur,
 sic & in singulis partibus, vel tentio,
 vel compressio, vel morsus, vel graui-
 tas, quando modicæ fuerint, ac mini-
 me firmæ, neutram quidem disposi-
 tionem adesse demonstrant, futuram
 vero egritudinem prænunciant.

Signa corporum ægrotantium.

Cap. lxxxiii.

AT quæ iam in ægrotantibus si-
 gna videntur, ex quibus nonnul-
 la salutem, nonnulla mortem porten-
 dunt: prima quidem salubria, altera
 vero genere quidem ægra, secundum

speciem autem pernicioſa dicuntur. Sumuntur autem (vt vniuerſaliter dicamus) ex operationum virtute, ac vicis, ſecundum partem vero ex particularium operationibus, quarum genera antea diximus. Primum quidē eorum quæ principia exiſtunt, ſecundum vero illorum quæ à principiis ortum habent, & tertium eorum quæ ex ſeipſis gubernantur, à principiis autem quaſdam deriuationes habēt. quartum ſiquidem genus eorum quæ tunc diximus, ex ſe quidem ad aliqd prænoſcendum inutile eſt. ſecundum accidens autem, & ex his aliquando præcognitiones erunt, quemadmodum, & ex excrementis: ex his quidē compatiendi ratione: ex excrementis autem quoniam coctiūis, & incoctiōis: ſigna continent. Quare fieri non poteſt quin omnino ſignificent, aut naturam materie, aut materiam naturæ, aut neutrum neutro dominari. Salubria quidem ſigna dicuntur, natura ſuperante: inſalubria vero ſuperata, neutra autem quæ pugnas habent æquales. Sed q̄ quidē manifeſtā

indicant coctionē ex salubribus sunt:
 sicut quæ cruditatem, agra: quæ vero
 neque coctionē, neque cruditatē ostēdūt,
 ex neutrorū sunt natura. Sūt vero &
 neutra quæcūque nunc, qdē hoc nunc
 vero contrarium significant, veluti dī
 giti denigrati. Talia sunt etiam criti-
 ca, id est decretoria accidētia, de qui-
 bus omnibus in libris de crisi dictum
 est: sicuti etiam de his quæ ad vnam
 quāque attinent operationem, in his
 libris in quibus de causis accidētium
 agitur. Quare omnem horum singu-
 lorum materiā ex eisdem libris collī-
 gere oportet. Ego vero p̄plexitati par-
 cens, hic sermoni de signis finem fa-
 ciam, transgrediar autem ad illum
 qui de causis.

De causis salubribus, in salubribus, ac
 neutris. Cap. lxxxiiii.

Q Voniā vero & harum hę quī-
 dem salubres, hę autem insa-
 lubres, hę vero neutre, primū
 de causis salubribus erit sermo. Quia
 vero, & harum nonnullę quidem cō-
 seruatrices, nonnullę vero effectrices
 u n t autem & tempore, & dignitas

te priores conseruatrices) incipien-
dum est à cōseruatricibus. Quum igitur non vnum tantum sit sanum corpus, sed plura, vt supra diffiniuimus, in eorum singulis propria erit causa conseruatricis. Siquidem omnis causa in eo quod ad aliqd existit. Hic igitur denuo sumendū initium ab optima corporis constitutione, ac quæ ei salubria sint consyderandum. Eorum autem inuentionem ipsius rei natura insinuat. Si enim impatibile, atque inalterabile esset corpus, semper optima constitutio perduraret, neque artis præsidio indigeret. Quoniam vero alteratur, corrumpitur, & vertitur, neque eundem seruat prioris status tenorem, ea ratione auxilium desyderat.

Quod modis nostrum corpus alteretur.

Cap. lxxxv.

Secundum quot igitur alteratur modos, tot auxilioꝝ, hoc est cārū cōseruatriciū genera hēbit, quas ex his q̄ dicta sūt liquet eē ex correctiuarū genere. Sed quia pau-

s iiii

me affectibus. ex his enim necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aere quidem ambiente, quia aut calefit, aut frigefit, aut exiccatur, aut humectatur, vel secundum horum patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex motu vero, & quiete, cum vraq; modū excesserint, aut calefactū, aut refrigeratum, aut humectatum, aut exiccatum, vel aliquid secundum horum patiens coniugationem. Sic & ex somno & vigilia ipsum pati est necessarium secundum eandē rationem, & ex animæ affectibus. Ex his quæ assumuntur, aut excernuntur aut retinētur, hæc siquidē omnia partim quidem euidenter, partim vero per alias causas medias alterant corpus, & sanitatem corrumpunt, & de horum singulis seorsum scripsimus in tractatu qui de salubribus inscribitur. Omnia igitur nunc dicta genera materiæ quædam sunt salubriū causarum. At vsu opportuno adhibito causæ fiunt conseruatrices, atq; salubres: sed vbi à modo deliquerint, insalubres reddūtur. Vnde et liquet ex his

non alias preter has, aut salubres, aut
 insalubres a nobis existimari oportet
 easdem potius, quandoque quidem
 salubres, quandoque vero insalubres, in
 eo quod ad aliquid esse. Nam ubi mo-
 tum corpus desiderat, exercitatio quæ-
 dem salubris, ocium autem insalubre.
 quum vero eget quiete, ocium quidem
 salubre, exercitatio autem insalubris.
 Eodem modo de cibis, & potibus, &
 de aliis omnibus statuendum. Horum
 enim singula quando (ut necessitas
 corporis exigit) cum mensura, ac qua-
 litate opportuna adhibentur, salubria
 fiunt. at cum citra omnem necessitatem,
 ac præter modum afferuntur, insalu-
 bria. Atque hæc duæ sunt circa salubre
 & insalubre intentiones, rei scilicet quæ
 adhibetur qualitas, ac quantitas. Ne-
 que enim est rationi consentaneum,
 etiam temporis occasionem, quæ in
 his quæ dicta sunt continetur, veluti ter-
 tiū aliquod ab eisdem diuersum, intro-
 ducere. Si enim tali, & tanta re allata
 egeat corpus, nemini dubiū quin etiā
 in tempore opportuno afferatur occa-
 sio. Siquidem temporis inde ortum

habet, quoniā fluxibile, ac facile mutabile est mortale corpus, ac p̄ transformationis modo aliis alio tempore eget auxiliis. Quare nō est tertiū aliud quod p̄ter ea q̄ dicta sunt, tēpus. Sapius autem eo tanq̄ tertio quodam ob eā quā diximus causam ad docēdum vri consueuimus. Quoniā vero in his ipsis intētionibus, & alie causæ salubres, & id quod p̄positum est genus cōtinetur, rursus easdem repetamus. Optimæ igitur corporis cōstitutioni cū circūfusus aēr fuerit in tēperie positus earū rerū de quibns nup̄ diximus quietis scilicet ac motus, somni vigilię, & eorū quæ assumuntur, atque excernuntur, quātitas moderata conueniet. Cū vero aēr ā tēperie recesserit, tātū ā mediocritate euariare oportet quātus fuerit ab optima tēperātia recessus. Hi vero sunt mediocritatis termini, in aēre q̄dem ambiēte, vt neq̄ horreat p̄pter frigus, neq̄ sudet p̄pter æstū. In exercitiis autē, cum primum lassari cōperit corpus, cōfestim quiescere. In cibis autem coctionis perfectio, & excrementorum modus, in

quali, quantòq; conueniens, æqualis
 vero in his quodāmodo est coctioni
 appetitus. quare neq; præside egent,
 qui singulorum quæ assumuntur quā-
 titatem metiatur. Optima siquidem
 natura, quātum appetit, tantum etiā
 cōcoquit. Sic & somno modum ipsa
 natura præfinit, his qui optimam cor-
 poris confritionē sunt sortiti: & tūc
 à somno excitantur, cum corpus am-
 pliori quiete non eget. Cumq; talem
 victus rationem adhibuerint, nullum
 est in eorum excrementis delictum,
 quæ vel per ventrem, vel per vrinae
 meatus, vel per totum corpus egerun-
 tur. Nam priora quidē ex modo eo-
 rum quæ assumuntur temperantur,
 totum vero corpus salubriter perflari
 facit exercitii vsus moderatus. Lique-
 autē ab ipsis cauere oportere, omnes
 animi immodicos affectus, videlicet,
 iræ, tristitiæ, furoris, timoris, inuidiæ.
 Hæc enim alterant, atque à naturali
 statu corpus auertunt.

De venereis. Cap. lxxxvi.

Venereorum vero, iuxta Epicuri
 sententiam, nullus est vsus salu-

bris. Re vera autem cōfert, si tantum interualli. in eorum usu adhibeatur, vt neque resolutio aliqua sentiatur, & ipse se ipso homo quodammodo leuior factus, ac melius spirare videatur. Tempus vero ad vtendum opportunum, cum in excessuum omniū mediocritate corpus fuerit constitutum: cum scilicet neq; supra modum plenum, neq; vacuum extiterit aut in calore, aut frigore, aut siccitatē, aut humiditate excesserit corpus. q̄ si aberrare contigerit: paruus sit error. Melius autem illi calefacto, magis, quam infrigidato: & pleno, quam vacuo: & humecto potius corpore, q̄ exiccato vti venereis. Horum autem singulorum quæ dicta sunt, qualitas in optima corporis constitutione est eligenda. exercitii quidem in quo totius corporis partes æqua proportionē mouentur, ita vt non aliæ quidem ultra modum fatigentur, aliæ vero citra. cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Sunt nimis rature conuenientiores quæ optima fuerint prædita temperatura. Eadem in reli

quis etiam est ratio adhibenda. At si quod ab optima constitutione defecerit corpus, non autem vehementer, & hæ quæ ipsius sanitatem causæ conseruant, proportionē mutabuntur. Sed cum multa sint huiuscemodi corpora, per singula genera seorsum dicendum. Quod igitur in temperatura euariat, instrumētariarum autem partium seruat commodationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidem earum quæ ipsius conseruant temperaturam, alteram vero eam, quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optime tēperatæ nature distabunt quātum & totius corporis tēperatura ab illis euariabit. Calidiora siquidē corpora calidioris victus rationem exposcunt. Frigidiora autem frigidioris, & sicciora siccioris, & humidiora humidioris, ac secundū coniugationem calidiora, ac sicciora calidioris, ac siccioris, eadem in reliquis etiam coniugationibus proportionē seruata. Recte siquidem causarū vte

tur materia, qui naturales earum potentias agnouerit, veluti quod motus, defectus alimenti, vigiliæ, excretio, & omnes animi affectus corpus exiccant, at quæ his contraria existunt, humectant. Ita vero & calefacientia, & refrigerantia vitæ instituta, & ciborum, ac potuū, atq; vt simpliciter, dicam, omnium quæ corpori afferuntur, materias quis noscens, atq; potentias, salubribus vtetur causis, similia similibus afferendo. si quidē eius propositum fuerit in eodem in quo accepit, corporis seruare temperaturā. Quod si permutare, atque ad melius traducere statuerit, alterum est hic salubrium causarū genus, his quidem quas nuper diximus cōtrarium: equaliter vero declinans ad alteram partem, à bene temperatis, & mediis, quæ optimis conuenire naturis dicebamus. Calidior siquidem, ac siccior temperatura, à calidioris, ac siccioris victus ratione ad exactissimū bonæ tēperaturæ habitū minime transfertur. At taliū erit vsus necessarius, q̄ tantum eis, quæ bene temperata exi-

stunt, frigidiora sint, atque humidiora, quantum & natura naturam in caliditate, & siccitate superabat. nam tale causarum genus naturales corrigunt intemperantias, alterum vero de quo supra diximus temperaturam conseruat. Est autem vtriusque vicissim apud medicos vsus necessarius. nam cum plurimum suppetit ocii, corrigere oportet, ac sensim ad meliora transferre. Neque enim natura patitur eas quae subito fiunt alterationes: hominem autem necessariis occupationibus districtum, in eodem praestat habitu conseruare. Quo pacto igitur & hoc ipsum primum causarum genus conseruatiuum appellamus: nam forte magis alteratiuum, & curatiuum & naturalium defectuum correctiuum vocare conueniat. Quoniam ad vniuersum sanitatis genus referentes non ad eas quae secundum speciem differentias quaecunque sanos conseruant, conseruatiua omnia vocamus: siue praeter id quod sanitatem conseruant ad melius totam traducant temperaturam, si pristinum tantummodo habitum

bitum teneantur: at quæ deteriore
 statum efficiunt, insalubria. Quæcū
 que igitur similem habent in omni
 bus corporis partibus intemperiem,
 eadem egent procuratione: quæ vero
 dissimilem, dissimili. Nā fieri potest
 ut ventriculus frigidior sit q̄ oportet
 at, caput vero calidius, atq; vtrunque
 propriis egeat auxiliis, ac ratione ea
 dem singulæ aliæ partes cum fuerint
 aut præter modum humidiores, aut
 sicciores, aut calidiores, aut frigidio
 res, siue intemperiei victum exigunt
 accommodatum. Neq; igitur modo
 eodem omnes tales corporis partes
 exercebimus, neq; equaliter humecta
 bimus, aut exiccabimus aut tale aliud
 quippiā agemus. Plenius vero de his
 diximus volumine illo, quod de sal
 ubribus inscribitur.

De causis salubribus partium instru
 mentarium. Cap. lxxxvii.

Instrumentariarum autem par
 tium causæ salubres, quæadmo
 dum & hic ab optima constitu
 tione delinquitur, ita & inuicem
 distabūt. Aliæ enī sunt salubres erro

ribus qui in formatione consistunt, alia his q in magnitudine, vel numero, vel positu. In formatiōe igitur plures contingunt errores, nam & figura patris, & si qua in ea cauitas est, secundum naturam, vel meatus, vel orificium, vel asperitas, vel lenitas, quando a naturali mediocritate recesserit. Si quidem parum hoc patiantur: salubrium corporum retinent appellationem. si vero amplius insalubriū. Quod si tantus fuerit recessus, vt operationi afferat detrimentum, iā egrotare dicentur. Secundum quantitatem autem excessus, atque defectus ad eadem ducit differentias. In numero vero, siue vna, siue plures quæcunque ex similaribus partibus fuerint, aut deficiant, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt quæcunque in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cuiuslibet simplicis attinet partem, in quo & ipso quattuor sunt omnes differentiæ. prima quidem quæ optima existit: secunda vero quæ parum euariet, atq; ideo salubre adhuc

efficit corpus: & tertia quæ insalubre quando amplius à modo recesserit: & quarta quæ iam egrum recessu plurimo reddit. Quæcunque igitur partes in figura delinquant, veluti quæ blæxæ, varæ, & obliquæ appellantur: hæ quum nuper natus adhuc tenellus est, formatione, atque alligatione, ad naturalem traducuntur habitū. quòd si iam aucto infante ad duritiam pervenerint, emendari non possunt. Sic errores quidem qui ad cavitatem attingunt, cum adhuc augeri perseverant, correctionē admittūt. cū aut iā ad ultimum pervenerint, nullus est remedio locus. Cavitates igitur, quiete, atque alligatione parvæ redduntur. magnæ vero partium operatione, & spiritus retentione. sic & quæcunque foramina orantur. Et quidē quæ naturalē magnitudinem partes expurant, quiete, & accommodata alligatione minores redduntur, augentur aut & naturali motu & frictione moderata, quibuscumque aliis plus sanguinis attrahere natura aptis. Deficientes vero partes quæcunque ex sanguine ortū habuerint, corrigi quidem non est

AR S

impossibile. quæ autem ex semine, p
pemodum impossibile existit: licet ta
men aliquando loco eorum alia face
re quæ vsum haud dissimilem præ
stent. Earum vero omnium natura opi
fex est, medicus autem minister. Quæ
vero numero excedunt, his ablatio
causa salubris existit. inspicere vero
oportet in quibus id fieri possit. Nam
si impossibile appareat, transponere
tentandum est. Eadem est & eorum
quæ in situ vicia sunt emendatio. ne
que in obscuro est quod duo sapius,
aut tria vitia eadem partem possunt
occupare, sicuti in eo qui ventriculū
paruum simulatque rotundum, atque
aduersus septum habuit incumben
tem. In ipso etenim, magnitudo, for
matio, ac situs erant deprauati, tem
peratura quoque frigidior existerat,
hic nullo artificio ad naturalem ha
bitum transferri poterat: at ne aded
infestaretur erat remedio locus. nam
quoniam repleto ventriculo difficul
tate spirandi premebatur, minus ci
bi, at magis alimento opportuni, &
qui non difficulter subduceretur, ter

die assumebat. Alteri vero cui obstru-
ctio in hepate ob vasorum angustia
saepius contingebat, extenuas victus
pro remedio inuentus est.

De solutione continuitatis.

Cap. lxxxviii.

R Eliquum igitur id morbi genus
est, quod & similaribus & instru-
mentariis partibus commune existit.
Solutio scilicet continuitatis quā quis-
piam forte his vnquam adesse nega-
ret qui integra sanitate fruuntur, quo-
niam semper sit passio quem sane lae-
tet eandem in omnibus generibus fo-
re dubitationem. Nisi enim operatio-
nis laesio sensibilis, sanitatem ab aegri-
tudine separet, sed qualitatem tantū
modo dispositionis introspiciamus,
perpetuae passibilitatis dogma neces-
sario recipiemus, cum nullus sit qui om-
nes operationes optimas habeat. Sed
de hoc quidem, ut quod ad logicam
potius pertineat contemplationem,
seorsum consideretur. Salubres ve-
ro causas, ut his quos nemo dubitat
egrotare, deinceps percurramus à ma-
la temperatura exordium facientes.

t iii

Hic vero prius distinguamus quæ omnes ferè medici prætermittunt, alias quidem esse salubres causas eius in temperatura quæ iam facta est, alias autem illius quæ & adhuc fit, sicuti etiam alias eius, quæ futura est. Huius itaque postremæ, hæ quidem in præseruatiua artis parte continentur hæ vero in salubri. Primæ autem inter omnes incuratiua tantummodo, sed eius, quam mediam inter vtranque locauimus, in præseruatiua, & curatiua. Iam enim factam, atque existentem ægritudinem curare oportet: sed quæ nondum quidem adest, at futura est, prohibendum est ne fiat ab ea quæ est in corpore dispositio. Eius autem quæ adhuc fit, quod quidem factum est curare opus est: quod autem futurum, prohibere ne fiat. Prohibebitur autem sublata ea dispositione, quam sequi natura apta est. Talis vero dispositio causa antecedens appellatur. Facta autem ægritudo curabitur soluta ea dispositione à qua primum, ea quæ secundum naturam læditur operatio, quam qui

dam & ipsam morbi essentiam dicimus esse.

De communissima intentione curatiua.

Cap. lxxxix.

Curatio vero vnam præcipuam, ac communissimam habet intentionem, ad id quod est dispositio-
ni auferendæ contrarium. Ex hoc si-
quidem genere sunt causæ illæ omnes,
quæ sanitatem efficiunt. Secundum
partem vero, ex vnicuique dispositio-
ni contrariis. Calido igitur affectui,
causa frigida cōtraria existit, frigido
autem calida: eademque in ceteris pro-
portione. Etenim si omne imodera-
tū est præter naturā, moderatum ve-
ro secundū naturam: necesse est om-
nino, vt imoderatū ab imoderato cō-
trario ad mediocritatē redigatur. At
manifestū est quòd secundum poten-
tiam, non aut imaginationem: & ca-
lesciens, & refrigerās, & quæcūque alia
huiusmodi oportet assumere. Vo-
co aut scdm potētiam qđ re ipsa vere ta-
le existit, quale esse dicitur. Secundū
imaginationē autē, quod ex prōpto

c iiii

quidem sensu tale esse imaginamur, cum tamen vere tale non sit. Sed quæ sint hæc ratione distinguenda, diximus in his libris, in quibus de simplicium medicaminum potestatibus agitur. Ad inuentionem autem salubrium causarum, quæcunque quidem, ut ad eam quæ iam facta est ægritudinem, causæ salubres existunt, via illa doctrinæ utendum, qua id quod imaginamur, ab eo quod talem habet potestatem, separetur. Quæcunque vero, ut ad eam quæ adhuc fit, & hac eadem via, neque illa præterea, ex qua ægritudinem causæ, inueniuntur. Esto enim si ita contigerit in humoribus putrescentibus accendi febrem. Indicatio in huiusmodi est euacuatio, atque alteratio, hæc quidem quæ putredinem finiat manente adhuc substantia, euacuatio vero quæ totam ex corpore substantiam educat. Sed dicta quidem alterationis species concoctio existit, quam ubi inuenerimus à quibusnam causis fieri contingat, tunc utique eorum quæ hoc pacto salubria sunt scientiā tenebimus.

Euacuationes autem fiunt, & per sanguinis emissionem, & clysteris vsum, & per urinæ vias, atq; eam quæ per cutem fit trāspirationem, ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem, atq; ad alias propinquas derivationem. Nā & ad hoc idem genus pertinet citare menstrua atque ora venarum, quæ Græci hæmorroidas appellant, aperire, ac per palatum, naresque expurgare. Cum igitur & hic materias inuenerimus, quibus in qualitate, & quantitate, & modo vsus adhibitis, euacuatio fit, in ipsa artis parte salubria inuenientur, atque eorum omnium inuentio traditur in eo volumine, quod de arte curatiua inscribitur. Eadem ratione in aliis tribus intemperaturis, si vnum commune præceptum obseruabimus vt vnāquāq; prius quæ efficit causam rescindamus: deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus, causarum salubrium inuentionem faciemus. Secundū vero compositas intemperaturas ex simplicibus cōpositio cōmonstrabit

A R S

salubria praecepta, cum hic quoque studeamus pro magnitudine intemperaturae eidem conueniens inuenire remedium. Veluti si ita contigerit quod in decem quidem numeris ad caliditatem maiorem ea quae naturae conueniat, decidat corpus, septem vero ad siccitatem maiorem: tunc salubre cā in huiusmodi affectibus esse oportebit, decem quidem numeris frigidiorē septem vero humidiorē. Si igitur ipsi particulae patienti admoueat talis remedium: tātō erit frigidius, atque humidius, quantum exigit partis affectus iudicatio. Quod si particula affecta in penitioribus locis sita sit, machinari oportet insuper tale inuenire salubre remedium, cuius vis nequaquam in itinere antea saluatur. Si itaque calidius esse oportuerit, eo quod est moderatum, non solum tantam habeat caliditatem, quātam exigit morbus: sed ultra eandem mensuram tantum adiiciatur, quantum ex situ, ut pertinere possit ad locum patientem, sit necessarium. Si vero frigidius: non simpliciter tantum frigiditatem oportet

augere, sed & materia quoque prius est animaduertenda. Si enim crassa sit, non admodum poterit ad profunda penetrare: at potius cōtrarium præstabit effectum, spissando superficiem, atq; dēfando. At si tenuioribus partibus constet poterit sane plurimam subire pfundū. Idem in humectantibus, atq; exiccātibus accidit, in quibus crassitudo atq; subtilitas partiu substantiæ est inspiciēda. A situ qdem loci, vt nuper diximus iuenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, & situ simul, quando effluxus sensibiles, atque ad alium locum foraminibus patentes habuerit, aut his omnino caruerint. Quos enī effluxus ad principales deferri partes cognouerimus, auertemus: atque ad illas impellemus quæ nullum habent principatum. Illud vero manifestum, earum quod quæ intemperaturam efficiunt causarum, curatio fit p euacuationem. Nam ipsæ intēperaturæ sola alteratione sanantur.

Curatio solutionis continuitatis in parte carnosā. Cap. xc.

ARS

Continuitatis autem solutionis, curatio intentionem quidē habet vnionem, quæ in partibus quidem instrumentariis impossibilis est, in similibus vero non semper possibilis. At quandoque, sicuti in carnosissimis sanitas conglutinatione perficitur, nil vero differt, neque si coalitum appellaueris. Ipsam vero antecedit, quando vulnus maius extiterit partiū applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit. Vt autem hæc ipsa firma, ac stabilis fiat, & alligatio cogens in vnum quæ distant, & fibulæ, & futuræ vtilis sunt. Coalescere autem facit ea, quæ inuicem distant, ac pristinam restituit vnitatem ipsa natura. Nostrum vero opus est, vt diximus, applicare extrema distantium partium, atque ita vt in vnum coacta sunt, conseruare, & tertio loco cauere ne quid labris vlcis intercitat, & quarto ipsam partis substantiā conseruare salubrem: sed quo pacto & primum, & secundum impleamus officium, dictum est. Tertium vero in cogendo in vnū partes distantes ex-

quemur, si nihil extrinsecus incidere permittamus, quoniam sepius usu euenit, vt pilus, aut oleum, aut aliqua alia humiditas interueniens earum quę copulandę sunt, partium, unitatem impediat. In eo autem quod sequitur tempore per suffluxiones tertia intentio retinetur. Ipsam vero suffluxionem ex eiusdem, & contrarii loci diuisione, & figura opportuna comparandum. Partis autem substantiam salubrem cū mediocriter excipitibus conseruabimus. Hęc quidē est solutę continuitatis curatio, cum ipsa sola seorsum in carnosa parte constiterit. Quod si alicui alteri morbo coniungatur, plures sunt indicationum intentiones: quas in compositorum vel complicatorum, siue vt cuiq; appellare libuerit, doctrina trademus. In pręsenti autem sermone ad reliquas unitatis solutiones accedendum.

De solutione continuitatis in osse.

Cap. xci.

FRactio igitur est continuitatis in osse solutio: quę quantum ad in-

tentionem primam insanabilis existit: quoad secundam vero quodammodo sanabilis fit. Prima igitur intentio est coalitus partium, qui ob ossis duritiem fieri non potest. Secunda, alligatio quæ fit collo supernato partes fractas alligante. Calli autem generatio qua quidem ex materia, & à natura fit, est & ad alia communis. Qua vero formam ossi vicinam habet, ex eiusdem fit alimento. Molle vero, & puerile os coalescere potest. Sed perraro fit talis affectus, quin cum altero societur. Magna enim ex parte muscoli adiacentes unà corporibus aliis fractis ossibus partiuntur. Quare & curationis intentio oritur duplex, quarum altera quidem circa ossa, altera vero circa corpora adiacentia versatur. Sed hæc quidem in carnosarum partium complicatis dicetur affectibus, nunc vero de fractionibus dicendum. Quoniam enim harum sanitas callositate procuratur, ut callus generetur, proprii ossis alimenti superfluitatem naturæ suggerere oportet: hæc vero superfluitatem in qualitate, ac

MEDICINALIS. 152

quātitate ſeruare modū ē neceſſariū.
vnde & ratio victus ē adhibēda: quæ
tātū ac talē influere oſſibus ſanguinē
præparet, qualis, & quātus generādo
callo fit opportunus. Qm̄ vero p̄ fra-
cti oſſis cauernas idē effunditur ſan-
guis eiūſdē qualitātē, & multitudinē
aiaduertere oportet: atq; ita vel ſiccio-
rē, vel humidiorē victū inſtituere. S d
hæc oīa in libris, in qbus de curandi
rōne tractatur, pleni⁹ ſunt explicata.

De punctura nerui, & chordæ.

Cap. xcii.

Nerui vero, & chordæ punctura,
propter ſenſus vehemētiā, & quo-
niā hæc pars principio continuatur,
prōpta ē ad neruorū cōuulſionē exci-
tandā: ac tum præſertim, cū nihil ex-
trorſum expirat obſecato cutis vul-
nere. Aperiendū eſt igitur, atq; exiccan-
dū ſubſtātia tenui, q̄ vſq; ad ima ner-
ui offenſi poſſit penetrare. De his ve-
ro exacte dicimus ī libris de arte amā-
di cōſcriptis. In ſimplicibus qdē huius
generis affectibus ſalubriū cauſarū for-
ma talis exiſtit. In cōpoſitis vero cō-
plicatur vlceribus, prima qdē cāuitas,

A R S

quam non alterum affectum, sed vlc
ceris differentiā esse arbitrantur. Est
autem non differentia huiusmodi
res, sed alterum aliquod totius ægri
tudinis genus, in quo ipsius substan
tiæ iactura facta est. Et quidem cura
tio in duplici morbo, duplicem exi
git intentionem. Nam continuitatis
solutio vnitatis: substantiæ autem ia
ctura, generatione indiget. Paulo ve
ro supra generationis intētionem ex
positę sunt. Quòd autem primū qui
dem hūc affectum oporteat sanare,
demū vnitatē restituere tentare ipsa
rerū natura cōmonstrat. Cū itaq; re
pletū quidem fuerit cauū, vlcus vero
ad æqualitatē perductū, alterā inten
tionem aboleri cōtingit. Nam media
existente inter labia vlcis ea carne
quæ nuper est genita partes quidem
distantes vniri est impossibile, vnde
fit vt alia sit intentio perquirenda.
Intentionē autē consequemur, ex eo
quod est secundū naturam ipsi parti
comparando, erat autem eidem cute
obduci naturale. Quare hoc ipsum à
nobis procurandum, aut si hec intē
tio

rio effectum sortiri non potest simile
 aliquid cuti, carnem scilicet quę cutis
 naturę vicina sit, instaurandum. Est
 autem huiusmodi q̄ & sicca, & callida
 similitudinem prę se fert. Ad cicatri-
 cem igitur obducendam necessaria
 erunt exiccantia, ac sine mordacitate
 adstringentia medicamina. Ita & si
 sordities aliqua fuerit adnata inten-
 tio quidem erit abstergerendi, & erit
 medicamen salubre abstersiuum. Eo-
 rundem vero materiam in libris, in
 quibus de medicaminibus agitur, scri-
 psimus. Et quidem si aliqua inflāma-
 tio, vel attritio, aut tumor prædurus,
 vel mollis, & laxus cum vlcere fuerit,
 prius eorum curationi intēdere oport-
 tet, eas sequendo vias, ac rōnes quas
 prius exposuimus. Sic & si aliquid vl-
 ceri illabitur, ad illabentium, curatio-
 nem intendendū. Eodem pariter mo-
 do si aliqua intemperies vlceratū lo-
 cum obsederit, ad eiusdem intempe-
 rieci remedia antea veniēdum. Sed de
 his quidem satis.

De speciebus morborum secundū
 formationem., Cap. xciii.

Nunc vero trāseundum est ad formationis genus, quod in plures secatur differētias. At ab eo quod euidētissimum existit, exordium est sermonis faciendū, quod ex figurę permutatione cōtingit. In his igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurium partium figurā emendare: in his autē qui iam aucti sunt, in minime. Intentio tamē quoad fieri potest, curationem adhibere ad contrarium euerfionis, adducendo. Si vero frāctione aliqua non recte cōformata, alicuius mēbri figura fuerit vitia ta, cui substātia callosa īnāsci prāuenerit, si quidem hęc adhuc recens extiterit, perfringere oportet, ac rursus recte afformare, deinde callum superinducere.

De obstructione.

Cap. xciiii.

Est vero & obstructio ex eodē genere ægritudinum, quæ quidē ex lentis, & crassis humoribus fit, vnam & ipsa habens intentionem morbo cōtrarium. dico autem apertionem. Cause vero salubres sunt abstergetia, atq; incidentia medicamina. Quæ vero sit a stercore duro, quod intersepit

intestinum, primum quidē habebit
duritie remediū ex humidis, pingui
busq; clysteribus, demum ex acribus
euacuationē exposcet. Quę autē à lapi
de fit in vesica, in presenti quidē trās
positionē requirit, integrę vero sani
tatis causa incisionē, & extractionē.
Humiditas autē quę pręter naturā con
tinetur, sanatio in oīmoda euacua
tione cōsistit, quēadmodum etiam in
suppuratis. Immodica autē repletio
imodica euacuatione curatur, vt cū
sanguis intra venas redundat. Sic &
quibuscunq; in ventriculo, vel intesti
nis, vel arteria aspera vel pulmone,
pus, aut sanguis continetur, integra
euacuatio est necessaria: superflui autē
cibi, aut potus adhuc recentis assump
ptio euacuationē corrigitur. Quęcūq;
igitur in pulmone, vel pectore conti
nentur, cū tussi educuntur, aut à medi
caminibus extenuantibus. Quęcunq;
vero in hepate, vel venis, vel arteriis,
vel renibus, aut per vrinā, aut per ven
triculū. Sed per vrinā quidē, ab his q̄
vehemēter extenuant. per vētrē vero,
ad his quę attrahēdi, aut apiendi ora

vim hñt. Quęcunq; vero in superiori
 ventre comprehenduntur, per vomi-
 tum: quę autem in inferiori, per sub-
 ductionem. Sed quęcūq; sub cute per
 sectionem, vel ignem, aut per medi-
 camina adurentia. Sic vero aliquādo
 quęcunq; in aliqua naturali cavitate,
 vt in thora ce. Et vt summatim dicā,
 quicquid præter naturam ī aliquibus
 partibus continetur, sanationis intē-
 tio est ablatio: quę si fieri non possit,
 transpositio. Quę vero non sunt ex
 genere præter naturam, at quantita-
 te dñantur, in his intentio est abeua-
 cuatio. At inuētio eorum quę ad ip-
 sorum sanationem perducunt, par-
 tim quidem ex affectu, sed præcipue
 ex ipsis affectis particulis sumitur.

De asperitate & leuitate.

Cap. xcv.

Quęcunque partes vero ob id
 quod exasperatę naturalem
 amiserint habitum, his leui-
 tas naturalis est restituenda, ossa qui-
 dem leuigando, arteriam autem, &
 linguam leniendo, humidis quę ni-
 hil mordeant, & lentorem habeant.

sed quibuscunq; leuitas inest non na-
 turalis asperitas est reuocanda medi-
 camentis, quæ sufficiēter abstergāt,
 & parum adstringant. Quæcunq; ve-
 ro, vel obstructiōes, vel angustie mea-
 tum, alias sequūtur ægritudines, ab
 illarum curatione prius est incipien-
 dum. Ostensum siquidem est in libro
 de differentiis morborum, quod &
 inflammationibus & duris, laxisque
 tumoribus, & siccitatibus, aliquando
 immodicis, ac præterea vitiosis par-
 tium continentium figuris, ea quæ
 nuper diximus, sæpius adueniunt: si-
 cuti & quibusdam tumoribus eorum-
 que sunt in ambitu corporum. Quod
 si nonnulla ex proxime dictis inuicem
 complicentur, varias habebunt indi-
 cationes. Sufficiet autem in vno exē-
 plo habuisse sermonem, quoniā de
 omnibus in libris de arte curandi ple-
 nius sumus exequuti. Supponatur cui-
 piam particulæ multitudinem san-
 guinis influi, adeo vt intendatur in
 ea venæ, non maiores tantum, sed
 etiam parvæ, quæ prius sensum effu-
 giebant, nunc vero iam plenæ visu

comprehenduntur, sicuti plerunque
in oculis ob tunicæ albedinem mani
festissime patet: par siquidem ē quod
& alia vasa quæ latent sensum, iam
plena distendantur, nondum & ipsa
ob paruitatem visui manifesta: & iā
periculum imminet, ne quod ex va
sis exodat, ad spacia vacua, quæ in
medio sunt, effundantur, aut ne iam
paucum aliquod sit effusum. Huius
quidem affectus sanatio intentionē
habebit euacuationem, aut (vt mani
festiori vocabulo vtamur) abuacua
tionem: siquidem morbus erat im
moderata partis repletio. Necessariū
igitur est, vt aut superfluitas retroce
dens euacuetur, aut per ipsam patien
tem particulam. Retrocedet autem,
vel impulsā, vel attractā, vel transmis
sā, vel horum vno aliquo modorum
vel omnibus. Per locum vero patien
tem euacuabitur, partim quidē mani
feste, & sensibilibiter, partim vero in va
pores resoluta. Si igitur vniuersum
corpus plus æquo plenum fuerit, per
patientem locum minime euacuan
dum. Nam si sacrficationibus, aut se

tionibus sensibilibus euacuabimus. plus ratione excitati doloris at trahe-
mus. Si vero calefacientibus disper-
gere tentabimus, plus erit id quod vi-
caloris ad partem attrahetur, quam
dispersum. Quod si in eo elaborabi-
mus, vt quod influxit retrocedat, cor-
pus plenum non admittet. Ad hæc
igitur ambo totum corpus euacuare
oportet, aut omnino ad cōtraria lo-
ca retrahere quod patienti particulæ
influit: quo pfecto opere, prius à pte
repellēdū, mox dispergēdū. Quanto
enim p minora fit, tãto expeditior ē
euacuatio. A patiēte vero loco adstrī-
gēdo, ac refrigerādo, repellemus: sed
& exinanita loca attrahūt ad se ipsa
quęcūq; reperiūt. Hoc siquidem
ostēsum est in eo volumine, in quo de-
potentils naturalibus agitur, & vasa
præterea vigore ex medicaminibus
adstringētibus addito, a se ad alia re-
mittent. Si igitur hac via superfluum
oē retrocesserit bene se res habet. At
si aliqd fuerit in pte retētū, cōiectu-
rādū erit id lētū ac crassum existere:
atq; ea ratione iam coactum, atq; ad-

A R S

strictum, vt cum difficultate solui possit. Fieri autem potest, etiā si non eius naturæ sit, vt ad spatia quæ in medio, sit effusum: in quo casu tunc ad id veniendum esse tempus suadet, vt hoc ipsum quod reliquum est per patientem locum euacuemus, imponendo supra iacentibus partibus ea, quæ influentem humorem repellendi vim habent. Maxime vero euacuabis, si in spatiis intermediis aliquid contineri coniectura assequeris, & scarificationum auxilio, & medicaminum quæ vim habeant dispergendi. Sed quoniam hæc omnia vires calidas habent, eiusdem vero tēperaturæ opus est mordere quando modum excesserit, cauenda ex eis sunt vehemētissime calida, ac tum præsertim, cum patiens locus inter summa fuerit. neque enim paruus excitabitur dolor, si præter proprium affectum insuper mordeatur, omnisq; præterea dolor fluctiones commouet. Quodd igitur mediocrem caliditatem obtinet, in his sensum doloris non inuehit: atq; eo amplius omni dolore vacat, si hu

midum extiterit. Et quidem quicquid per summa hæret, potens est id medicamen dispergere: quod etiã validas non habuerit ad dispergendũ vires.

Quod si summæ quidem partes omni noxa caruerint, id vero quod euacuari oporteat in penitioribus partibus fuerit: intendendus, atq; augẽdus dispergẽtis medicaminis calor, cum dubitandum sit ne priusq; profundas attigerit partes, interim vires amittat: neq; tamen ex eo superiores partes aliquem dolorem sentient, cum omni vacent affectu. Quare nunc hæc duo simul inuitant ad calidiorum pariter, atq; acrium medicaminũ vsum, & summæ partes quæ tolerāt, & profundę quę egent. Hęc igitur ex patiente particula indicatio assumebatur.

Deinceps vero, si quid ad sanitatem deficiat, consideremus. neque enim paruum aliquid deesse videtur. Affectę partes in quibus fluctionis superfluitas retinetur, nonnullę quidem rare, & laxę, & molles natura existunt: nonnullę autem densę, & pressę, ac durę. Priores igitur facile euacuatur,

ARS

reliquæ autem acrioribus euacuantibus, ac præterea tenuiores partes habentibus, egent: atque eo etiam magis, quanto profundiorē situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit indicatio, altera à particulæ patientis substantia: alia vera à formatione simul ac situ. Supponatur enim, si ita contigerit, in hepate esse proxime dictum affectum, in angustiis vasorum finibus intrusis humoribus, qui vel lenti, ac tenaces, vel crassi existant, vel superabundent. Nonne in promptu est, primum quidem crassitiem, unà cum lentore, & tenacitate, cibis, ac potibus extenuantibus, ad subtiliorum partium substantiam transferri oportere: Secundo autem loco non per angustos, atque inuisibiles, sed latiores meatus quicquid infestum existit, esse euacuandum? Sunt enim in hepate venæ non minus amplitudine, quam numero excedentes: terminantur autem hæ quidem in gibbis ad venam cauam, hæ vero in cauis ad portam. Vnde haud difficile tibi futurum ubi cumque pressi, ac stipati humores fuerint

eosdem expedite euacuare, trahēdo
quidem ad ventrem cum his quæ at-
trahendi vim habent medicamini-
bus, quicunque ex ipsis in venis ad ca-
ua hepatis pertinentibus acervati, ad
vrinę vero meatus promouendo per
cauam venam quicunque in venis ad
eam pertinentibus sunt. Sed præter
supradictas alia est indicatio ab he-
pate ipso, veluti a venarū principio.
nam cum non tantum seipsum rege-
re natura aptum sit, vt pleręque ani-
malis partes. sed venis præterea virtu-
tem largiatur, periculum imminet,
ne si eius vigor madefacientibus, ac
relaxantibus, cataplasmatibus fuerit
resolutus: & ipsum primū, ad suū opus
atque omnes subinde venę eius ratio-
ne imbecilles efficiantur. Quare in eius
curationibus aliqua ex astringenti-
bus medicaminibus miscere oportet.
Sed quoniam in profundo ad-
modum loco situm est, dubitandum
erit ne astringentis medicaminis vis
debilitetur: nisi ab aliqua altera sub-
tiliū partium substantia, qualis aro-
matum est, traducatur. Melius vero

A R S

fuerit, si & ipsum adstringens medicamentum unum protinus ex aromatum genere fuerit: nam si duas habuerit natura insitas qualitates: ac potestates valentius operabitur. Et quidem euacuetur quod præter naturam in membrum confluit. Seruet autem humorum modum naturæ conuenientem. Quare & illa animaduersio à nobis est adhibenda, ne quid ab humoris confluentis qualitate, eiusdem membri temperies sit alterata, si pituitæ naturam tenuerit ad frigiditatem, si vero bilis ad caliditatem, ut hæc ipsam curantes intemperiem sanitati restituamus. Curabimus autem contrariam ex aduerso afferentes qualitatem: quæ admodum in intemperaturarum curationibus diximus, quantum unum, quodque calidius, aut frigidius factum est, tantum refrigerantes, aut calefacientes. Quare ut hic rursus agnoscenda est ipsius secundum naturam temperies. Nam quo pacto sciemus quantum in frigiditate, ac caliditate à naturæ modo recesserit, aut quando à frigefaciendo supersedebimus, si nos la-

tuerit ea quæ est secundum naturam caliditas: Ita vero & si frigidius effectum calefaciemus, ignorantes frigiditatis naturalis modum: neq; opportune calefacere, neq; in tempore à calefaciendo desistere poterimus.

De morbo secundum numerum.

Cap. xcvi.

SEd quoniã de his satis diximus, transire iam tempus ad ea in quibus numerus non est secundum naturam. Cum vero duplex sit eorũ differentia quibus quidem aliqua particula deficit his, intentio est alteram efficere subministrando naturæ, eo quo diximus paulo ante, modo. At quibus superabundat, hanc resecare oportet, aut ferro, aut igne, aut medicamine, quod vrendi vim habet. Hęc igitur omnia sanare possibile est: at non æque omnia generari possunt, vt in libro de semine diximus. Quædam vero sunt, quæ & si generari nõ possunt, licet tamẽ pro ipsis alterum efficere: quemadmodum in osse ex toto sublato, alteram substantiam in eius sede reponere, à carne, atque osse

A R S

differentem. est enim quæ in eius gignitur loco quædam veluti caro callosa vel callus carnosus, & processu temporis magis, ac magis ad calli duritiæ transfertur, cū ab initio carnis potius imitetur naturam. Quacūq; pte sublata, cum neq; eandem secundum speciem substantiam, neq; similem efficere possumus, tertia nobis intentio quædam decorem inuenire, quemadmodum in mutilationibus.

De morbo secundum magnitudinem. Cap. xcvi.

Communicat autē hoc genus totum cum eo quod ad magnitudinem pertinet. Nam quodcūq; ex eo est secundum naturam, illi propinquū existit. Id vero tantum seiunctum est, ac separatum, quod inter ea quæ sunt e genere non naturali cōnumeratur: in quo quidem prima intentio est ablatio. si vero hæc impossibilis existat, secunda est transpositio, quemadmodum in suffusionibus. Quæcūq; vero non integris partibus, sed partium tantummodo particulis deficiūt, aut excedunt naturæ modum: resectio

quidem, vel generatio in his quæ deficiunt, ablatio vero, & abolitio in his quæ superabundant. Quare neq; in ipsis altera inuentio, neq; medicaminum forma genere diuersa.

De morbo secundum situm.

Cap. xcviij.

Sed iam veniendum est ad reliquū salubrium causarum genus quod ea corpora emendat, quæ in situ sunt vitata: veluti luxationes, & intestinum in scorto. Fit autem hoc ex violenta tentione, atque impulsu. Hoc vero ex dilatato, ac rupto continente. Quare & duplex sanandi modus: alter quidem ad oppositam partem ei a qua facta est permutatio, intendendo, atque impellendo: alter vero id quod continet firmitus solidiusque reddēdo. Quibus vero viis, ac rationibus singula inueniri possunt, in libris de arte curandi explicauimus.

De causis præseruatiuis.

Cap. xcix.

Consequens est, vt ea omnia exequamur, quæcunq; in superiori

A R S

sermone dicere distulimus. Vocant autem eadem præseruatiua. Est autem horum triplex secundum genus differentia. Prima quidem hominis qui integra fruitur sanitate: secunda vero eius qui non integre valet: tertia eius qui agrotat. Primum igitur genus ad salubrem attinet artem, atque in duas, ut antea diximus, diuiditur partes: secundum vero ad præseruatiuam spectat: tertium ad curatiuam. Hoc autem vniuersum genus circa humores præcipue negociatur, quos neque lentos esse oportet, neque crassos, neque aquosos, neque plurimos, neque vehementer calidos, ac frigidos, neque mordaces, neque putredini obnoxios, neque veneni naturæ affines. Nam ubi aucti fuerint, generant morbos. Augentur vero nonnunquam eadem ex causa quæ ab initio generauit. Illud autem plerumque accidit, ut sua alteratione inficiantur eos qui sunt in corpore humores. Intentio vero, & horum sanationis duplex existit, alteratio, atque euacuatio. Alterantur igitur, vel ab ipso corpore concocti, aut ab aliquibus

aliquibus aliis facultatibus quæ vim medicaculam habent: è quorum numero etiam sunt ea quæ exitialium ferarum venenis aduersantur, ac præterea pharmacha quæ venena appellantur transmutant. Euacuantur autem satis calidis medicaminibus, & purgationibus, & clysteribus, & sudoribus, & vomitibus. Hæ quidem igitur sunt cōmunes euacuationes. Propriæ autem ex locis in quibus coaceruantur, assumuntur, vt in libris de salubribus ostendimus: tertio præsertim, ac quarto, in quibus de lassitudinibus egimus, ac reliquis dispositionibus quæ lassitudini natura proxime sunt. Proptius enim euacuantur per ventrem quęcunq; in primis venis continentur superfluitates. quæ autem in his quæ in hepate sunt, per vrinæ meatus. at quæ in toto corpore, per sudorem. sicuti quæ in capite, vel per palatū, vel per nares, vel per vtrunq; quæ vero sunt in spatiis pectoris laxioribus, per guttur simul cum tussi. quæ in renibus sunt, vel vesica per vrinam. At trahēdi ex omni loco ad oppositas partes

communis indicatio est, ad quam maxime distantia. deriuatio vero ad vicina. Quæcunque vero huiusmodi curât dispositionem causas salubres appellamus: sicuti insalubres eas quæ adaugent, & neutras quæ neque ob sunt, neque iuuant. Posset vero quispiam, neque omnino causas appellare, quemadmodum maior pars philosopharum, qui rerum quidem differentiam inuenire contemnunt: plurimum vero temporis in nominibus conterunt, contra quos in aliis vberius differuimus. At pars quidem artis præseruatiua talis est.

De parte artis quæ conualescentes reficit, & senibus congruit.

Cap. c.

Quæ autem reficit, atque restau-
rat, in conualescentibus, ac senibus locum habet. Quæ vero sit horum dispositio, & a quibus præcipue causis, ad naturalem redu-
citur habitum, in libris in quibus de
medendi arte tractauimus, abunde ex-
plicauimus, sed nunc per capita dice-
tur. Dispositio quidem igitur talis est

optimus quidem, sed exiguus est sanguis, atque una cum ipso spiritus animalis, atque vitalis. Ipse vero particulae solidae ficciores, & idcirco eorum vires sunt imbecilliores, atque earundem ratione corpus vniuersum frigidius. Causae vero salubres quae hanc emendant dispositionem, ut vno comprehendam capite, sunt quaecunque praesentaneum, atque securum exhibent alimentum. Secundum partem autem, in motibus moderatis, & cibis, potibusque, ac somnis consistunt. Sunt vero motus materiae, vehiculae, ambulationes, frictiones & balneae, & ubi non parum se ex his processibus se senserint, paulatim se ad consueta opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem humidos, & concoqui faciles neque frigidos, ac cum progressi fuerint, eos et qui plurimum praestant alimentum. Potus vero opportunus est vinum, etatem quidem habens mediocrem, in substantia autem purum, atque plucidum: quod scilicet vel subflauum, vel subalbum existat, atque suauiter oles. gustum vero, neque aqueum omnino, neque cum

aliqua insigni qualitate, aut dulcedi-
ne, aut acritudine, aut amaritudine
sentiatur. Vt autē proxime diximus,
de hisce omnibus in libris de arte cu-
randi cōscriptis, plenius disseruimus.
Nunc enim neq; omnia particulatim
recensere est nostri propositi institu-
tum, sed solum capitum mentionem
facere intendimus, eorum quę in aliis
voluminibus latius explicauimus.
Quorum omnium si prius, & nume-
rum & qualitatem exposuero, finem
libro imponam. Diximus itaq; prius,
quòd alter est liber in quo de constitu-
tione artis medicinę disseruimus: an-
tecedunt autem eum alii duo de con-
stitutione artium, sed hi quidem vnā
cum hoc cui nūc extremam manum
adiecimus, seorsum sūt ab aliis libris
in qbus plenior doctrina explicetur.
Illi vero talem inter se ordinē habēt.
De elementis quidem secundum Hip-
pocratem liber vnus. Post hūc autem
tres de temperaturis, ex quibus quidē
duo sunt de temperaturis animalū,
tertius vero de his quę simpliciū me-
dicaminum sunt. Quam ob rem &

tractatum illū in quo de simplicium medicaminum potestatibus agitur, nemo recte intelligentia assequi potest: nisi prius tertii libri de temperaturis integram cognitionē fuerit adeptus. Est & alius liber parvus qui ordine sequitur duos priores alios de temperaturis. inscribitur autē de inæquali temperatura. Similiter autem, & hūc alii duo parui, alter quidem de optima corporis constitutione, alter de bono habitu. Alius vero tractatus est qui tres complectitur libros de potentiis naturalibus quē si quis legere velit, post librum de temperaturis, siue post librum de elementis, vtrunque erit consentaneum. Post hunc in pluribus aliis libris de operationibus animalibus disseruimus. sed quoniam ad earum demonstrationes non parum conferunt quæ per sectiones ostenduntur, in illis exercitari oportet. Est autem maxime inter alios utilis ille tractatus qui de sectionum aggressibus inscribitur. Alii autem sunt post eum plures, duo quidem de discordia sectionis, vnus vero de sectione mor-

tuorū: post quos sequuntur hi in quibus agitur de sectione viuorum. In aliis vero quibusdā particulatim ob eos scripsimus qui introducuntur de ossibus: sectio quoq; musculorum, & neruorum, & arteriarum, & venarum, & quædam alia huiuscemodi ex eodem numero existunt. & liber etiam in quo quaritur nunquid in arteriis continetur sanguis naturaliter. Qui vero earundem partium operationes demonstrant, duo quidem sunt de motu musculorum: tres autem de pectoris, & pulmonis motu: post quos sequitur liber de causis respirationis, post hunc liber de voce. De principatu autem animæ, & de omnibus aliis quæ de naturalibus, vel animalibus operationibus in questionem trahuntur, in longo volumine scripsimus, qui de dogmatibus Socratis, & Platonis inscribitur. At eiusdem generis contemplationem pertinet liber, de semine seorsum cōscriptus, & amplius, de sectione secundum Hippocratem: quos omnes ordine sequitur tractatio de vtilitate partium.

Ad dignoscēdas autem ægritudines, utilis est liber in quo de membrorū passionibus agitur. itidem & ille in quo de pulsibus scribitur, in quo & præcognitiones edocemus. Librum vero de pulsibus præcedunt alii duo, alter qui de usu respirationis, & qui de usu pulsuum. Is vero de pulsibus in quatuor diuiditur partes, primam quæ eorum differentias, secundā quæ dignotiones, tertiam quæ eorum causas, quartam quæ illam quæ per eosdem fit, continet præcognitionem. Ex eodem genere est ille qui his qui introducuntur, de pulsibus scriptus est. At vero in animo est alium scribere librum, veluti quoddam omnium istorum, compendium, quem inscribam, vel artem de pulsibus, vel compendium. Ad hanc quoque iuuant contemplationem, quæ à me exponuntur, & simul iudicantur in libro Archigenis de pulsibus. Ad præcognitionem autem plurimum confert liber de crisi bus, idest decretis nature, quæ præcedit alter de decretoriis diebus. Sed liber et qui de difficili hanc

A R S

litu inscribitur, & ad dignoscendum
 præsentem affectum, & ad præscien-
 da bona, vel mala quæ ægrotati sunt
 euentura, conducit. Hi igitur omnes,
 atq; vnà cum ipsis tractatus quidam
 vno tantum libro cōprehensi cogno-
 tu vtilis sunt, sicuti illis qui de præin-
 cipientibus causis inscribitur, & de
 medicinali experientia, & de exte-
 quante victu, & qui de uenarum se-
 ctione ad Erasistratum, & qui de tu-
 moribus præter naturā, & qui de mul-
 titudine, atque alii præterea similes.
 Præ cæteris autem ad curandi scien-
 tiam maxime necessarius existit qui
 de morborum differentiis agit, & de
 accidentibus, & tertius præter illos in
 quo morborū causas, explicauimus:
 post quos sunt tres alii qui acciden-
 tium causas explanant. sunt etiam de
 medicamentorum simplicium viri-
 bus libri, de quibus supra meminimus,
 & qui de medicamentorum compo-
 sitione: quos sequuntur libri de arte cu-
 randi, his qui de salubribus inscribun-
 tur, seorsum à nobis cōscriptis. Quod
 vero ante hosce omnes prius exerci-

tari oporteat, in libris de demonstratione. Si quis hanc artem cum ratione sit tractaturus, monstratum est à nobis in libro qui de optima inscribitur hæreſi. De aliis autem libris, & commentationibus à nobis scriptis, transigere nūc minime necessarium, cum de hisce omnibus alibi simus tractaturi in vno fortassis, aut duobus libris qui ita inscribentur, Galenus de voluminibus ab eo inscriptis.

FINIS.

HIPPOCRATIS COI DE
MEDICO, MEDICIVE
OFFICIO, LIBER.



ITERA quidem medici moderatio est, prostasiaue, mandatumq;, quo pacto medicū munus parari, tractari, & exerceri conueniat. Medici quidem moderationem, prostasiamue hanc esse ducimus, prospicere, quatenus suapte natura possit, corpore sano, validove, colore optimo, habitioREQ;

HIPP. DE MEDICO

vti esse studeat: siquidem vulgo cense-
tur, qui male sui corporis curā habe-
at, ceteros non bene curaturum. Præ-
terea corporis mundicia, vestiū non
suspectis ad omnia odorem vta-
tur, quod languentibus gratissimum
est. deinde prudenti, pudenti, & inte-
gro animo, moribusq; esto. Non solū
taceat quæ tacenda sunt, mores autē
probi & optimi sint: sed etiam quan-
tum ad vitam pertinet, moderatam,
benēq; dispositam habeat, quod plu-
rimum ad auctoritatem comparan-
dam facit: mores autē probi & opti-
mi sunt, quod omnibus colendū &
amandum reddit. Petulantia nāq; &
garrulitas despicitur, & si admodum
vui, utilis ve videatur, & sit: faculta-
tes autem, opes ve respectato, cōfide-
rato ve, quæ apud habentes raro æsti-
mantur, amantur ve. Schemasi vero,
formis ve, siue figuris, gestibus ve cō-
positis languentes addito: prudentiā
quidem vultus præ se ferat lenem, mi-
tem ve, non asperam, acerbam, ama-
ram ve: nam hoc non probi, sed im-
probi & audacis, hominisq; perosi,

MEDICINE OFFICIO 166

spernentisq; esse videtur. Qui autem
 in risum solutus est, & nimis letus est,
 molestus languentibus est. Quam ob
 rem medium seruat, parq; & aqua
 bilis in omni consuetudine esto: nam
 languentibus paritate quadam, & iu
 stitia in multis succurrendum est nec
 parua est conciliatio, beneuolentia ve
 languentium erga medicos, si quidem
 totos sese illis dedunt. Præterea medi
 cus omnibus horis, foeminis, virgini
 culis, rebusq; non parui momenti oc
 cursat, quibus oibus manus, oculosq;
 abstinentes habeto, sicq; & corpus &
 animum paratū, dispositum habeto:
 mandata vero, præcepta ve, quæ ad
 medicam artē pertinent, per quæ eius
 artifex dicendus est, hæc sunt, vti cum
 discere, medicāq; artem exercere cœ
 perit, studeat, discat, sciant ve, quæ ad
 munus medicū pertineant. Primum
 habitationis locum agro cōmodum
 deligat, quo nullus malus ventus mo
 lestet, solisq; lumē, splendor ve per or
 tum non deferat. Lumē enim procul
 & perpetuo tenore lucens, & his q; cu
 rant necessariū est, & his qui curant

HIPP. DE MEDICO

tur molestum. Lucemq; eam omni-
no sectetur, quæ nihil oculis officiat,
noceatue. Lumē autem, uti sectemur,
mandatur quod contra faciē visum
que non sit, nam aciem oculorum de-
bilitat, perturbatque: minima siqui-
dem causa debilitatos oculos per-
turbat, lumine itaque sic utatur. Se-
dilia postea æque alta habeto, ut qui
in illis sedeant, sibi æqualiter conue-
niant respondeantue, nihilque æne-
um habeto præter instrumenta ad
rem medicam necessaria. Siquidem
hic lux molestus, & ambitiosus mi-
hi videtur his apparatus, vasibusue
uti. Puram autem, limpidam, bonā,
potui commodam his qui curantur
aquam præbeto. Linteis autem pan-
nis quibus tergantur, mudenturue,
puris, mundis, mollibus, utitor: caus-
sa autem oculorum ad oculosue te-
nuibus, mollibus linteolis, spongiis
autem ad vulnera: hæc enim per sese
probe auxiliantur. Cuncta autē in-
strumēta vsui necessaria parata sun-
to magnitudine, pondere, tenuitate,
subtilitateue cōmoda. quæ vero por-

MEDICINE OFFICIO 167

riguntur cuncta vti conferant, operā
 dato, potissimū autem quæ parti ali
 cui laboranti admouentur: quæ sunt
 vincula, medicamēta, circaq; vulnera
 liteola, lineamenta ve, emplastra, lini
 menta ve. Hæc enim plurimū tēporis
 in partibus, & locis affectis cōmoran
 tur: siquidem post hæc, horum remo
 tio, refrigeratio, perpurgatio, aqua
 rum ablutio, parui cuiusdam tempo
 ris sunt. Si quidq; præterea aliud plus,
 minus ve alicubi peragendum sit, cō
 siderato. Hæc enim si fiant vel non
 fiant, cum vsus est, magnam habent
 differentiam: colligatio quidem, deli
 gatio ve, peculiaris & propria est me
 dicæ artis qua deligatus iuuatur. Hæc
 autem duo potissimum profunt, qui
 bus crebro vtendū est præmere, strin
 gere ve, cum & vbi oportet laxiusq;
 superligare. quo autem ad anni tem
 pora, quādo supertegere, optimeque
 conuoluere, & quando non oporteat
 diligenter considerato, ne quauis ho
 rum obliuione lædatur, debilitetur ve
 languēs, vel quod affectum est, quod
 cum vsus fuit, factum non est. Super

HIPP. DE MEDICO

ligationes autem, deligationes ve pulchras, spectandasq; cōtemnito. Molestum enim hoc est & ostentatorium, iactabundū ve, sapiusq; curatū lædit: languens enim vtilitatē non ornatū captat. Manuum autem opere chirurgiæ ve est, quæ secanda vel vrēda sunt celeriter, vel tardē pro vsus necessitate peragere: quæ æque laudantur. Nā horum vtrorūq; vsus est, quoniam in quibus opus est vnica secatione, manuum opera celeriter peragatur, diuisio, separatio ve, siue secatio prodest. Siquidem quod sectos iuuat vel molestat perneciter, celeriter ve tollitur: quare hæc ne differto, hoc enim pernici, celeri ve secatione, veniet. Cum autē plures incisiones fieri necesse est, tarda manū opera vtitor: celer enī in his continuū & multum laborem dolorē ve facit. Quod si aliquatenus intermittat, languentibus aliquam requiem dat: quod & de instrumētis dicatur, scalpris, gladiolis ve latis, excutis vtitor: sed hoc non in omnibus æque mandamus. Quædam enim corporis partes sunt, quæ celerē sanguis

anis fluctione faciunt & habent, quod non facile comprimitur, cōpescitur ve, quēadmodum sunt varices, quædāq; aliæ venæ, quæ non late secandæ aperiendæ ve sunt, nunquā enim defluere cessarent, sanguinem tamen ex his mittere confert quandoq; sed in locis non periculosis, & in quibus sanguis tenuis non est scalpris latioribus utitur: sic enim latius defluet, & copiosius, minime autem aliter: turpe quidem est valde cum ex manuū opera, chirurgia ve quod quis velit, non evenit. Cucurbitularum vero modi duo sunt vtilis & in usu, nam cum destillatio reuma ve, pcul à superiore carnis parte colligitur, circulus huius parvus sit, nec ventriosa, sed oblonga sit, manibus uti melius tractetur, nec grauis efficiatur. Talis enim si sit, saniem ex carne ad supiora recta melius trahet, maiore vero dolore, labore ve per carnem sparso: alteram similem facito, circulum autem maiore huic circūducito: sic enim ex pluribus partibus quod molestat ad locum quem oportet, eam adducere inuenies. Non

HIP. DE MEDICO

enim oportere putatur magnum cucurbitulæ circulum esse, cum ex pluribus locis humores caro non traxit, quæ si grauis sit, de superiore ad inferiora detrudet, cum cōtrā expediat, sæpiusque morbos relinquit: siquidem cum destillationes, reumata ve subter & procul à superioribus locis colliguntur & consistunt, lati magni ve circuli multa de reliqua carne trahunt, & conuellunt: quod facit, vti humiditas illuc deducta ad collectam in loco inferiore saniem addatur, quæque vexant, relinquuntur. quæ vero nihil molestant, demantur & auferantur. Quænam cucurbitulæ magnitudo vsui sit, de corporis parte, cui ad mouenda est, considerato coniecturæ ve facito. Cum vero locum pertruderis inciderisue, de parte inferiore sanguinem trahito, & excipito. Sanguis enī pateat oportet in locis manu tractatis, alioqui circulum contractum ne pertundito: caro nanque laborantis tenacior est. Scalpris autē, gladio, lis ve recuruis retortis ve in summo vtitor: nec valde angustis: nam sanies quandoq;

MEDICIVE OFFICIO 169

quandoq; crassa, & glutinosa exit, q̄
si in angusta pertusioe remaneat, sub
sistatue, periculum est. Quæ autem ve
næ in brachiis sunt, compressionibus
captentur, nam caro quæ tegit venas
in multis venæ non bene quadrat, co
aptaturue: cum enim caro fluxa sit,
per eam sæpe vtrarumque fallit inci
sio. Tecta siquidē, vena sufflatur, san
guinique defluxus impeditur, pluri
mis autē & puris, saniei ve, quapro
pter in hac re insistito. Si quidem hæc
duo detrimenta talis manuum ope
ra chirugia ve defert, secto quidem
dolorem, laborē ve, secanti vero par
uam gloriam, honorem ve, sed sum
mum dedecus: quod & in omnibus
seruari, fieri ve mandatur. Quæ qui
dē in munere medico necessaria sunt
instrumenta. quæque eum scire oport
teat, qui hanc artem didicerit, profi
teaturq; hæc sunt. quilibet enim, dē
tiū volsellis, odontagresimve, & vuē
volsellis staphylagresimue scit uti: nā
earū vsus simplex ē, & facilis. De tu
berculis aut, h ulceribusq; quæq; ma
iorū morborū sunt maius negotium

Y

HIPP. DE MEDICO

est. Tubercula. siquē posse discutē, collectionesq; eorū cōpescere, magis artificiosum est. cōsequens autem est hęc in patentem, & paruum locum deducere, tuberculiq; coactionem collectionemue planam, æqualemue reddere. Nam si plana, æqualiaue non sint, periculum est ne dehiscant, hūculusque cum difficultate curetur, saneturue. Quare cuncta complanentur, coæquanturue, maturenturque, nec ante pertundantur, aperianturue, sua nec sponte dehiscere sinantur, q̄ matura sint. Quæ autem hoc faciant, in aliis dictum est. Quatuor autem vias hūlcera habere vidētur, quarum vna tendit alte, in profundumue, quæ fistulosa sunt, quæque sub cicatrice putria, & intrinsecus caua sunt: secunda autem in altum, & superna tendit, quæ supercrescentem carnem emittunt: tertia vero late spargitur, quæ serpentia hūlcera dicuntur: quarta sola naturaliter mouetur, & procedit. Hæ quidem sunt carnis calamitates, quibus omnibus fermē eadem conferūt: quorum quidē, signa in aliis de-

MEDICINE OFFICIO 170

monstrata sunt, quòue pacto curentur, quòue congestum conflatumue discutiatur, plenumque vacuetur, cauum compleatur, quodque in latum tendit, de core còpescatur, deque horum signis, notisue, & curatione, in aliis dictum est: de linimentis vero seu emplastris, cataplasmatibus sic habet Linteorum quidem quæ superponuntur, præcipuus & accuratus usus esto qua morbo & hulceri commodum erit superponuntur. Circa vulnus autem emplastro, cataplasmateue utitor, quod eius usus artificiosus est, quodque plurimum prodest, quod circumponitur. Nam quod circumponitur, vulneri, hulceriue adiuumento est. Linum autem seruat, quæ quidem extra vulnus, hulusue sunt, cataplasma, seu emplastrum linimentumue adiuuat. Horum autem usus, talis esse debet. De temporibus autem quibus hæc usui esse debent, facultatesque viresue quemadmodumque hæc quæ scripta sunt, discenda & exequenda sunt, nunc prætermittitur: quoniam rei medicæ plurimam & longiorem procura-

y ii

HIPP. DE MEDICO.

tionem exigunt, quæ plurimum artē
excessit. Horum autem consequens
est de vulnerum, quæ in militia, be-
li sue fiunt, manuum opera, chirur-
giæ dicere, telorumque spitulorum
ue extractione, quæ in urbium obsi-
dione, expugnationeue cadunt. Sed
horum paruus est vsus, nam raro lon-
gōque tempore ciuiles, & hostiles ex-
peditiones fiunt, sapius hoc in publi-
cis, seu generalibus expeditionibus
euenit. Quam ob rem qui manuum
opera, chirurgiæue i his volet uti, hos
sequatur, cumque his tanquam com-
milito degat, & militet, sic enim me-
lius in hac re sese exercebit. hoc profe-
cto videtur eē circa hæc, aut de his ar-
ticiosius dixisse. Signa vero telorū
existentium, prompte, cumulatue co-
gnoscere pars est artis maxima, cir-
caque hæc manū operæ, chirurgiæ
ue. quod si inerit, nunq̃ saucius igno-
ratus præteribitur, cum non rite cura-
tur. Solus enim horū signorum peri-
tus, his, quemadmodum decuit, ma-
nus admovebit. De his autem omni-
bus, in aliis scriptum est.

HIPP. DE LEGE 171
HIPPOCRATIS DE
LEGE LIBER.



EDICA quidem ars
cunctis profecto arti-
bus præstat, sed eorum
inscitia, qui ea vtuntur
ac eorū iudicio, qui his
de hominibus non bene lentiūt, cun-
ctis iam artibus inferior habetur. Ho-
rum autem erratio hanc mihi potis-
simam causam habere videtur: quo-
niam soli medicæ arti nulla alia pœ-
na in vrbibus posita est & irrogata,
præter quā vituperationis, infamiæ
ve: quæ quidem errantes non punit,
qui psonis maxime similes sunt, quæ
in tragædiis producuntur. Figuram
autem, formamue & habitum eorū,
quos agunt, habent, tamen illi non
sunt: sic medici plurimi quidem ver-
bis, sermone, famaue sunt, opere au-
tē, & re vera ppauci. Nā qui vere me-
dicæ artis cognitionē, prudētiāue sibi
paraturus est, commodeue ad eam
se accinget, hæc nanciscatur & ha-
beat oportet: Naturam, ingeniumue,

y iii

HIPP. DE LEGE

puerilem disciplinam, bonos mores, laboris amorem, tempus. Primū quidem omniū, natura, ingenioe opus est. natura enim repugnante & contrafaciēte, cuncta cassa & vana sunt, quæ si ad optima ducat, scientia artis facile paratur & fit, quam cum prudentia acquirere oportet, discēdo in puerili ætate loco ad disciplinam cōmodo, laboris autem amorem, laboriositatemue in multum, longumue tempus producere & conferre. Disciplina hæc vti naturaliter insita videatur, dextereq; & opportune maturos fructus ferat, cuius similitudinē & in his, quæ terra gignūtur videre est. nā nostra natura, seu ingenium tanquā seges & ager est, doctorum vero præcepta, dogmataue, semina sunt: disciplina autem & scientia puerili ætate comparata suo tempore est semina in segetem, agrumue sationi paratū iactata fuisse. Locus autem, quo discitur nutrimentum est aeris, quod segeti & satis accedit: laboris vero cupiditas est opera, tractatioe, & subactio agelli: tempus autem hæc om-

nia corroborat, pleneque nutrit, præbetue quæ ad medicam artem, verâque eius cognitionem conferunt. Sicque hi, qui per vrbes vagantur & versantur, nō solum verbis & sermone, sed opere & re medici censebuntur. Nam ignoratio & imperitia malum conditorium, & thesaurus est, malūque depositum his qui habent, somniumque est & eius quædam imago, cognitionisque veræ, prudentiæque expers est, timiditatisque & ignauia & audaciæ nutritrix. Timiditas enim & ignauia præ sese impotētiam fert, sed audacia artis ignorationem. Duo enim sunt, scientia, persuasique & opinio quarum altera scire facit, secunda autem ignorare. Hæc itaque cum sacra sanctaue negotia sint, sacris, sanctisque viris demonstrantur, prophanis vero fas non est, priusquā disciplinæ sacris initientur.

y iiii

HIPP. DE SPECIE
HIPPOCRATIS, DE SPE-
CIE, ACIE VISVVE, ET
OPSIOS OCULO,
RVM CORRVP-
PTA, LI.
BER.



Vm quidem species, aci-
es, & visus oculorū sua-
pte natura, spōteue cor-
rumpuntur, veneti co-
loris, cyanitidesue fiunt
quod cum venit, curationem non su-
scipit. Quæ vero maris coloris tha-
lassoideesue fiunt, sensim longo tem-
pore perduntur, corrumpunturue,
sæpeque longo tempore alter oculus
perditur corrumpiturue. Quamob-
rem huius caput purgato, venasque
penurito, quique sic per exordia cura-
tur, huius malum sistitur, in peiusque
non procedit. Quæ autem inter ve-
neti marisque colorem sunt, si quidē
puero fiant, cum adoleuerit, sistuntur
& abeunt: sin autem septē annis ma-
iori, melius admodum magna, cla-
ra, proculque videt, non tamen clare

perspicit, si quidque admodum oculis admoueat, aliud vero nihil. Huic purgatio capitis perustioque conferret. sanguinem vero his mittere non confert nec in colore veneto, nec marino. Lumien autem in oculis sana specie & acie puerorum mas foeminaue sit, crescente adhuc corpore, nunquam iuueris. Cum vero non crescet, oculum spectato, palpebralque radens extenuato, sicque egere videatur, & intus vrito ferramento non admodum candenti seu ignito, deinde crura distendito colligatoque, sellamque mensulamue subterponito, qua manibus firmetur, medium aliquis teneto, postea scapulares venas captato, considerato, consignatoue, deinde crassioribus ferramentis plaide perurito, ne sanguis cum vres prorumpat. Sanguinem vero, si tempus videatur ante mittito, posterioraque ad os usque perurito: postea spongiam oleo tinctam oleatamue superponito, & inurito non valde ad os usque: si vero spongia vstione causterioue consumeretur, pinguiorem & crassio rem

HIPP. DE SPECIE

alterā indito & inurito, postea melle tinctum arum superponito. Cum autem venam penitus non vsseris, cū crusta decidet, similiter vena tēditur, tumet, completur, salit, pulsatur, cū sanguis subterfluit. Si vero penitus vsseris, minus hæc omnia patietur. Quid si primo minus perusseris, rursus perurito, spongiamque vehementius super venam fluentem positam perurito. Crustæ namque bene perustæ citius decidunt, cicatricesque ad os perustæ pulchrius veniunt. Cum autem vbera sanescunt, rursus inflantur, tolluntur, rubent plusquam cætera: sicutique eleuatae tumentesue comparēt, donec tempus superueniat transeatue, capite, pectore perusto similiter toto corpore vbi quid perustum sit. Cū autem oculi palpebras rades, tergesue, milesiæ lanæ puro flore circa summum conuoluto, radito tergitoue, coronamque oculi conseruato custoditoue, neue ad cartilaginem vsque peruraras caueto. Signum autem erit te satis vssisse terfisseue, cum sanguis non syncerus purusue, sed cruenta aquo-

saue sanies defluet. Tunc medicamen-
to linimentoue aliquo, in quo æris
flos sit, linito: post autem vstionē tera-
sionemque cum crustæ deciderint, vl-
ceraque purgata fuerint pullulabunt
quæ, lineam per verticem, frontisue
supremam partem ducito, secatoq;
cumque sanguis defluerit, medica-
mento quod sanguinem sistat con-
glutinetue, linito. Huius autem & om-
nium vltimum siue primū opus est,
caput purgare, palpebrasque cū cras-
siores turgidiore sue sunt, quàm sua-
pte natura esse consueuerint, subter-
secare quàm lenissime potest. Postea
ferramentis non admodum canden-
tibus conseruata non læsaue pilorum
natura radiceue superurere, tenuiue
æris flore perusto spargere: cum vero
crusta deciderit, sicuti cætera curato.
Cum autem palpebræ scabie labora-
bunt prurientue, æris floris glebulā
cote terito, deinde palpebras eo lini-
to spargitoue, postea squamā æris te-
nuissime tritā succo vux æcerbæ pco-
lato, vase rubri æris commisceto, do-
nec sicuti moretum, polētaue crasse

HIPP. DE SPECIE

scat: postea cum aruerit, trito tenuiter
 vtitor. Lusciosus nyctalopusue me-
 dicamentum elaterium potato, ca-
 put purgato, ceruicē posteriore par-
 te scalpro aperito, diuque sic purga-
 to præmitoue, deinde crudum bouis
 iecinoris frustulum vnum duoue quā
 maximum poterit melle tinctum de-
 uorato. Si quis oculis sanis non vide-
 at, scalpro huic verticem summāue
 frontem, siue bregma aperito, cutem
 ab osse remoueto, os secato, aquam
 educito, deinde curato, sic sanescet.
 Malo autem oculorum lippitudiniue
 seu ophthalmiæ consueto passimque
 vaganti, capitis ventriculique inferio-
 ris purgatio confert, sanguinisque
 missio: si corpus patiatur habeatue,
 cucurbitulaque horum dolorum si
 quibusdam admoueantur secundum
 venas. Cibus modicus esto panis &
 aquæ potio, locoque obscuro cuba-
 to, proculque à fumo, igne, ceterisque
 luminibus obliquis, quæ cuncta val-
 de caueto, modo que in dextera, mo-
 do in sinistra cubato, caput ne ma-
 facito, siquidem nō confert. Linimē,

tum vero cataplasma ve, quod præsertim destillationem compescat, nō confert: si dolor non inest, tumoribus vero qui non doleant. post acria doloris medicamenta data & inuncta cum dolor cessauit post medicamēti inunctionem, tunc linire & emplastrare confert emplastratione ea, quę tibi conferre videatur. Sed neque cōtente diu contueri confert, lachrymā enim prouocat, cum oculus non possit aduersus clara lumina resistere. Sed nec etiam clausis oculis diu iacere cōfert, si præsertim calidum distillet, quod retentum calefacit, quamobrē cum non distillat & arefcit, tunc lini to, quia confert.

F I N I S.

PIO LECTORI.

HAbes hic præterea lector optime
hos libellos, quos huic opusculo
curauimus imprimendos: vnum, vi-
delicet, Hippocratis de medico, siue
de medici officio, alterum autem de
lege, tertium vero de specie & visu.
Nulla enim horum mentio fit in pri-
ma pagella huius voluminis: quoad
freti fuimus cuiusdam prudentis con-
silio, qui, cum opus ad bonam vsque
partem confectum erat & propemo-
dum excussum, admonitos iri nos
voluit, ipsos cum istis adiungi, quasi
magnum aliquod huius operis adiu-
mentum allaturos.

Impressum Venetiis in ædibus Hie-
ronymi Pencii Leucæsis. Sumpti-
bus Hieronymi Paulucii &
sociorum. Anno nati-
uitatis. 1530. die
primo mensis
Ianuarii.

